

# WADER STUDY GROUP BULLETIN

Number 48, Supplement

December 1986



## Breeding Waders in Europe

A Review of Population Size Estimates  
and a Bibliography of Information Sources



landbouw  
en visserij

*Breeding Waders in Europe* is published by the Wader Study Group, with the financial assistance of The Nature Conservancy Council, and the Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer (NMF) of the Ministerie van Landbouw en Visserij.

The Wader Study Group is an international voluntary association of amateur and professional researchers on all aspects of the biology and ecology of waders (or shorebirds). The Group has rapid access to experienced people throughout the field of wader research. The Group was founded in Britain in 1970 and its administration is still based in Britain, but it now has a worldwide membership.

The Nature Conservancy Council is the Government body responsible for all aspects of nature conservation in Great Britain. It was established by Acts of Parliament dating back to 1949. Its work falls into 4 main categories: the establishment, maintenance and management of National Nature Reserves; the identification and notification of Sites of Special Scientific Interest; the provision of advice and dissemination of knowledge about nature conservation; and the support and conduct of research relevant to these functions.

The Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer (NMF) (Directorate for Nature Conservation, Environment and Fauna Management) of the Ministerie van Landbouw en Visserij (Ministry of Agriculture and Fisheries) is responsible for the conservation of nature and landscape, wild plant and animal species, and the management of wildlife in The Netherlands.

**WADER STUDY GROUP BULLETIN:** Editor Dr. N.C. Davidson, c/o Nature Conservancy Council, Northminster House, Peterborough PE1 1UA, U.K. (tel: office 0733-40345 ext. 3237; home 0733-236844), assisted by Dr. M.E. Moser and Dr. J. Stroud.

Further copies of this *Wader Study Group Bulletin Supplement* are available from Wader Study Group, c/o Dr. S.R. Baillie, 8 Little London, Whitchurch, nr. Aylesbury, Bucks. HP22 4LE, U.K., price £5 incl. postage and packing.

Cover drawings and vignettes by Jens Gregersen.

Printing by Minizen Ltd., Nottingham.

## CORRECTION

In Table 2 (p. 9) some figures were accidentally shifted up one line: the correct population estimates are as follows:

	Great Britain & Ireland	France	north-east Spain	Portugal
Great Snipe <i>Gallinago media</i>	—	—	—	—
Woodcock <i>Scolopax rusticola</i>	10 000-45 000	?	100-200	?
Black-tailed Godwit <i>Limosa limosa islandica</i>	—	—	—	—
<i>limosa</i>	50-60	—	38-51	—



## BREEDING WADERS IN EUROPE

---

A Review of Population Size Estimates  
and A Bibliography of Information Sources

Compiled by Theunis Piersma, for the Wader Study Group

Published by the Wader Study Group, with the financial assistance of the Nature Conservancy Council, Great Britain, and the Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer of the Ministerie van Landbouw en Visserij, The Netherlands.



## CONTENTS

1. Abstract	1
2. Introduction	1
3. Acknowledgements	3
4. Methods	
4.1. Population size estimates	3
4.2. Bibliography	6
5. Population size estimates	
5.1. Results	7
5.2. Discussion	28
5.3. References	29
6. Bibliography	
6.1. General breeding biology	31
6.2. Habitat selection	32
6.3. Mating systems	32
6.4. Eggs and young	33
6.5. Human interference	34
6.6. Survey techniques	37
6.7. Other techniques	38
6.8. Miscellaneous	38
6.9. Oystercatcher <i>Haematopus ostralegus</i>	41
6.10. Black-winged Stilt <i>Himantopus himantopus</i>	43
6.11. Avocet <i>Recurvirostra avosetta</i>	43
6.12. Stone Curlew <i>Burhinus oedicnemus</i>	44
6.13. Collared Pratincole <i>Glaucostola pratincola</i>	45
6.14. Little Ringed Plover <i>Charadrius dubius</i>	46
6.15. Ringed Plover <i>Charadrius hiaticula</i>	47
6.16. Kentish Plover <i>Charadrius alexandrinus</i>	48
6.17. Dotterel <i>Charadrius morinellus</i>	49
6.18. Golden Plover <i>Pluvialis apricaria</i>	50
6.19. Lapwing <i>Vanellus vanellus</i>	52
6.20. Knot <i>Calidris canutus</i>	53
6.21. Sanderling <i>Calidris alba</i>	53
6.22. Little Stint <i>Calidris minuta</i>	53
6.23. Temminck's Stint <i>Calidris temminckii</i>	53
6.24. Purple Sandpiper <i>Calidris maritima</i>	54
6.25. Dunlin <i>Calidris alpina</i>	54
6.26. Broad-billed Sandpiper <i>Limicola falcinellus</i>	55
6.27. Ruff <i>Philomachus pugnax</i>	55
6.28. Jack Snipe <i>Lymnocryptes minimus</i>	56
6.29. Snipe <i>Gallinago gallinago</i>	56
6.30. Great Snipe <i>Gallinago media</i>	57
6.31. Woodcock <i>Scolopax rusticola</i>	57
6.32. Black-tailed Godwit <i>Limosa limosa</i>	58
6.33. Bar-tailed Godwit <i>Limosa lapponica</i>	59
6.34. Whimbrel <i>Numenius phaeopus</i>	59
6.35. Curlew <i>Numenius arquata</i>	59
6.36. Spotted Redshank <i>Tringa erythropus</i>	60
6.37. Redshank <i>Tringa totanus</i>	60
6.38. Greenshank <i>Tringa nebularia</i>	61
6.39. Green Sandpiper <i>Tringa ochropus</i>	61
6.40. Wood Sandpiper <i>Tringa glareola</i>	61
6.41. Common Sandpiper <i>Actitis hypoleucos</i>	62
6.42. Terek Sandpiper <i>Xenus cinereus</i>	62
6.43. Turnstone <i>Arenaria interpres</i>	62
6.44. Red-necked Phalarope <i>Phalaropus lobatus</i>	63
6.45. Grey Phalarope <i>Phalaropus fulicarius</i>	63
6.46. Greenland and Ellesmere Island	64
6.47. Svalbard, Bear Island and Jan Mayen Land	66
6.48. Iceland	67
6.49. Faroe Islands	68
6.50. Norway	68
6.51. Sweden	69
6.52. Finland	70
6.53. Denmark	72
6.54. Poland	74
6.55. Czechoslovakia	75
6.56. Hungary	81
6.57. Austria	83
6.58. Switzerland	84
6.59. West Germany	84
6.60. East Germany	85
6.61. The Netherlands	100
6.62. Belgium and Luxemburg	106
6.63. Great Britain	106
6.64. Ireland	109
6.65. France	109
6.66. Portugal	115



## 1. ABSTRACT

PIERSMA,T. (compiler). 1986. Breeding waders in Europe: a review of population size estimates and a bibliography of information sources. *Wader Study Group Bull.* 48, Suppl.: 1-116.

This is a review of population size estimates of all the Palearctic wader (Charadrii) species breeding in the greater part of Europe (Iceland, Faroe Islands, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Poland, Czechoslovakia, Hungary, Austria, Switzerland, East and West Germany, The Netherlands, Belgium, Luxemburg, Great Britain, Ireland, France, north-east Spain and Portugal), plus Svalbard, north and east Greenland and Ellesmere Island. The review is based on published sources and on the results of the most recent surveys, supplied as unpublished material by national correspondents. A total of 37 wader species are included. Together they give a total of 6.5 million breeding wader pairs in Europe and a further 100 000 pairs in Svalbard, Greenland and Ellesmere Island. Species' totals range from 30 pairs (Terek Sandpiper) to 869 000 pairs (Lapwing). The completeness and accuracy of the surveys in the different countries varies greatly. For each species an annotated map, summarising the numerical distribution of breeding pairs over Europe, is given. In addition to the population size estimates, this document aims to list all published sources on which the estimates are based, and also to list all the recent (from 1950 onwards) publications on the breeding biology of waders in Europe. The bibliography consists of 3374 entries: 326 for breeding biological studies of general interest, 887 for species specific studies and 2161 for publications on breeding wader surveys, listed by country. The gaps in the current knowledge of the distribution, size and biology of European breeding wader populations are highlighted. This should stimulate and focus future work on breeding waders both in the areas covered by this review, and elsewhere in Europe.

T. Piersma (WSG Co-ordinator), Korte Nieuwstraat 4, 9724 LC Groningen, The Netherlands

## 2. INTRODUCTION

Wetlands are biologically rich areas but tend to be threatened by very many human developments. These include drainage for agricultural intensification, land-claim for industry, major coastal engineering projects and peat-extraction or afforestation of moorland areas. For these reasons, wetlands are an important issue in nature conservation, and much international attention has been focussed upon them. Wetlands also provide the habitat for some of the most migratory species of birds, including waders, which depend on international co-operation for their effective conservation. These two features contributed to one of the first world-wide international agreements on nature conservation: the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat, agreed at Ramsar, Iran in 1971. Under this Convention, Contracting Parties agree to make wise use of wetlands within their territory and to list wetlands of international importance (see below) within their territory. They agree also to establish nature reserves on wetlands whether they are included in the list or not, and provide adequately for their wardening. Contracting Parties are also required to advise the Bureau of the Convention if any wetland they have designated under the Convention has changed, is changing or is likely to change as a result of technological developments, pollution or other human interference.

The importance of conserving wetlands is specifically noted in several other international agreements, including the European Community (EC) Directive on the Conservation of Wild Birds 1979. This requires the establishment of Special Protection Areas

in the most suitable places for the conservation of certain rare or vulnerable species and of regularly occurring migratory species. These areas should include breeding, moulting and wintering areas and staging posts along migration routes, particular attention being paid to wetlands. Thus the Directive also is very relevant to waders. Member states are required to take appropriate steps to avoid pollution or deterioration of habitats or disturbance in these areas, and also to strive to avoid pollution and deterioration of habitats outside these areas.

Meetings of Contracting Parties to the Ramsar Convention have agreed, most recently at Cagliari, Italy in 1980, criteria by which to assess whether a wetland is of international importance. Whilst general criteria exist and are likely to be made progressively more specific by future meetings of Contracting Parties as more information becomes available, the specific criteria presently available relate primarily to numbers of wintering waterfowl. In the non-breeding season, most waterfowl tend to be concentrated at wetland sites which themselves form a rather small proportion of total habitat in the regions concerned. The International Waterfowl Research Bureau (IWRB) has been instrumental in encouraging counts at such areas and bringing together information so that the numerical importance of individual sites can be assessed.

In the breeding season, most waterfowl are far more dispersed. This has several implications. First, it is far more difficult to estimate population sizes. Second, there has been general assumption that, as so many of the

populations breed in remote arctic areas, they are safe from major habitat loss. Third, it has been assumed that, even for those species breeding in temperate areas, the wide dispersion of the birds would mean that habitat changes on a sufficiently wide scale as to significantly affect the populations are unlikely. The last two assumptions are now known to be incorrect. Whilst arctic-breeding populations indeed spread over an immense area, temperate-breeding populations tend to occur at much higher densities and therefore constitute a more important component of the total populations than previously supposed. Furthermore, increasingly ambitious engineering proposals for arctic areas could have major effects over wide areas. In the present context, however, the most dramatic change has been the widespread loss of wetlands in temperate areas. In lowland areas this has resulted from increased drainage and intensification of agriculture. In The Netherlands, Beintema et al. (1985; references are listed in Chapter 5.3) have shown that there has been a decline in the length of the breeding season of Snipe *Gallinago gallinago*. Drainage, reseeding and fertilizer application have led to an earlier start to grazing and higher stocking rates have increased losses due to trampling. The drainage has also reduced the potential for feeding by Snipe which probe wet, soft ground. In England and Wales, Smith (1983) found that, by 1982, breeding Snipe were found in only 251 10 km x 10 km squares in lowland England and Wales, compared with 724 about 10 years earlier. The distribution of Redshank *Tringa totanus* had also been severely restricted.

In Scotland, a Wader Study Group (WSG) project concerned with the loss of unintensified lowland grassland concluded that the conversion of rough grazing to dry pasture is likely seriously to reduce the national Redshank population and to reduce local numbers of Curlew *Numenius arquata* and Snipe (Galbraith and Furness 1983). In the Western Isles of Scotland, the EC-supported Integrated Development Programme had the potential to disrupt the traditional methods of cultivating the machair-land on which some of the highest densities of breeding waders in Europe depend. A WSG project supported by the Nature Conservancy Council (NCC) is in progress there to assess any effect and identify the habitat needs of these birds.

Perhaps the most surprising development in recent years concerns the peatlands of Ireland, and north and west Britain. In Ireland commercial peat extraction has removed large areas of natural wetland. In Britain, upland peatlands are being planted with exotic species of coniferous trees at a very rapid rate. This is destructive to breeding wader habitat in both the areas planted and an area around (Stroud and Reed 1986). The planting is encouraged by a tax situation which makes planting a beneficial investment even if the trees do not grow.

Particularly in view of this background, it would be valuable to be able to place the breeding populations of waders in any area in context in a similar way to that now possible for wintering waders. As far as WSG is concerned, this need arose recently in reporting its survey of breeding waders in the Uists and more generally in Scotland (Fuller et al. 1986, Galbraith, Furness and Fuller 1984). There do now exist a large number of studies on breeding waders. These range from systematic surveys of large tracts of land (e.g. Reed,

Langslow and Symonds 1983) to local reports in which the numbers of breeding waders are almost incidental items.

The problem in using this material is its spread through an immense number of publications (and unpublished sources) in many languages. In late 1982 the Wader Study Group decided that, with its spread of members throughout Europe (as well as elsewhere), it ought to be able to draw together available information and identify gaps where further work is needed. WSG Coordinator, Theunis Piersma, was asked to invite participation from throughout Europe and collate the results. This report presents the results of this work, and consists of two main parts:

1. A summary of wader population sizes and distributions between countries at the current state of knowledge. This is likely to be of most use to conservation and planning as well as further scientific studies. In several cases, far more detailed national information is available and this will be published separately by the countries concerned (e.g. for France, Dubois and Maheo 1986).
2. A bibliography of sources used to establish this information and other documentation related to breeding waders in Europe. This is intended primarily for those who wish to build on the basis presented here, both to indicate to them which publications have already been searched and to allow further details from these to be pursued.

As is emphasized above, this report is not an end-point. Rather, it is the start of the next phase. In particular, problems of language, lack of contacts or insufficient background information have made it so far impossible to cover some countries in southern and eastern Europe and the immense territory of the USSR. We hope that this publication will stimulate and encourage co-operative enterprises for the areas not yet covered. We hope also that publication of these estimates, in some cases very tentative, will lead to improved ones in the future. The bibliography indicate also some surprising gaps in studies on certain European breeding species. Thus there is ample scope for innovative research. Finally, the Wader Study Group hopes that the estimates provided in this report will be of use to those organisations responsible for safeguarding the breeding habitats and the birds themselves.

The immense amount of work in bringing this document together will be apparent to the reader. This have depended on very many people, particularly the national coordinators, acknowledged in the following section. It is appropriate here, however, to express the thanks of the WSG to Theunis Piersma for his great efforts in undertaking this project and bringing it to completion.

M.W. Pienkowski  
Vice-Chairman, Wader Study Group  
Senior Ornithologist, Nature Conservancy Council

### 3. ACKNOWLEDGEMENTS

This compilation of information from 23 different countries, and a multitude of published sources, could not have been accomplished without the co-operation and help of a great many different people. I hope that everyone who has been involved in this great, four-year, project will find now that their expended time and effort has been worthwhile. Here I have the opportunity to express my warmest thanks to all of them. First of all the people who provided me with published and unpublished data on wader population sizes: Arthur Gardarsson, Sven Blomqvist, Ingvar Byrkjedal, Rob Bijlsma, Gerard van Dijk, Philippe Dubois, Jadwiga Gromadzka, Olavi Hilden, Jacob Hoglund, Hermann Hotker, John Atle Kalas, Bernhard Kohler, Vera Hromadkova-Lnenickova, A. Martinez Vilalta, Hans Meltofte, Michel Metais, A. Randik, Georg Rauer, Tim Reed, Rui Rufino, Egon Schmidt, A. Siefke, K. Stastny, Bo Svensson and Herman Voet. Without the help of those who compiled partial or complete bibliographies for their countries, this work would certainly not have been as it is: Sven Blomqvist, Ingvar Byrkjedal, Jadwiga Gromadzka, Olavi Hilden, Hermann Hotker, Bernhard Kohler, Vera Hromadkova-Lnenickova, Hans Meltofte, Laszlo Molnar, Georg Rauer, Rui Rufino, Arnd Stiefel, Brigitte Vadier and Theo Verstraet. I am grateful also to those who helped in many other ways: Luis Alberto, Albert Beintema, Rob Fuller, Hector Galbraith, Alfred

Grull, Hermann Hotker, C.B. Hutchinson, H. Leuzinger, Roger Maheo, Hans Skotte Moller, Kees Rappoldt, Alain Sauvage and Ken Smith.

It is a great pleasure to thank Ann Perry for her accurate entering of the texts and literature lists in so many languages on the micro-computer. Nick Davidson and Mike Pienkowski were of great help by commenting on the form and content of the manuscript, and provided much encouragement throughout. I am grateful to Mike for also writing the Introduction, and to Nick for all the work he has put into producing this *Wader Study Group Bulletin Supplement*. Thanks go also to our artist, Jens Gregersen, for his drawings of waders in their natural environments.

We gratefully acknowledge the support of the Dutch Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer, afdeling Soortenbehoud who, through the good offices of Gerard Boere and the Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels in Zeist, financed the typing, editorial and postage costs of *Breeding Waders in Europe*, and The Nature Conservancy Council of Great Britain for providing the costs of printing.

My final thanks must go to Nienke Bloksma. She suffered most.

### 4. METHODS

#### 4.1. POPULATION SIZE ESTIMATES

The population size estimates of breeding waders in the different countries of Europe, were compiled by assembling the relevant published sources and by correspondence with authorities on breeding waders in each country. For about half of the 22 geographical areas, information was already available in published form at the start of this enquiry in 1982. During the ensuing 4 years, published information became available for a few more countries. Information on breeding wader population sizes for the remaining countries is based on estimates provided by personal communications from the local ornithologists/national correspondents. In addition, these correspondents have provided many corrections, many additions and improvements to the published estimates. All such sources are acknowledged in the relevant tables summarising population size estimates.

Figure 1 shows those parts of Europe which are covered in this publication. A recent paper by Meltofte (1985) has reviewed and summarised population estimates of waders breeding in high arctic Greenland and Ellesmere Island (Canada). These are incorporated in this review to set the European populations in a wider context, and since these populations are for the most part Palearctic in their migratory habits. This coverage also is shown in Figure 1. The parts of Europe for which detailed coverage could be achieved is shown in Figure 2. Northern and western Europe is well covered, but in the south and east of Europe coverage is far less complete.

The accuracy of population size estimates

varies greatly between countries. For some countries and species, estimates can be given only as large ranges of numbers. Indeed, for many countries only extrapolations of limited surveys or 'informed guesses' are available. Furthermore, even some of these (Iceland, Hungary, Austria, Czechoslovakia and Portugal) were made only in response to the request for information for this review. To reiterate Gardarsson's (*in litt.*) comments on his estimates for Iceland: "the request brings into focus the fact that we do not have any really good figures for the populations of Icelandic waders" and "I should repeat that these estimates are very close to being just guesswork at present". In contrast, for countries including the Faroe Islands, Denmark, East Germany, Switzerland, The Netherlands, Belgium, Great Britain (but not Ireland, see Reed 1985) and France, the estimates are likely to be much more precise. These estimates are based on extensive reviews of many local breeding wader surveys and/or on nation-wide atlas-work or specially organised censuses. However, it must be emphasised that for each country, not all species have been censussed with the same intensity. For example, the woodland-breeding wader, the Woodcock *Scolopax rusticola*, has been accurately surveyed in very few countries, while a colonially-breeding species such as the Avocet *Recurvirostra avosetta* has been counted very accurately everywhere. In Table 1 I have summarized the approximate level of intensity with which each of the geographical areas have been researched. This table also indicates for which areas much more precise information is needed.




Figure 1. Geographical coverage of *Breeding waders in Europe*. The shaded parts of the map are included in this review.






Figure 2. Parts of Europe given detailed coverage in the breeding wader populations and bibliographic review. Only the area within the thick border-lines is covered.

Table 1. The approximate level of intensity with which the different geographical areas covered in this survey have been researched for breeding waders. Intensities are: 1. extrapolation of limited breeding wader surveys; 2. extrapolation of (mostly quantitative) atlas-work; 3. atlas-work plus review of special surveys; and 4. special surveys. The most accurate estimates of population size usually come from intensities 3 and 4.

Geographical area	Research intensity index
high-arctic Greenland and Ellesmere Island	1
Bear Island and Jan Mayen	4
Svalbard	1
Iceland	1
Faroe Islands	4
Norway	1 & 3
Sweden	1 & 4
Finland	2
Denmark	3
Poland	2
Czechoslovakia	2
Hungary	3
Austria	3
Switzerland	3
East Germany	3
West Germany	2
The Netherlands	3
Belgium	3
Great Britain and Ireland	3
France	4
north-east Spain	4
Portugal	2



## 4.2. BIBLIOGRAPHY

The bibliography is divided into 3 sections: general topics related to the biology of breeding waders; the breeding biology of single species; and surveys of breeding waders in each country. Whilst the bibliographies for each country mainly list references to work published in Europe, in the bibliographies on general topics I have additionally included relevant references to studies in other parts of the world. Studies made outside Europe on species that breed in Europe are also included.

The bibliographies on the different topics, species and countries have been compiled chiefly from references found in standard handbooks (notably Glutz von Blotzheim et al. 1975, 1977), and from the reference lists of the most important recent papers on the subject. The completeness of the compilations on survey work in different countries varies. The most important references published after 1950 are listed for each country, but some compilers have included also a great number of 'lesser articles'.

Unless indicated otherwise, each bibliography was assembled by the compiler. The main language of WSG, and this bibliography, is English. However, I have assumed that French and German are also internationally comprehensible and have not translated titles in these languages. Titles in languages other than these three have been translated into

English wherever possible, or, when titles of abstracts in only French or German were available, into one of these two languages. An exception is the listing in The Netherlands section of the many privately published Dutch reports. These titles have not been translated, since they are likely to be of use mostly within The Netherlands. No comprehensive bibliography could be compiled for Spain, since it has been possible to include only the north-eastern part of Spain in the breeding population survey.

Limitations of resources and space have precluded the preparation of full subject, species, geographical and author indices. However, the arrangement of the references by subject, species and geographical area, and the alphabet ordering of (first) author's names within each section, should minimise the need for a separate index. Where individual papers are relevant to several sections of the bibliography, they are listed under each of the relevant sections. Those publications in which the breeding biology of several wader species is discussed appear under the heading of 'General Breeding Biology' and are not then listed separately in each species section. The Bibliography consists of a total of 3374 entries: 326 for the general topics, 887 for the species studies and 2161 for the surveys by country.

## 5. POPULATION SIZE ESTIMATES

### 5.1. RESULTS

Table 2 gives the best estimates of breeding wader populations in the different European countries that can be achieved currently. From all the detailed information given in Table 2, Table 3 summarises the approximate total number of pairs of waders of each species breeding in the surveyed area. Some species, such as Little Stint, Terek Sandpiper and Grey Phalarope are very rare breeding birds in Europe and total breeding populations are under 1000 pairs. The high-arctic breeding species Knot and Sanderling breed in Europe only in Svalbard and in extremely low numbers. The breeding population of Collared Pratincoles is also under 1000 pairs in the survey. However large numbers of Collared Pratincoles are known to breed in the parts of Spain not covered here, so total populations are undoubtedly much larger.

The main features of the distribution of each species are described in the remainder of this

section, and the distribution in Europe of each species is shown in Figures 3 to 36. The distribution maps are based on the data in Figure 2, and the size of the symbols is directly proportional to the total number of pairs breeding in the country (midpoint, if a range is given in Table 2). A legend to the scale is given in each distribution map. For the larger countries, the dots are placed according to the general breeding distribution of a particular species in that country (by reference to the distribution maps in Cramp & Simmons 1983). Thus, since Little Stints nest only in the arctic parts of Norway, the symbol is placed in the northernmost part of the country. Symbols are placed centrally where the species breeds throughout a country. Wherever possible, breeding populations of different subspecies are shown by different symbols. Information on geographical variation and recognition of subspecies follows Cramp & Simmons (1983).

#### Species accounts




Figure 3. Distribution of Oystercatchers *Haematopus ostralegus* in Europe. In this and the following maps, the areas of the dots are relative to the numbers of breeding pairs in each country. The large dot for The Netherlands represents 90 000 pairs.

Oystercatcher *Haematopus ostralegus* (Figure 3). Oystercatchers breeding in Europe have only slight geographical size variation, although wings are slightly longer in birds breeding in Iceland and the Faroe Islands than elsewhere. About 40% of the total European breeding population of 218 000 pairs breed in The Netherlands, with a further 20% in Great Britain and Ireland, and 18% in Norway. Hence nearly 80% of European Oystercatchers breed in only 4 countries. Elsewhere there are smaller populations in Iceland, Faroe Islands, Sweden, Denmark and West Germany. Breeding populations in south and east Europe are very small.

Table 2. Estimated numbers of pairs of waders breeding in Europe. For areas covered see Figures 1 and 2. Where more than one subspecies breeds in a country, the country total has been allocated to the most abundant population, and the presence of the other subspecies indicated by +.

	high arctic	Bear Island and Mayen <sup>2</sup>	Iceland <sup>3</sup>	Faroe Islands <sup>4</sup>	Norway <sup>7</sup>	Sweden <sup>9</sup>	Finland <sup>17</sup>	Denmark <sup>19</sup>	Poland <sup>21</sup>	Czechoslovakia <sup>22</sup>	Hungary <sup>23</sup>	Austria <sup>24</sup>
Greenland and Eilesmere Island <sup>1</sup>												
Oystercatcher <i>Haematopus ostralegus</i>	-	-	10 000	8 667	40 000	10 000 <sup>10</sup>	1500-1800	4000-6000	10	-	4	25-30
Black-tinged Stilt <i>Himantopus himantopus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Avocet <i>Recurvirostra avosetta</i>	-	-	-	-	0-3	750 <sup>14</sup>	-	3 550 <sup>20</sup>	-	15-30	200	50-80
Stone Curlew <i>Burhinus oedicnemus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	10	100-200	200	1
Collared Pratincole <i>Glareola pratincola</i>	-	-	-	-	100-150	1000 <sup>10</sup>	5000	150-200	1 000-1 500	>1 000	600-800	150
Little Ringed Plover <i>Charadrius dubius</i>	-	-	300-600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ringed Plover <i>Charadrius hiaticula</i>	25 000	-	30 000-50 000	10	-	-	-	-	-	-	-	-
high arctic <i>hiaticula</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
subarctic <i>hiaticula</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
temperate <i>hiaticula</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kentish Plover <i>Charadrius alexandrinus</i>	-	-	-	-	12 500	20 000 <sup>10</sup>	4000	-	-	-	-	-
Dotted Gull <i>Larus macrourus</i>	-	0-1	-	-	-	28 000	100 <sup>10</sup>	800	-	50-75	-	-
Golden Plover <i>Pluvialis apricaria</i>	100	0-5	300 000	918	130 000	50 000 <sup>10</sup>	100 000	5-10	-	-	10	13
Lapwing <i>Vanellus vanellus</i>	20 000	0-5	0-15	10	58 000	120 000 <sup>10</sup>	150 000	30 000-40 000	3 000	>2 000	10 000	1 500-2 000
Knot <i>Calidris canutus</i>	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanderling <i>Calidris alba</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Little Stint <i>Calidris minuta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temminck's Stint <i>Calidris temminckii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Purple Sandpiper <i>Calidris maritima</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Nitterdrait" <i>maritima</i>	>100	100-1000	2000-4000	50 000	20	10 500	2 000 <sup>10</sup>	10	-	-	-	-
Dunlin <i>Calidris alpina</i>	5 000	-	0-5	300 000	20	-	-	-	-	-	-	-
arctica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
subarctic <i>schinzii</i>	+*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
temperate <i>schinzii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
alpina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Broad-billed Sandpiper <i>Limicola falcinellus</i>	-	-	-	-	-	35-50 000	20 000 <sup>10</sup>	15	+1 000	490-20	80-100	-
Ruff <i>Philomachus pugnax</i>	-	-	-	-	-	180	2000-3000	8	000	6520	350-400	8-10
Jack Snipe <i>Lymnocryptes minimus</i>	-	-	-	-	-	15 000	15 000 <sup>10</sup>	150 000	10 000	-	5	-
Snipe <i>Gallicrex cinerea</i>	-	-	-	-	-	110 <sup>8</sup>	18 000 <sup>10</sup>	-	-	-	-	-
"fasciata"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gallinago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Great Snipe <i>Gallicrex media</i>	-	-	-	-	-	34 000	75 000 <sup>10</sup>	200 000	150-2000	550-500 <sup>?</sup>	>1 000	30-40
Woodcock <i>Scolopax rusticola</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	?
Black-tailed Godwit <i>Limosa limosa islandica</i>	-	-	-	-	-	10 000-10 000	65	30-75 <sup>12</sup>	20	-	833 <sup>20</sup>	-
Bar-tailed Godwit <i>Limosa lapponica</i>	-	-	-	-	-	1 300 <sup>8</sup>	10-15 <sup>13</sup>	200	-	-	7 000	300-600
Whimbrel <i>Numenius phaeopus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"islandicus"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Curlew <i>Numenius arquata</i>	-	-	-	-	-	10 000	5 000 <sup>10</sup>	30 000	40 000	250-350	400	125-150
Spoored Redshank <i>Tringa erythropus robusta</i>	-	-	-	-	-	5 000 <sup>8</sup>	20 000 <sup>10</sup>	20 000	-	-	-	50-60
Redshank <i>Tringa totanus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totanus	-	-	-	-	-	100 000	10	58	000	20 000 <sup>10</sup>	5 000	4000-6000
Greenshank <i>Tringa nebularia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100-1 400	80-150	400-500
Green Sandpiper <i>Tringa ochropus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85-100
Wood Sandpiper <i>Tringa glareola</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Common Sandpiper <i>Actitis hypoleucos</i>	-	<100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
Terek Sandpiper <i>Xenus cinereus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turnstone <i>Arenaria interpres</i>	25 000	-	10-40	-	-	-	-	-	-	>1 000	-	50-100
high arctic <i>interpres</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fennoscandian Turnstone	>100	-	0-5 50 000-10 000 50	-	-	8 500	5 000 <sup>10</sup>	15 000	-	25-30	-	-
Red-necked Phalarope <i>Phalaropus lobatus</i>	>100	-	150-300 <100	-	-	9 500	-	-	-	-	-	-
Grey Phalarope <i>Phalaropus fulicarius</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totals	93 000	100-1000	2500-5000 1 350 000-13 680	727 000	1 360 000	1 798 000	50 000-	70 000	>7 000	13 300	2 400	-

Table 2 (continued).

	Switzerland <sup>25</sup>	East Germany <sup>26</sup>	West Germany <sup>27</sup>	The Netherlands <sup>31</sup>	Luxembourg <sup>24</sup>	Great Britain <sup>36</sup> & Ireland <sup>37</sup>	France <sup>37</sup>	north-east <sup>19</sup> Spain	Portugal <sup>40</sup>
Oystercatcher <i>Haematopus ostralegus</i>	-	200-250	10 000 <sup>28</sup>	90 000	400-450	33 000-43 000	3 000	670-735	25
Black-winged Stilt <i>Himantopus himantopus</i>	-	0-2	0-5	0-1	0-135	-	350-410	1 000-1 300	500-2 000
Avoet <i>Hocinostris avosetta</i>	-	150	3200-3500 <sup>28</sup>	8 000 <sup>32</sup>	450	175	-	1 473-1 633	50-100
Stone Curlew <i>Burhinus oedicnemus</i>	-	0-2	? <sup>2</sup>	-	-	300	4 000-5 000 <sup>38</sup>	1 000-5 000	1 000-10 000
Collared Pratincole <i>Glareola pratincola</i>	-	-	-	-	-	-	-	200	250-1 000
Little Ringed Plover <i>Charadrius dubius</i>	20-25	800-1 000	1 900 <sup>28</sup>	800-1 300 <sup>33</sup>	350-400	475	-	2 500-3 000	1 000-10 000
Ringed Plover <i>Charadrius dubius</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
high arctic <i>haematocephala</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
subarctic <i>haematocephala</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperate <i>haematocephala</i>	-	100-150	1 300 <sup>28</sup>	450-600 <sup>33</sup>	3	-	8 600	166-186	-
tundras	-	-	800-1000 <sup>29</sup>	750-1 100 <sup>33</sup>	130	-	-	-	-
Kentish Plover <i>Charadrius alexandrinus</i>	-	0-2	-	0-103	-	100-150	1 075-1 160	2 000-3 000	1 500-3 000
Dottedel <i>Charadrius morinellus</i>	-	-	25-30 <sup>29</sup>	0-15	27 400	600	>28	1-10	-
Golden Plover <i>Pluvialis apricaria</i>	-	-	25-30 <sup>29</sup>	0-15	181 500	33 500 17 000-20 000	1-3	-	-
Lapwing <i>Vanellus vanellus</i>	730	15 000-20 000	50 000-60 000 <sup>29</sup>	160 000-175 000	15 000	-	-	-	-
Knot	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanderling <i>Calidris alba</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Little Stint <i>Calidris minuta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temminck's Stint <i>Calidris temminckii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Purple Sandpiper <i>Calidris maritima</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Titicorvus"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dunlin <i>Calidris alpina</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
arctica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
subarctic <i>schinzii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperate <i>schinzii</i>	-	100	30 <sup>29</sup>	0-5 <sup>33</sup>	0-2	9 150	200	-	-
alpina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Broad-billed Sandpiper <i>Limicola falcinellus</i>	-	60-80	500 <sup>29</sup>	800-1 100	0-25	1-10	-	-	-
Ruff <i>Philomachus pugnax</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jack Snipe <i>Lymnocryptes minimus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Snipe <i>Gallinago gallinago</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
færoensis <sup>38</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gallinago	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Great Snipe <i>Gallinago media</i>	25-30	4 000-6 000	16 000 <sup>29</sup>	4 700-4 800	100	-	150-250	10-50	-
Woodcock <i>Scotopax rusticola</i>	100-200	4 000-5 000	?	2 000-3 000 <sup>33</sup>	?	10 000-25 000	-	?	100-200
Black-tailed Godwit <i>Limosa limosa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Whimbrel <i>Numenius phaeopus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"elandicus"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bar-tailed Godwit <i>Limosa lapponica</i>	-	300	6 500-7 000 <sup>29</sup>	85 000-105 000	650-700	50-60	-	-	38-51
Whimbrel <i>Numenius phaeopus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"phaeopus"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Curlew <i>Numenius arquata</i>	15	350-500	4 000-30	5 000-5 400	500	33 000-38 000	12 000	1 150-1 280	-
Spotted Redshank <i>Tinca erythropus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redshank <i>Tinca totanus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
robusta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totanus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greenshank <i>Tringa nebularia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green Sandpiper <i>Tringa ochropus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wood Sandpiper <i>Tringa glareola</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Common Snipeper <i>Tetrattis hypoleucos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terek Sandpiper <i>Lenis cinereus</i>	100-130	100-200	125-250 <sup>29</sup>	5-10 <sup>33</sup>	?	17 100-20 100	4 900	500-650	50-150
Turnstone <i>Arenaria interpres</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
high arctic <i>interpres</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fennoscandian <i>interpres</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red-necked Phalarope <i>Phalaropus lobatus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grey Phalarope <i>Phalaropus fulicarius</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totals	1 060	25 000-	100 000-	386 000-	18 000	450 000-506 000	32 000-36 000	5 500-11 000	5 300-36 200

Superscript numbers give the source(s) of the estimates, either as a reference to published estimates, or the date of receipt of estimates in unpublished communications for this survey.

- 11.Jonsson (1983);
- 12.Tholin (1982);
- 13.Wahlstrand (1984);
- 14.Gärdarsson in litt. (Jan 1983);
- 15.Ahlen (1977);
- 16.B. Svensson pers. comm. (May 1986);
- 17.H. Hoglund pers. comm. (May 1986);
- 18.compiled by O. Hilden in litt. (March 1986);
- 19.Hilden and Hyryia (1981);
- 20.Björklund and Saetersdal (1986);
- 21.Björklund and Saetersdal (1986);
- 22.S. Blomqvist in litt. (July 1984);
- 23.V. Lnenickova, K. Staatsky and A. Randik in litt. (June 1986);
- 24.E. Schmid in litt. (Feb 1986);
- 25.B. Kohler and G. Rauer in litt. (Feb 1986);
- 26.A. Sieffert in litt. (Feb 1984);
- 27.compiled by H. Hocker in litt. (Nov 1982);
- 28.Gutz von Biotzheim et al. (1975, 1977);
- 29.M. Mettäls pers. comm. (May 1986);
- 30.J. Martínez Vilalta (1982);
- 31.compiled by G. van Dijk in litt. (June 1986);
- 32.Ruitenberg (1985);
- 33.Teixeira (1979);
- 34.compiled by H. Voet in litt. (May 1984)
- 35.Voet et al. (1982);
- 36.Reed (1983);
- 37.compiled by P. J. Dubois in litt. (Oct 1985);
- 38.M. Mettäls pers. comm. (May 1986);
- 39.J. Martínez Vilalta (1985);
- 40.R. Rufino in litt. (Nov 1985).

Table 3. Estimated total numbers of pairs of breeding waders in Europe, and north and east Greenland and Ellesmere Island, derived from Table 2. Ranges of total numbers are given for each subspecies; the mid-points of ranges in numbers are given for each species.

	range of total numbers	Greenland and Ellesmere Island	midpoint of range Europe
Oystercatcher	211 000-224 000	-	218 000
Black-winged Stilt	1 900- 4 700	-	3 300
Avocet	19 000- 19 700	-	19 300
Stone Curlew	6 500- 20 500	-	13 500
Collared Pratincole	550- 1 350	-	950
Little Ringed Plover	16 900- 28 000	-	22 500
Ringed Plover		25 000	90 000
high arctic <i>hiaticula</i>	25 000- 26 000		
subarctic <i>hiaticula</i>	30 000- 50 000		
temperate <i>hiaticula</i>	12 500- 13 800		
<i>tundrae</i>	36 500- 36 500		
Kentish Plover	6 400- 9 600	-	8 000
Dotterel	36 400- 36 500	-	36 500
Golden Plover	-	100	609 000
Lapwing	847 000-891 000	-	869 000
Knot	-	20 000	-
Sanderling	-	17 000	-
Little Stint	200- 210	-	205
Temminck's Stint	-	-	25 400
Purple Sandpiper		>100	66 100
" <i>littoralis</i> "	52 000- 56 000		
<i>maritima</i>	12 500- 12 500		
Dunlin		5 000	366 000
<i>arctica</i>	5 000- 5 000		
subarctic <i>schinzii</i>	300 000-300 000		
temperate <i>schinzii</i>	11 100- 11 100		
<i>alpina</i>	55 000- 55 000		
Broad-billed Sandpiper	10 200- 11 200	-	10 700
Ruff	-	-	247 000
Jack Snipe	-	-	28 100
Snipe		-	841 000
<i>faeroeensis</i>	301 000-301 000		
<i>gallinago</i>	530 000-539 000		
Great Snipe	2 900- 4 000	-	3 500
Woodcock	328 000-366 000	-	347 000
Black-tailed Godwit		-	133 000
<i>islandica</i>	10 000- 30 000		
<i>limosa</i>	102 000-123 000		
Bar-tailed Godwit	-	-	1 500
Whimbrel		-	248 000
" <i>islandicus</i> "	203 000-203 000		
<i>phaeopus</i>	45 000- 45 000		
Curlew	122 000-128 000	-	125 000
Spotted Redshank	-	-	45 000
Redshank		-	268 000
<i>robusta</i>	100 000-100 000		
<i>totanus</i>	164 000-172 000		
Greenshank	-	-	109 000
Green Sandpiper	-	-	133 000
Wood Sandpiper	-	-	577 000
Common Sandpiper	-	-	882 000
Terek Sandpiper	-	-	30
Turnstone		25 000	18 500
high arctic <i>interpres</i>	25 000- 25 000		
Fennoscandian <i>interpres</i>	18 500- 18 500		
Red-necked Phalarope	125 000-175 000	>100	150 000
Grey Phalarope	350- 500	>100	330
<b>TOTAL</b>		<b>c.93 000</b>	<b>c.6 500 000</b>






Figure 4. Distribution of Black-winged Stilts *Himantopus himantopus* in Europe.

**Black-winged Stilt *Himantopus himantopus*** (Figure 4). Only the nominate subspecies *Himantopus* breeds in Europe, chiefly around the Mediterranean and Black Sea. Thus this survey covers only a small part of the total European breeding population. Large populations breed in Portugal, France and north-east Spain, but there are probably thousands more breeding pairs outside the survey limits in Spain, Italy and Greece (see Dubois 1986).





Figure 5. Distribution of Avocets *Recurvirostra avosetta* in Europe.

**Avocet *Recurvirostra avosetta*** (Figure 5). Avocets are widespread over much of Eurasia, and show no size variation in Europe. Most (75%) of the European population of 20 000 pairs breed along the Wadden Sea coasts of The Netherlands, West Germany and Denmark, with smaller populations scattered over the remainder of southern and western Europe.







Figure 6. Distribution of Stone Curlews *Burhinus oedicnemus* in Europe.

**Stone Curlew *Burhinus oedicnemus*** (Figure 6). This species shows no geographical variation within Europe. Most Stone Curlews in Europe certainly breed in the south (France, Spain and Portugal), but breeding densities are poorly documented. There are known to be large breeding populations in Spain just outside the surveyed area.



**Collared Pratincole *Glareola pratincola*** (Figure 7). Only one subspecies of Collared Pratincole (the nominate *pratincola*) lives in Europe. A large part of the European population probably breeds in the parts of Spain outside this survey. The 1000 pairs that were reported are all in the Mediterranean countries and Hungary. Also in Hungary, 1-3 pairs of a related species, the Black-winged Pratincole *Glareola nordmanni* breed in some years, alongside the 100-150 breeding pairs of Collared Pratincoles (E. Schmidt *in litt.*).

Figure 7. Distribution of Collared Pratincoles *Glareola pratincola* in Europe.




Figure 8. Distribution of Little Ringed Plovers *Charadrius dubius* in Europe. The large dot in Finland represents 5000 pairs.

Little Ringed Plover *Charadrius dubius* (Figure 8). Only one subspecies (*curonicus*) breeds in Europe, where Little Ringed Plovers are widespread over inland areas, but not in northern Scandinavia or Iceland. With a total European population of 22 500 pairs, large breeding populations are found in most other European countries, the largest being in Finland and Portugal.






Figure 9. Distribution of Ringed Plovers *Charadrius hiaticula* in Europe. Black dots show the temperate population of the subspecies *hiaticula*, the heavily shaded dot is the subarctic population of *hiaticula* (40 000 pairs), and the lightly shaded dots are the subspecies *tundrae*.

Ringed Plover *Charadrius hiaticula* (Figure 9). Two subspecies of Ringed Plover breed in Europe: *hiaticula* from the Baltic area and western Europe to Iceland, Svalbard and Greenland/Ellesmere Island, and *tundrae* breeding in the arctic areas of Fennoscandia and the USSR. Most Ringed Plovers breeding in Scandinavia (36 500 pairs) belong to the *tundrae* subspecies. There is a large subarctic population (50 000 pairs) of *hiaticula* breeding in Iceland, with a further arctic population of 25 000 pairs on Greenland and Ellesmere Island. Temperate breeding populations of *hiaticula* are small, with the stronghold in Great Britain (8600 pairs) - populations elsewhere in Europe (chiefly Denmark, The Netherlands and West Germany) total only about 4500 pairs.



Kentish Plover *Charadrius alexandrinus* (Figure 10). Only one subspecies of Kentish Plover breeds in Europe, mainly around the Mediterranean and Black Seas. Though the largest breeding populations are found in France (c. 1100 pairs), in Portugal (1500-3000 pairs) and in Spain (2000-3000 pairs just in the part covered by this survey), good numbers breed also along the coasts of North Sea and Wadden Sea coasts in The Netherlands and West Germany.





Figure 10. Distribution of Kentish Plovers *Charadrius alexandrinus* in Europe.



Dotterel *Charadrius morinellus* (Figure 11). This is a monotypic species. Dotterels have their stronghold in the mountains of Fennoscandia. Norway holds over 75% of the total European population of 36 500 pairs. A relatively isolated population occurs in Scotland.

Figure 11. Distribution of Dotterels *Charadrius morinellus* in Europe. The large dot in Norway represents 28 000 pairs.




Figure 12. Distribution of Golden Plovers *Pluvialis apricaria* in Europe. The large dot in Iceland represents 300 000 pairs.

**Golden Plover *Pluvialis apricaria*** (Figure 12). A monotypic species with a northern breeding distribution. The largest breeding populations of Golden Plovers are in Iceland and in Fennoscandia. The small breeding populations in countries bordering the North Sea (Denmark, West Germany) have almost disappeared during the last century, with only Britain retaining important populations.





Figure 13. Distribution of Lapwings *Vanellus vanellus* in Europe. The large dot in Great Britain and Ireland represents 215 000 pairs.

**Lapwing *Vanellus vanellus*** (Figure 13). Lapwings are a monotypic species. They are the most numerous European breeding wader and breed in large numbers over much of northern Europe. The largest breeding populations are found in the British Isles (215 000 pairs), in The Netherlands (160 000-175 000 pairs) and in Finland (150 000 pairs).







Figure 14. Distribution of Little Stints *Calidris minuta* in Europe.

Knot *Calidris canutus* (no map). Knots breed only on the high arctic tundra. The subspecies *islandica* breeds in Greenland and on Ellesmere Island, and there is a very small population (0-5 pairs) of unknown affinities on Svalbard.

Sanderling *Calidris alba* (no map). Sanderlings are a monotypic wader species of the high arctic, with an almost circum polar breeding distribution. There is a very small population (5-15 pairs) on Svalbard and about 17 000 pairs are estimated to breed in Greenland and on Ellesmere Island.

Little Stint *Calidris minuta* (Figure 14). Little Stints breed chiefly on the tundra of the USSR. A small population (c. 200 pairs) breeds just within the surveyed area, in northermost Fennoscandia, especially Norway.



Temminck's Stint *Calidris temminckii* (Figure 15). This is a monotypic species of subarctic areas. Its stronghold in Europe is northern Sweden, where almost 80% of the 25 400 European pairs breed, with much smaller populations in Norway and Finland.

Figure 15. Distribution of Temminck's Stints *Calidris temminckii* in Europe.




Figure 16. Distribution of Purple Sandpipers *Calidris maritima* in Europe. Black dots show the "race" of mainland Europe, the shaded dot indicates "littoralis" breeding on Iceland (50 000 pairs) and in the Greenland arctic (see text).




Figure 17. Distribution of Dunlins *Calidris alpina* in Europe. Black dots are the temperate breeding population of the subspecies *schinzii*, the heavily shaded dot is the subarctic population of *schinzii* (300 000 pairs), and the lightly shaded dots are the subspecies *alpina*. The black dot in Finland incorporates a considerable number of *alpina* pairs from northern Finland.

**Purple Sandpiper *Calidris maritima*** (Figure 16). Although not usually recognized taxonomically, Purple Sandpipers from sub-arctic breeding areas in Iceland and Greenland are larger and may form a separate subspecies ("littoralis") from the birds breeding in Norway and Sweden. Iceland, with 50 000 pairs, harbours the largest breeding population of Europe (80%). Populations of the "nominate" race are smaller, with most (10 500 pairs) in Norway.

**Dunlin *Calidris alpina*** (Figure 17). Three subspecies of Dunlins breed within the surveyed area: *arctica* in northeast Greenland, *schinzii* in Iceland, Britain and around the Baltic Sea, and the nominate subspecies *alpina* in northern Fennoscandia. The total breeding population of *arctica* is no more than 5000 pairs. The subarctic population on Iceland of the *schinzii* subspecies is much more abundant, with about 300 000 pairs. However, the temperate breeding populations of *schinzii* are now very much smaller and have their last stronghold in Great Britain (9350 pairs), notably on the Western Isles and northernmost mainland of Scotland. *schinzii* Dunlins have almost disappeared from the countries around the Baltic Sea and southern North Sea. Only a small proportion of the *alpina* subspecies breeds in Europe: about 50 000 pairs in (sub-)arctic Fennoscandia.




Figure 18. Distribution of Broad-billed Sandpipers *Limicola falcinellus* in Europe.

**Broad-billed Sandpiper *Limicola falcinellus*** (Figure 18). One subspecies (nominate *falcinellus*) of Broad-billed Sandpipers occurs in Europe. Almost all (98%) of the European breeding population is found in the northern part of Sweden and Finland, with a very small population in Norway.





Figure 19. Distribution of Ruffs *Philomachus pugnax* in Europe.

**Ruff *Philomachus pugnax*** (Figure 19). This is a very widespread, but monotypic, species. The majority (93%) of nearly 250 000 Ruffs breeding in Europe are found in northern Sweden and in Finland. During the last few decades, Ruffs have almost disappeared from the countries around the North Sea; largely due to agricultural improvements to their breeding grounds.






Figure 20. Distribution of Jack Snipe *Lymnocryptes minimus* in Europe. The large dot in Sweden represents 18 000 pairs.




Figure 21. Distribution of Snipe *Gallinago gallinago* in Europe. Shaded dots show the subspecies *faeroensis* (300 000 pairs in Iceland), and black dots show the subspecies *gallinago*.

**Jack Snipe *Lymnocryptes minimus*** (Figure 20). The Jack Snipe is a rather scarce, monotypic species. The European population of about 30 000 pairs breeds in northernmost Fennoscandia, mostly in Sweden and Finland.

**Snipe *Gallinago gallinago*** (Figure 21). Snipe in the western populations (Iceland, Faroe, Orkney and Shetland) are recognised as a separate subspecies (*faeroensis*) from those in the rest of Europe (*gallinago*). The Snipe is a very numerous breeding wader in northern Europe. Most (300 000 pairs) of the large *faeroensis* population breeds on Iceland. Most (c. 90%) of the over half a million pairs of *gallinago* breeds in Fennoscandia; especially, Finland and Sweden. Very few Snipe breed in southern Europe.




Figure 22. Distribution of Great Snipe *Gallinago media* in Europe.

**Great Snipe *Gallinago media*** (Figure 22). With 3500 pairs, the monotypic Great Snipe is a rare European wader species, although it breeds through much of Russia. In Europe, Great Snipe breed only in Norway, Sweden and Poland.




Figure 23. Distribution of Woodcock *Scolopax rusticola* in Europe.

**Woodcock *Scolopax rusticola*** (Figure 23). The number of breeding pairs of the monotypic Woodcock in Europe is very incompletely known, despite the considerable attention the species receives from hunters and hunting organizations. Therefore, the figure for the total population (347 000 pairs) must be considered as a minimum. The largest known numbers of breeding pairs are found in Finland (200 000 pairs), with large populations also in Sweden, Norway and Great Britain and Ireland.






Figure 24. Distribution of Black-tailed Godwits *Limosa limosa* in Europe. Black dots show the subspecies *limosa* and the shaded dot shows the subspecies *islandica*.

**Black-tailed Godwit *Limosa limosa*** (Figure 24). Two subspecies of Black-tailed Godwits breed in Europe. The rather uncommon subspecies *islandica* breeds almost entirely in Iceland with 10 000 - 30 000 pairs. The nominate subspecies *limosa* has its major stronghold in The Netherlands, where almost 85% of the European pairs are now found, but even this population may well be decreasing now. Elsewhere in Europe populations are very small.





Figure 25. Distribution of Bar-tailed Godwits *Limosa lapponica* in Europe.

**Bar-tailed Godwit *Limosa lapponica*** (Figure 25). Europe is on the fringe of the subarctic breeding range (chiefly in the USSR) of Bar-tailed Godwits. Small numbers of the subspecies *lapponica* breed in northernmost Fennoscandia, especially Norway (1300 pairs).





Figure 26. Distribution of Whimbrels *Numenius phaeopus* in Europe. Black dots indicate the subspecies *phaeopus* and the shaded circle is the subarctic population of "islandicus" (200 000 pairs in Iceland, see text).

Whimbrel *Numenius phaeopus* (Figure 26). Whimbrels from the subarctic breeding grounds on Iceland are sometimes treated as a separate subspecies ("islandicus"), although they are usually considered as belonging to the nominate *phaeopus*, despite differences in size. Iceland harbours by far the largest breeding population of Europe (200 000 pairs). Outside Iceland, Finland holds over 60% of Whimbrels breeding on mainland Europe, with smaller populations in Sweden, Norway and northern Britain.



Curlew *Numenius arquata* (Figure 27). Only the subspecies *arquata* is recognized in Europe. Most European breeding Curlews are in Britain (18-20% of birds) and in Finland (16%). Elsewhere, Sweden and Ireland support large populations, but Curlews are scarce elsewhere in northern Europe and absent from southern Europe.

Figure 27. Distribution of Curlews *Numenius arquata* in Europe.




Figure 28. Distribution of Spotted Redshanks *Tringa erythropus* in Europe.

**Spotted Redshank *Tringa erythropus*** (Figure 28). The monotypic Spotted Redshank is found in Europe only in northern Fennoscandia, with most in Sweden and Finland (45% of the population in each country).





Figure 29. Distribution of Redshanks *Tringa totanus* in Europe. Black dots show the subspecies *totanus* and the shaded circle shows the subspecies *robusta* (100 000 pairs).

**Redshank *Tringa totanus*** (Figure 29). At least two subspecies of Redshanks are found in Europe: *robusta* on Iceland and the Faroe Islands, and the nominate *totanus* in the rest of Europe. Formerly, birds from the British Isles were placed in a separate subspecies *britannica*. Largest breeding populations of *totanus* are found in Norway, Britain and The Netherlands, which together have over 70% of the breeding pairs. Elsewhere there are large populations only in Sweden (12%) and West Germany (8%). At least 100 000 pairs of *robusta* breed in Iceland.






Figure 30. Distribution of Greenshanks *Tringa nebularia* in Europe.

**Greenshank** *Tringa nebularia* (Figure 30). This monotypic species has its European stronghold in Fennoscandia, especially Finland and Sweden (together 83% of the European population). Outside Fennoscandia the only breeding population in Europe is in Scotland.




Figure 31. Distribution of Green Sandpiper *Tringa ochropus* in Europe.

**Green Sandpiper** *Tringa ochropus* (Figure 31). The majority of breeding European Green Sandpipers are restricted to Fennoscandia, especially Sweden and Finland (90% of the European population).




Figure 32. Distribution of Wood Sandpipers *Tringa glareola* in Europe. The large dot in Finland represents 300 000 pairs.

**Wood Sandpiper *Tringa glareola*** (Figure 32). Another monotypic tringid sandpiper which is very numerous in Europe, but which occurs almost exclusively in Fennoscandia. Both Sweden (250 000 pairs) and Finland (300 000 pairs) hold very large breeding populations.






Figure 33. Distribution of Common Sandpipers *Actitis hypoleucus* in Europe. The large dot in Finland represents 400 000 pairs.

**Common Sandpiper *Actitis hypoleucus*** (Figure 33). Though Common Sandpipers breed over much of continental Europe and Asia, it is monotypic. It is a very numerous European breeding species and the greater part (96%) of the large European breeding population (882 000 pairs) is found in Fennoscandia. Elsewhere there is a large population only in Great Britain and Ireland (22 000 - 25 000), but Common Sandpipers breed in small numbers also over much of the rest of Europe.



**Terek Sandpiper *Xenus cinereus*** (Figure 34). Terek Sandpipers breed over much of the northern USSR. There is a small breeding population (only c. 30 pairs) on the extreme western fringe of the breeding range, along the Gulf of Bothnia in Finland.

Figure 34. Distribution of Terek Sandpipers *Xenus cinereus* in Europe.



**Turnstone *Arenaria interpres*** (Figure 35). All Turnstones in the surveyed area of Europe and the Arctic belong to the nominate subspecies. Large breeding populations occur in Greenland and Ellesmere Island (25 000 pairs). In Europe 20 000 pairs breed in the coastal areas of Norway, Sweden and Finland, with a very small population in Denmark.

Figure 35. Distribution of Turnstones *Arenaria interpres* in Europe.





Figure 36. Distribution of Red-necked Phalaropes *Phalaropus lobatus* in Europe.

Red-necked Phalarope *Phalaropus lobatus* (Figure 36). The monotypic Red-necked Phalarope is a northern breeding species. Its European strongholds are in Iceland (50 000 - 100 000 pairs) and in Sweden (50 000 pairs). Elsewhere there are smaller breeding populations in Finland and Norway, and very small populations on the Faroe Islands and in Scotland.

Grey Phalarope *Phalaropus fulicarius* (no map). Grey Phalaropes have a circumpolar breeding distribution. There are small breeding populations found on Ellesmere Island, Greenland, Svalbard, and also in Iceland (<100 pairs).



## 5.2. DISCUSSION

This survey with its first assessment of population sizes of breeding waders throughout most of Europe, has highlighted several features of the distribution and size of the populations. The high arctic is known to support major breeding populations of waders. This survey has clearly identified subarctic and temperate Europe also as supporting very large populations of breeding waders. In total at least 6.5 million pairs of waders breed in the parts of Europe covered by this survey. By comparison, Meltofte (1985) estimated that the population of breeding waders in high arctic Greenland and Ellesmere Island was only c. 100 000 pairs, although he considered that this was an underestimate.

The comparisons of population sizes in different countries highlight the great importance of Iceland as a focus of the breeding populations of many species, especially Ringed Plover, Golden Plover, Purple Sandpiper, Dunlin (*schinzii* ssp.), Snipe, Black-tailed Godwit (*islandica* ssp.), Whimbrel, Redshank and Red-necked Phalarope. For southern breeding species such as Black-winged Stilt, Stone Curlew, Collared Pratincole and Kentish Plover, Portugal and Spain (even just the small area surveyed here) are very important breeding grounds. Fennoscandia is the major breeding area in Europe for many species, notably the large populations of tringid sandpipers such as Common Sandpiper, Green Sandpiper, Wood Sandpiper, Spotted Redshank and Greenshank. Fennoscandia also supports the main breeding populations of mainland Europe of many other species.

Despite its relatively small area, The Netherlands is a major breeding area for several European waders, especially Oystercatcher, Avocet, Lapwing and Redshank, and has about 85% of European breeding Black-tailed Godwits. Great Britain has the largest breeding populations of Lapwings in

Europe, and has also a large population of Oystercatchers, the largest temperate population of Ringed Plovers, the only remaining large populations of temperate breeding Dunlins and Golden Plovers, and the only large populations of Woodcock and Curlew outside Fennoscandia.

The survey highlights also that for many species the bulk of the breeding population is restricted to just a few countries. Few breeding waders are widespread in Europe, exceptions being the Little Ringed Plover and the Lapwing, although even the latter is scarce in southern Europe. Thus habitat changes over even quite small parts of Europe could have major impacts on the breeding populations of many species of waders.

Table 4 lists the twenty most numerous breeding waders of Europe and the nearby Arctic, and suggests that species with coastal and estuarine wintering habitats may have generally smaller breeding populations than those which winter in the (perhaps more extensive) inland and freshwater habitats. Excluding Red-necked Phalarope, which winters at sea, and Greenshank, which occurs both coastally and inland, average rank numbers for coastal and inland wintering species are respectively 12.9 ( $n = 8$ ) and 7.8 ( $n = 10$ ). Although this difference is not statistically significant (Mann-Whitney  $U = 29$ ,  $p > 0.05$ ), it may repay further investigation.

An important step in interpreting breeding population figures such as those in this survey, is to compare the estimated breeding population with estimates of the number of wintering birds of the same populations. However, to do so on a European scale for most species requires much greater knowledge on the size and geographical origins of wintering wader populations and migratory routes than is presently available. Nevertheless, for a few

Table 4. The 20 most abundant breeding wader species of Europe and the nearby Arctic (see Figure 1), along with their main wintering habitats.

Rank	Species	Approximate total number of pairs (from Table 3)	Wintering habitat
1	Lapwing	869 000	inland
2	Common Sandpiper	882 000	inland
3	Snipe	841 000	inland
4	Golden Plover	609 000	inland
5	Wood Sandpiper	577 000	inland
6	Dunlin	371 000	coastal
7	Woodcock	347 000	inland
8	Redshank	268 000	coastal
9	Whimbrel	248 000	coastal
10	Ruff	247 000	inland
11	Oystercatcher	218 000	coastal
12	Red-necked Phalarope	150 000	(marine)
13	Green Sandpiper	133 000	inland
14	Black-tailed Godwit	133 000	inland
15	Curlew	125 000	coastal
16	Ringed Plover	115 000	coastal
17	Greenshank	109 000	inland (coastal)
18	Purple Sandpiper	66 000	coastal
19	Spotted Redshank	45 000	inland
20	Turnstone	44 000	coastal

species on limited breeding areas, such comparisons have been attempted. Van Dijk (1983) compared the breeding and wintering figures for West European breeding Oystercatchers and Redshanks, and found the two figures to be of the same order of size (provided that some simple assumptions on age structure were made). Meltofte (1985) estimated the size of the breeding populations (in pairs) in high arctic Greenland and Ellesmere Island for several species (Table 2) and then calculated the autumn population by multiplying by two and adding 1.5-2 fledged juveniles per pair and, for the late-maturing Turnstone and Knot, a further 50-60% of the juvenile number to represent the surviving one-year-old (non-breeding) young of the previous year. He then found that, apart from Turnstone, the estimates derived from breeding numbers were much lower than the estimates of population size on the wintering grounds, and suggested that his breeding estimates for high arctic Greenland and Ellesmere Island were too low.

The winter distribution and population sizes of Dunlins are known quite precisely. We know that almost all the one million Dunlins wintering along the Atlantic coast of Morocco belong to the two subspecies *schinzii* and *arctica* (Engelmoer et al. 1984, Pienkowski et al. 1985). Indeed, the birds wintering in Africa seem to be almost the entire populations of these subspecies. The *schinzii* race breeds in southwest Greenland (an unknown number of pairs), Iceland (300 000 pairs), Great Britain (9000 pairs) and around the Baltic Sea (less than 2000 pairs). The *arctica* race breeds only in high arctic Greenland (5000 pairs). If about one-quarter of the juvenile population remains on the wintering areas during their second summer, the non-breeding summering population in West Africa will be about 55 000 second year birds. With this many birds remaining on the wintering grounds, the total breeding population of 630 000 individuals would need to produce one young per pair per year for the numbers to equal the estimated wintering population. Since both above assumptions (young production and size of summering population) are reasonable (see e.g. Soikkeli 1967, 1970), at least for these two subspecies of Dunlin the emerging picture seems rather realistic. This finding holds the promise that it may eventually be possible to arrive at accurate, integrated, views of the distribution and size

of the population of many species of waders on both their breeding and wintering areas.

This survey has proved that it is feasible, with the help of an international group of co-operative (and committed) individuals, to arrive at reasonably accurate estimates of breeding population size on a continental scale. At most, previous breeding population surveys have been made for single countries. In fact, we know of no other example in ornithology in which breeding bird populations have been assessed on such a grand scale.

As such, this survey has greatly extended understanding of the size and distribution of waders breeding in Europe. Nevertheless, even this survey is incomplete in many respects and must be viewed as only a first assessment. We have highlighted that even some widespread and well-studied species (notably Woodcock) need much more attention before good estimates of their total breeding populations can be achieved.

Much future work is needed within the surveyed area to extend and refine the currently very rough estimates of population sizes of many species. Increased accuracy of estimates is a vital precursor to any attempt to use these estimates for evaluation of changes in the population sizes of waders on an international scale (cf. Prater 1981 for such evaluation for wintering waders). Equally pressing is the need to extend the geographical coverage of the survey, especially into southern and eastern Europe.

A major aim of this first attempt to summarise breeding populations of waders in Europe is to provide the direction and stimulus for further international survey work on breeding waders, as well as for more fundamental research on their breeding biology. Reference to the bibliography that follows reveals substantial gaps in the published information on many species. For example, the difficult-to-study tringid sandpipers of Fennoscandia may prove a suitably demanding challenge for comparative breeding biology studies.

*Breeding Waders in Europe* is only the start, and we hope that in a few year's time it will prove possible to update and greatly refine the estimates of breeding wader population sizes summarised here.

### 5.3. REFERENCES

- AHLEN, I. 1977. *Faunavard. Skogshögskolan-Naturvårdsverket, Liber Forlag/Allmanna Forlaget, Stockholm.* In Swedish.
- BAUER, S. and THIELCKE, G. 1982. Gefährdete Brutvogelarten in der BRD und im Land Berlin. *Vogelwarte* 31: 183-391.
- BEINTEMA, A.J., BEINTEMA-HIETBRINK, R.J. and MUSKENS, G.J.D.M. 1985. A shift in the timing of breeding in meadowbirds. *Ardea* 73: 83-89.
- BENGTHSON, S.-A. and BLOCH, D. 1983. Island bird population densities in relation to island use and habitat quality on the Faroe Islands. *Oikos* 41: 507-522.
- BLOCH, D. 1981. (Bird census in the Faeroe Islands, summer 1981. Preliminary report.) *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 75: 1-6. In Danish with English summary.
- CRAMP, S. and SIMMONS, K.E.L. (eds.) 1983. *The Birds of the Western Palearctic.* Vol.3. Oxford University Press, Oxford.
- DUBOIS, P.J. 1986. WSG International project on Black-winged Stilts: first progress report. *Wader Study Group Bull.* 46: 10-11.
- DUBOIS, P.J. and MAHEO, R. 1986. *Limicoles nicheurs de France.* Ligue Française pour la Protection des Oiseaux, Rochefort.
- DYBBRO, T. 1981. (A survey of wader populations in Denmark.) *Proc. 2nd. Nordic Congr. Orn.* 1979: 109-110. In Danish with English summary.
- DIJK, G. VAN 1983. De populatie-omvang (broedparen) van enkele weidevogelsoorten in Nederland en de omringende landen. [Breeding population size of some meadowbird species in The Netherlands and surrounding countries.] *Vogeljaar* 31: 117-133. In Dutch with English summary.
- ENGELMOER, M., PIERSMA, T., ALTBURG, W. and MES, R. 1984. The Banc d'Arguin (Mauritania). In Evans, P.R., Goss-Custard, J.D. and Hale, W.G. (eds.)

- Coastal Waders and Wildfowl in Winter*, pp. 293-310. Cambridge University Press, Cambridge.
- FRANEKER, J.A.VAN and CAMPHUIJSEN, C.J. 1984. *Report on Fulmarus glacialis expedition II, Jan Mayen, June - August 1983. Verslagen en Technische Gegevens ITZ*, Amsterdam, No. 39. 34pp.
- FULLER, R.J., REED, T.M., BUXTON, N.E., WEBB, A., WILLIAMS, T.D. and PIENKOWSKI, M.W. 1986. Populations of breeding waders Charadrii and their habitats on the crofting lands of the Outer Hebrides, Scotland. *Biol. Cons.* 37: 333-361.
- GALBRAITH, H., and FURNESS, R.W. 1983. Breeding waders on agricultural land. *Scott. Birds* 12: 148-153.
- GALBRAITH, H., FURNESS, R.W. and FULLER, R.J. 1984. Habitats and distribution of waders breeding on Scottish agricultural land. *Scott. Birds* 13: 98-101.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N., BAUER, K.M. and BEZZEL, E. 1975. *Handbuch der Vogel Mitteleuropas*, Vol. 6 Charadriiformes (1. Teil). Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N., BAUER, K.M. and BEZZEL, E. 1977. *Handbuch der Vogel Mitteleuropas*, Vol. 7 Charadriiformes (2. Teil). Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.
- GROMADZKA, J., STAWARCZYK, T. and TOMIAŁOJC, L. 1985. Breeding waders in Poland. *Wader Study Group Bull.* 43: 29-33.
- HANSEN, E.S. 1983. (Lapwing *Vanellus vanellus* nests in Medalland, S. Iceland, 1983.) *Bliki* 2: 42-43. In Icelandic with English summary.
- HANSEN, M. 1985. (The breeding populations of Black-tailed Godwit *Limosa limosa*, Dunlin *Calidris alpina*, Ruff *Philomachus pugnax*, and Avocet *Recurvirostra avosetta* in Denmark, 1980.) *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 79: 11-18. In Danish with English summary.
- HILDEN, O. and HYYTIA, K. 1981. (The population changes and present status of waders in Finland.) *Proc. 2nd. Nordic Congr. Orn.* 1979: 19-37. In Swedish with English summary.
- HOLZINGER, J. and SCHMID, G. (eds.). 1982. *Artenschutz-symposium Grosser Brachvogel. Beih. Veroff. Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg* 25: 1-124.
- JONSSON, P.E. 1983. (The Kentish Plover in Sweden - its status and breeding ecology.) *Anser* 22: 209-230.
- KALAS, J.A. and BYRKJEDAL, I. 1981. (The status of breeding waders Charadrii in Norway including Svalbard.) *Proc. 2nd. Nordic Congr.* 1979: 57-74. In Norwegian with English summary.
- MARTINEZ VILALTA, A. 1985. Breeding waders of the Iberian Peninsula. *Wader Study Group Bull.* 45: 35-36.
- MELTOFTE, H. 1985. Populations and breeding schedules of waders, Charadrii, in high arctic Greenland. *Meddr. Gronland, Biosci.* 16: 1-43.
- MJELSTAD, H. and SAETERSDAL, M. 1986. Density, population size and breeding distribution of Spotted Redshank *Tringa erythropus*, Bar-tailed Godwit *Limosa lapponica* and Jack Snipe *Lymnocryptes minimus* in Norway. *Fauna norv. Ser. C., Cinclus* 9: 13-16.
- PIENKOWSKI, M.W., EVANS, P.R. and TOWNSEND, D.J. 1985. Leap-frog and other migration patterns of waders: a critique of the Alerstam and Hogstedt hypothesis, and some alternatives. *Ornis Scand.* 16: 61-70.
- PRATER, A.J. 1981. *Estuary Birds of Britain and Ireland*. Poyser, Calton.
- REED, T.M. 1985. Estimates of British breeding wader populations. *Wader Study Group Bull.* 45: 11-12.
- REED, T.M., LANGSLOW, D.R. and SYMONDS, F.L. 1983. Breeding waders of the Caithness flows. *Scott. Birds* 12: 180-186.
- RUITENBEEK, W. 1985. *De Kluut Recurvirostra avosetta*). Wet. Med. KNNV Nr. 169, Hoogwoud. In Dutch with English summary.
- SCHIFFERLI, A., GEROUDET, P. and WINKLER, R. (eds.) 1980. *Verbreitungsatlas der Brutvogel der Schweiz*. Schweizerische Vogelwarte, Sempach.
- SMITH, K.W. 1983. The status and distribution of waders breeding on wet lowland grasslands in England and Wales. *Bird Study* 30: 177-192.
- SOIKKELI, M. 1967. Breeding cycle and population dynamics of the Dunlin (*Calidris alpina schinzii*) in Finland. *Ann. Zool. Fenn.* 4: 158-198.
- SOIKKELI, M. 1970. Mortality and reproductive rates in a Finnish population of Dunlin *Calidris alpina*. *Ornis Fenn.* 47: 149-158.
- STROUD, D.A. and REED, T.M. 1986. The effect of plantation proximity on moorland breeding waders. *Wader Study Group Bull.* 46: 25-28.
- TEIXEIRA, R.M. (ed.) 1979. *Atlas van de Nederlandse broedvogels*. Natuurmonumenten, 's-Graveland. In Dutch.
- THOLIN, C. 1982. [The occurrence of the Black-tailed Godwit *Limosa limosa*, in the breeding season on Oland.] *Calidris* 11: 231-256. In Swedish.
- ULFSTRAND, S. and HOGSTEDT, G. 1976. (How many birds breed in Sweden?) *Anser* 15: 1-32. In Swedish with English summary.
- VOET, H., MEEUS, H. and MAES, P. 1982. *Broedvogelinventarisatie van de steltlopers in Vlaanderen - 1981. [Breeding waders survey of Flanders - 1981.]* Wielewaal 48: 201-218. In Flemish with English summary.
- WAHLSTEDT, J. 1984. *Skyddsvard natur in Norrbottens lan. Del II. Lapplandsdelen. Var Fagelvarld* 43: 143-160. In Swedish.



## 6. BIBLIOGRAPHY

### 6.1. GENERAL BREEDING BIOLOGY

- BEINTEMA, A.J., BEINTEMA-HIETBRINK, R.J. & MUSKENS, G.J.D.M. 1985. A shift in the timing of breeding in meadow birds. *Ardea* 73: 83-89.
- BEZZEL, E. 1985. *Kompendium der Vogel Mitteleuropas. Nonpasseriformes, Nichtsingvogel*. AULA-Verlag, Wiesbaden, 792 pp.
- BIANKI, V.V. 1977. *Gulls, Shorebirds and Alcids of Kandalaksha Bay*. Proc. Kandalaksha Stat. Reserv. No. 6. Israel Progr. Sci. Transl., Jerusalem, 250 pp.
- BOYD, H. 1962. Mortality and fertility of European Charadrii. *Ibis* 104: 368-387.
- BRANDSMA, O.H. 1986. Bijzondere waarnemingen van vogelwachters. [Special observations on nesting meadowbirds, 1981-1984.] *Vanellus* 39: 7-11. In Dutch.
- BURGER, J. 1983. Are shorebirds marine birds? *Wader Study Group Bull.* 39:57. Abstract.
- BURGER, J. 1984. Shorebirds as marine animals. In: Burger, J. & Olla, B.L. (eds.) *Shorebirds. Breeding behavior and populations*. Plenum Press, New York, pp. 17-82.
- BURGER, J. & OLLA, B.L. (eds.) 1984. *Shorebirds. Breeding behavior and populations*. (Behavior of Marine Animals, Vol. 5). Plenum Press, New York, 430 pp.
- CHERNOV, Yu.I. 1985. *The living tundra*. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 213 pp.
- DRENT, R.H. & DAAN, S. 1980. The prudent parent: energetic adjustments to avian breeding. *Ardea* 68: 225-252.
- CRAMP, S. & SIMMONS, K.E.L. (eds.) 1983. *The Birds of the Western Palearctic. Vol. III. Waders to Gulls*. Oxford University Press, Oxford, 913 pp.
- FESTETICS, A. 1971. Ornithologische Probleme pannonicischer Sodalacken. *Oster. Akad. Wiss., math.-naturwiss. kl. Abt, I, Bd. 179*.
- FJELDSA, J. 1977. *Guide to the young of European precocial birds*. Skarv, Tisvildeleje, 283 pp.
- FRISCH, O.von. 1959. Zur Jugendentwicklung, Brutbiologie und Vergleichende Ethologie der Limikolen. *Z. Tierpsychol.* 16: 545-583.
- GEROUDET, P. 1982. *Limicoles, gangas et pigeons d'Europe*. Delachaux & Niestle, Neuchatel-Paris, 240 pp.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N., BAUER, K.M. & BEZZEL, E. 1975. *Handbuch der Vogel Mitteleuropas. Vol. 6. Charadriiformes (1 Teil)*. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N., BAUER, K.M. & BEZZEL, E. 1977. *Handbuch der Vogel Mitteleuropas. Vol. 7. Charadriiformes (2 Teil)*. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 893 pp.
- GRANT, G.S. 1982. Avian incubation: egg temperature, nest humidity and behavioral thermoregulation in a hot environment. *Orn. Monogr.* 30, 75 pp.
- HALE, W.G. 1979. The background to studies on breeding waders. *Wader Study Group Bull.* 26:23.
- HALE, W.G. 1980. *Waders*. New Naturalist 65, Collins, London, 320 pp.
- HARRISON, C. 1982. *An Atlas of the Birds of the Western Palearctic*. Collins, London, 322 pp.
- HOWE, M.A. 1983. Breeding ecology of North American shorebirds: patterns and constraints. In: Boyd, H. (ed.) *First western hemisphere waterfowl and waterbird symposium, IWWRB*: 95-100.
- JOHNSGARD, P.A. 1981. *The Plovers, Sandpipers and Snipes of the World*. University of Nebraska Press, Lincoln, 493 pp.
- KHLEBOSOLOV, E.I. 1985. (The territorial behaviour and its relation to the postnesting ecology in some tundra Limicolae.) *Zool. Zh.* 64: 1024-1035. In Russian with English summary.
- LACK, D. 1968. *Ecological adaptations for breeding in birds*. Methuen, London.
- LARSON, S. 1955. (Tertiary and pleistocene differentiation in the suborder Charadrii.) *Var Fagelvarld* 14: 65-78. In Swedish with English summary.
- LARSON, S. 1957. The suborder Charadrii in Arctic and Boreal areas during the tertiary and pleistocene. *Acta Vertebr.* 1: 6-84.
- MILLER, E.H. 1984. Communication in breeding shorebirds. In: Burger, J. & Olla, B.L. (eds.) *Shorebirds Breeding Behavior and populations*. Plenum Press, New York, pp. 169-242.
- MYERS, J.P., HILDEN, O. & TOMKOVICH, P. 1982. Exotic *Calidris* species of the Siberian tundra. *Ornis Fenn.* 59: 175-182.
- PLESKE, T. 1928. Birds of the Eurasian tundra. *Mem. Boston Soc. Nat. Hist.* 6: 107-485.
- SALOMONSON, F. 1972. Zoogeographical and ecological problems in arctic birds. *Proc. 15th Int. Orn. Congr.*, Leiden: 25:77.
- SOOTHILL, E. & SOOTHILL, R. 1982. *Wading Birds of the World*. Blandford, Poole, Dorset, 334 pp.
- STEINIGER, F. 1959. *Die Grossen Regenpfeifer, Charadriinae*. Die Neue Brehm-Bucherei, Band 240. Wittenberg-Lutherstadt, 90 pp.
- USPENSKI, S.M. 1969. *Die Strandläufer Eurasiens, Calidris spec.* Die Neue Brehm-Bucherei, Band 420, Wittenberg-Lutherstadt, 78 pp.
- VAISANEN, R.I. 1977. Geographic variation in timing of breeding and egg size in light European species of waders. *Ann. Zool. Fenn.* 14: 1-25.



## 6.2. HABITAT SELECTION

- BEINTEMA, A.J. 1975. Biotopgestaltung für Wiesen vogel. Schr. R. Landschaftspfl. Natursch. 12: 121-126.
- BIOLOGISCHE STATION "RIESELFELDER". 1981. Die Rieselfelder Munster - Europareservat für Wat- und Wasservogel. Selbstverlag der Biologische Station, Coermuhle 181, 4400 Munster, 216 pp.
- BIOLOGISCHE STATION "RIESELFELDER MUNSTER". 1983. Zum Biotop management im Europe reservat "Rieselfelder Munster". Natur und Landschaft 58: 123-128.
- CONNORS, P.G., MYERS, J.P. & PITELKA, F.A. 1979. Seasonal habitat use by arctic Alaskan shorebirds. Studies Avian Biol. 2: 101-111.
- DIJKEMA, K.S. (ed.) 1984. Salt marshes in Europe. Council of Europe, Europ. Comm. Conserv. Nature Natural Resources, Strasbourg, 178 pp.
- ELVELAND, J. & TJERNBERG, M. 1984. (The vegetation on some display grounds of the Great Snipe, *Gallinago media*, in Sweden.) Mem. Soc. Fauna Flora Fenn. 60: 125-140. In Swedish with English summary.
- FERNS, P.N. 1978. Ecological distribution of wading birds. In: Green, G.H. & Greenwood, J.J.D. (eds.) Joint biological expedition to North East Greenland 1974, pp. 79-84. Dundee University Printing Unit.
- FERNS, P.N. 1979. Resource partitioning amongst breeding waders in N.E. Greenland. Wader Study Group Bull. 26:24.
- FERNS, P.N. 1983. Habitat selection of breeding waders. Wader Study Group Bull. 39:41. Abstract.
- FULLER, R.J. 1982. Bird habitats in Britain. Poyser, Calton, 320 pp.
- GLUE, D.E. 1971. Saltmarsh reclamation stages and their associated bird life. Scot. Birds 18: 187-198.
- JARVINEN, O. & VAISANEN, R.A. 1978. Habitat distribution and conservation of land bird populations in northern Norway. Hol. Ecol. 1: 351-361.
- JARVINEN, O. & VAISANEN, R.A. 1978. Ecological zoogeography of North European waders, or why do so many waders breed in the North? Oikos 30: 496-507.
- JESCHKE, L. 1982. Salzgrasland als Vogelbiotop. Meer und Museum 3: 40-51.
- KANTRUD, H.A. & KOLOGISKI, R.L. 1982. Effects of soils and grazing on breeding birds of uncultivated upland grasslands of the Northern great plains. USFWS, Wildl. Res. Rept. 15, 33 pp.
- LARSEN, L.G. & MOLLER, H.S. 1978. The structure of some Central European bird communities in habitats of different moisture and degree of human utilization. Proc. First Nordic Congr. Ornithol., Anser, Suppl. 3: 129-135.
- LARSON, S. 1960. On the influence of the Arctic Fox *Alopex lagopus* on the distribution of arctic birds. Oikos 11: 276-305.
- MACLEAN, G.L. 1982. Opportunistic breeding of plovers under manipulated conditions. Ostrich 53: 52-54.
- MOLLER, H.S. 1975. Danish salt-marsh communities of breeding birds in relation to different types of management. Ornis Scand. 6: 125-133.
- PIENKOWSKI, M.W. 1983. Habitat specialization in breeding shorebirds: a defence against egg-predation? Wader Study Group Bull. 39:50.
- VOOUS, K.H. 1965. Geographische herkomst van de Nederlandse weidevogelgemeenschap. [Geographical origin of the Dutch meadow-bird community.] Vogeljaar 13: 496-504. In Dutch.

## 6.3. MATING SYSTEMS

- CARTAR, R.V. 1983. Testes and mating systems: evidence from sandpipers. Wader Study Group Bull. 37:40. Abstract.
- EMLEN, S.T. & ORING, L.W. 1977. Ecology, sexual selection and the evolution of mating systems. Science 197: 215-223.
- ERCKMANN, W.J., Jr. 1981. The evolution of sex-role reversal and monogamy in shorebirds. Ph.D. dissertation, Univ. Washington, 331 pp.
- ERCKMANN, W.J. 1983. The evolution of polyandry in shorebirds: An evaluation of hypotheses. In: Wasser, S.K. (ed.) Social behaviour of female vertebrates. Academic Press, New York, pp. 113-168.
- GRAUL, W.D., DERRICKSON, S.R. & MOCK, D.W. 1977. The evolution of avian polyandry. Am. Nat. 111: 812-816.
- GRAUL, W.D., MOCK, D.W. & DERRICKSON, S.R. 1981. The evolution of avian polyandry: two hypotheses. Wader Study Group Bull. 33:40. Abstract.
- HILDEN, O. 1975. Breeding system of Temminck's Stint *Calidris temminckii*. Ornis Fenn. 52: 117-146.
- HOLMES, R.T. 1971. Density, habitat and the mating system of the Western Sandpiper (*Calidris mauri*). Oecologia 7: 191-208.
- JARVINEN, O. 1975. Appendix: Testing the strength of the pair bond. Ornis Fenn. 52: 145-146.
- JEHL, J.R., Jr. 1970. Sexual selection for size differences in two species of sandpipers. Evolution 24: 311-319.
- JEHL, J.R., Jr. & MURRAY, B.G., Jr. 1983. Sexual size dimorphism in shorebirds. Wader Study Group Bull. 39:58. Abstract.
- JENNI, D.A. 1974. Evolution of polyandry in birds. Am. Zool. 14: 129-144.
- JENNI, D. 1979. Female chauvinist birds. New Sci. 82: 896-899.
- LENINGTON, S. 1980. Bi-parental care in killdeer: an adaptive hypothesis. Wilson Bull. 92: 8-20.
- LENINGTON, S. 1984. The evolution of polyandry in shorebirds. In: Burger, J. & Olla, B.L. (eds.) Shorebirds. Breeding behavior and populations. Plenum Press, New York, pp. 149-168.
- MYERS, J.P. 1980. On cross-seasonal interactions in the evolution of sandpiper social systems. Wader Study Group Bull. 30:36. Abstract.
- MYERS, J.P. 1982. Cross-seasonal interactions in the evolution of sandpiper social systems. Behav. Ecol. Sociobiol. 8: 195-202.
- NOL, E. 1983. Sex roles in the American Oystercatcher. Wader Study Group Bull. 39:60. Abstract.
- ORIANS, G.H. 1969. On the evolution of mating systems in birds and mammals. Am. Nat. 103: 589-603.

- ORING,L.W. & LANK,D.B. 1983. The role of experience in a polyandrous mating system. *Proc. N.D. Acad. Sci.* 37:83.
- ORING,L.W. & LANK,D.B. 1984. Breeding area fidelity, natal philopatry, and the social systems of sandpipers. In: Burger,J. & Olla,B.L. (eds.) *Shorebirds. Breeding behavior and populations.* Plenum Press, New York, pp. 125-148.
- PARMELEE,D.F. & PAYNE,R.B. 1973. On multiple broods and the breeding strategy of arctic Sanderlings. *Ibis* 115: 218-226.
- PIENKOWSKI,M.W. & GREENWOOD,J.J.D. 1979. Why change mates? *Biol. J. Linn. Soc.* 12: 85-94.
- PITELKA,F.A., HOLMES,R.T. & MACLEAN,S.F. 1974. Ecology and evolution of social organization in arctic sandpipers. *Am. Zool.* 14: 185-204.
- RHIJN,J.VAN. 1983. Kemphanen, strandlopers en andere steltlopers. [Ruffs, sandpipers and other waders.] *Vogels* 3: 106-109. In Dutch.
- RHIJN,J.VAN. 1984. Phylogenetical constraints in the evolution of parental care strategies in birds. *Neth. J. Zool.* 34: 103-122.
- RHIJN,J.G.VAN. 1984. Reproductive strategies of Ruffs, waders and the other birds. *Wader Study Group Bull.* 40: 31-32. Abstract.
- RHIJN,J.VAN. 1985. A scenario for the evolution of social organization in Ruffs *Philomachus pugnax* and other Charadriiform species. *Ardea* 73: 25-37.
- RIDLEY,M. 1978. Paternal care. *Anim. Behav.* 26: 904-932.
- SPJOTVOLL,O. 1977. (Observations on the breeding of various species during a heavy snowfall in June 1971 in the Doore mountain area, south central Norway.) *Sterna* 11: 97-104. In Norwegian with English summary. Waders with biparental care incubated successfully, those with uniparental care did not.
- TOMKOVICH,P.S. 1984. [Adaptations in social organisation of tundra birds: Calidritine sandpipers.] In: Martin,J., Matveyeva,n., Piin,T., Semyonova,V. & Chernov,J. (eds.) *[Adaptations of organisms to the arctic environments.]* Tallin, pp. 173-177. In Russian.
- WERREN,J.H., GROSS,M.R. & SHINE,R. 1979. Paternity and the evolution of male parental care. *J. Theor. Biol.* 82: 619-631.

## 6.4. EGGS AND YOUNG

- ALBERTO,L.J. & NADAL,J. 1981. Residuos organoclorados en huevos de diez especies de aves del delta del Ebro. [Organochlorine residues in eggs of 10 bird species collected in Ebro delta.] *P. Dept. Zool. Barcelona* 6: 73-83. In Spanish.
- ANDERSEN,F.S. 1957. Egg size and the age composition of bird populations. *Vidensk. Medd. Dansk Naturh. Foren.* 119: 1-23.
- ANDERSSON,M. 1978. Optimal egg shape in waders. *Ornis Fenn.* 55: 105-109.
- BECKER,P.H., BUTHE,A. & HEIDMANN,W. 1985. (Pollutants in eggs of birds breeding at the German North Sea coast. I. Organochlorides.) *J. Orn.* 126: 29-51. In German with English summary.
- BEINTEMA,A.J. 1983. Growth and mortality in chicks of meadowbirds. *Wader Study Group Bull.* 39:46. Abstract.
- BYRKJEDAL,I. & KALAS,J.A. 1985. Seasonal variation in egg size in Golden Plover *Pluvialis apricaria* and Dotterel *Charadrius morinellus* populations. *Ornis Scand.* 16: 108-112.
- CHAPPELL,M.A. 1980. Thermal energetics of chicks of arctic-breeding shorebirds. *Comp. Biochem. Physiol.* 65A: 311-317.
- ELLIOT,R.D. 1982. Dispersion of lapwing nests in relation to predation and anti-predator defence. Ph.D. thesis, Univ. Aberdeen, Aberdeen.
- FABRITIUS,H.E. 1980. De levenskansen van de eieren en kuikens van weidevogels. [The survival of eggs and chicks of meadowbirds.] In: Klomp,H., Woldhek,S. & de Bruin,C. (eds.) *Weidevogels in de verdrukking. Vogelbescherming, Zeist.* pp. 61-66. In Dutch.
- FERNS,P.N., THOMAS,C.J. & HACK,P.C. 1983. Why are waders like Topsy? *Wader Study Group Bull.* 39:41. Abstract.
- FINKERNAGEL,K. 1960. Schneppfe tragt Jungvogel. *Egretta* 3:37.
- FORSYTHE,D.M. 1973. Growth and development of Long-billed Curlew chicks. *Auk* 90: 435-438.
- GREEN,G.H. 1978. Waders' eggs. In: Green,G.H. & Greenwood,J.J.D. (eds.) *Joint Biological Expedition to North East Greenland 1974.* Dundee University Printing Unit, pp. 110-120.
- GREEN,G.H. 1978. Growth rates of wader chicks. In: Green,G.H. & Greenwood,J.J.D. (eds.) *Joint Biological Expedition to North East Greenland 1974.* Dundee University Printing Unit, pp. 121-125.
- HILLS,S. 1980. Incubation capacity as a limiting factor of shorebird clutch size. *Am. Zool.* 20:744.
- HILLS,S. 1981. Incubation capacity as a limiting factor of shorebird clutch size. *Wader Study Group Bull.* 33:39. Abstract.
- HOCKEY,P.A.R. 1984. Growth and energetics of the African Black Oystercatcher *Haematopus moquini*. *Ardea* 72: 111-117.
- INNES,J.L. 1979. Wader eggs and growth rates of wader chicks. In: Innes,J.L. (ed.) *Cambridge Norwegian Expedition 1978 Report*, pp. 80-95. Cambridge.
- JEHL,J.R.,Jr. 1968. The egg tooth of some charadriiform birds. *Wilson Bull.* 80: 328-330.
- JEHL,J.R.,Jr. 1971. Patterns of hatching success in subarctic birds. *Ecology* 52: 169-173.
- MACLEAN,G.L. 1972. Clutch size and evolution in the Charadrii. *Proc. XVth. Int. Orn. Congr., Leiden:* 666-667.
- MACLEAN,G.L. 1972. Clutch size and evolution in the Charadrii. *Auk* 89: 299-324.
- RICKLEFS,R.E. 1980. Growth and development of endothermy in shorebirds (Charadriidae and Scolopacidae). *Wader Study Group Bull.* 30:36. Abstract.
- RICKLEFS,R.E. 1984. Egg dimensions and neonatal mass of shorebirds. *Condor* 86: 7-11.
- ROCA,P., SAINZ,F., GONZALEZ,M. & ALEMANY,M. 1984. Structure and composition of the eggs from several avian species. *Comp. Biochem. Physiol.* 77A: 307-310. Data on Snipe eggs.


- ROSS, H.A. 1979. Multiple clutches and shorebird egg and body weight. *Amer. Nat.* 113: 618-622.
- ROUDYBUSH, T.E., GRAU, C.R., PETERSEN, M.R., AINLEY, D.G., HIRSCH, K.V., GILMAN, A.P. & PATTERSON, S.M. 1979. Yolk formation in some Charadriiform birds. *Condor* 81: 293-298.
- SAFRIEL, U.N. 1972. The significance of clutch size in nidifugous birds. *Proc. XVth. Int. Orn. Congr., Leiden*: 684.
- SAFRIEL, U.N. 1975. On the significance of clutch size in nidifugous birds. *Ecology* 56: 703-708.
- SHIPLEY, F.S. 1984. The 4-egg clutch limit in the Charadrii: an experiment with American Avocets. *Southwest Nat.* 29: 143-147.
- SONERUD, G.A. 1985. Brood movements in grouse and waders as defense against win-stay search in their predators. *Oikos* 44: 287-300.
- SORDAHL, T.A. 1982. Antipredator behavior of American Avocet and Black-necked Stilt chicks. *J. Field Orn.* 53: 315-325.
- THISSEN, J. 1984. Food of chicks of meadowbirds. *Wader Study Group Bull.* 40:30. Abstract.
- VAISANEN, R.A. 1977. Geographic variation in timing of breeding and egg size in eight European species of waders. *Ann. Zool. Fenn.* 14: 1-25.
- VAISANEN, R.A. 1978. Why measure eggs? A review. *Proc. First Nordic Congr. Orn.* 1977, *Anser*, Suppl. 3: 247-252. In Swedish with English summary.
- VAISANEN, R.A., HILDEN, O., SOIKKELI, M. & VUOLANTO, S. 1972. Egg dimension variation in five wader species: the role of heredity. *Ornis Fenn.* 49: 25-44.
- WALTERS, J.R. 1984. The evolution of parental behavior and clutch size in shorebirds. In: Burger, J. & Olla, B.L. (eds.) *Shorebirds. Breeding behavior and populations*. Plenum Press, New York, pp. 243-288.
- WINKLER, D.W. & WALTERS, J.R. 1983. The determination of clutch size in precocial birds. In: Johnston, R.F. (ed.). *Current Ornithology*, Vol. 1. Plenum Press, New York, pp. 33-68.

## 6.5. HUMAN INTERFERENCE

- ANONYMOUS. 1983. *Land drainage in England and Wales: an interim report*. Report R.S.P.B., Sandy.
- ARNHEM, R. 1977. De Nederlandse praktijk van het kievitseieren rapen. [The Dutch practice of collecting lapwing eggs.] *Argus* 2(1): 31-32. In Dutch.
- BANGMA, S. 1972. Resultaten met nestbeschermers in de omgeving van Grouw. [Results of nest-protectors near Grouw.] *Vanellus* 10: 213-215.
- BEINTEMA, A.J. 1976. Misvattingen rond rapport eierzoeken. [Misunderstandings about report on egg-collecting.] *Vanellus* 29: 76-79. In Dutch.
- BEINTEMA, A.J. 1977. Is het eierzoekprobleem relevant voor onze weidevogels? [Is the problem of egg-collecting relevant for our meadowbirds?] *Argus* 2(1): 25-27. In Dutch.
- BEINTEMA, A.J. 1977. Weidevogels bedreigd, maar waardoor? [Meadowbirds endangered, but why?] *Lepelaar* 49: 17-20. In Dutch.
- BEINTEMA, A.J. 1977. Eierzoeken en vogelbescherming. [Egg-collecting and bird protection.] *Vogeljaar* 25: 21-27. In Dutch.
- BEINTEMA, A.J. 1979. Hebben we over twintig jaar nog weidevogels? [Do we have still meadowbirds in 20 years time?] *Lepelaar* 61: 5-7. In Dutch.
- BEINTEMA, A.J. 1980. Terreineisen: biotoop vroeger en nu, recente biotoop-veranderingen, conflicten weidevogels - weidebouw. [Habitat, in the past and now, recent habitat-changes, conflicts between meadowbirds and agricultural practices.] In: Klomp, H., Woldhek, S. & de Bruin, C. (eds.) *Weidevogels in de verdrukking. Vogelbescherming*, Zeist, pp. 3-12. In Dutch.
- BEINTEMA, A.J. 1982. The decline of meadowbirds in the agricultural land in Holland. In: *Abstract of Symposia and Poster Presentations XVIII Congr. Int. Orn.*, Moscow: 96-97.
- BEINTEMA, A.J. 1984. Weidevogels als indicatoren. [Meadowbirds as indicators.] In: Best, E.P.H. & Haeck, J. (eds.) *Ecologische indicatoren voor de kwaliteitsbeoordeling van lucht, water, bodem en ecosystemen*. Pudoc, Wageningen, pp. 218-227. In Dutch.
- BEINTEMA, A.J. 1983. Wet meadows in temperate Europe, threatened by agriculture. In: Evans, P.R., Hafner, H. & L'Hermite, P. (eds.) *Shorebirds and Large Waterbirds Conservation EC Proceedings 1983*: 26-33.
- BENEDA, S. 1967. Zbytky vyroseneho lnu - nebezpeci pro mladata bahnaku. [Remains of the flax - danger for young waders.] *Ziva* 15:33. In Czech.
- BINSBERGEN, A. 1977. Kievitseieren rapen en de wet. [Lapwing egg collecting and the law.] *Argus* 2(1): 21-22. In Dutch.
- BIOLOGISCHE STATION "RIESENFELDER MUNSTER". 1981. Rapider Bestandsrückgang des Kiebitzes (*Vanellus vanellus*). *Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz* 21: 31-34.
- BOERSEMA, J.J. 1980. Kunnen weidevogels en baksteenindustrie hetzelfde biotoop gebruiken? [Can meadowbirds and brick-industry use the same habitat?] In: Klomp, H., Woldhek, S. & de Bruin, C. (eds.) *Weidevogels in de verdrukking. Vogelbescherming*, Zeist, pp. 49-52. In Dutch.
- BOSTROM, U. 1978. (The effects of wetland drainage on the bird fauna.) *Anser. Suppl.* 3: 52-56. In Swedish with English summary.
- BOTTEMA, S. 1978. Verlies aan kievitseieren door vorst en andere oorzaken. [Loss of lapwing eggs by frost and for other reasons.] *Vanellus* 31: 162-166. In Dutch.
- BRTEK, L. 1977. Vplyv chemizacie polnohospodarstva na bahniaky. [The effect of using of chemicals in agriculture on waders.] *Polov. studie VULH Zvolen* 1977(5): 35-38. In Czech.
- BUXTON, N.E. 1983. The breeding wader population of the Western Isles and the Integrated Development Programme. *Wader Study Group Bull.* 39:48.
- CADBURY, C.J. & HOUSDEN, S. 1982. Outer Hebrides - threat to breeding waders. *Wader Study Group Bull.* 35:5.
- EMANUELSSON, U. & KJELLEN, N. 1985. (Proposals for preserving the Dunlin in Skane.) In: Tjernberg, M. (ed.) *(The Southern Dunlin Calidris alpina schinzii in Sweden.)*


- Statens naturvardsverk, Solna, pp. 20-34. In Swedish with English summary.
- EMANUELSSON,U. & JONSSON,P.E. 1985. (The Dunlin and pastured wetlands - an urgent matter of nature conservation?) In: Tjernberg,M. (ed.) (*The Southern Dunlin Calidris alpina schinzii in Sweden.*) Statens naturvardsverk, Solna, pp. 76-80. In Swedish with English summary.
- EIJERMAN,C. 1975. De problematiek van onze weidevogelgebieden. [The problems of our meadowbird areas.] *Vogeljaar* 23: 105-107. In Dutch.
- FESTETICS,A. 1970. Einfluss der Beweidung auf Lebensraum und Tierwelt am Neusiedlersee. *Zool. Anz.* 184: 1-17.
- FESTETICS,A. 1970. Entstehung und Ziele der "Pannonicischen Arbeitsgemeinschaft des IWRB" (mit einem Fragebogen und praktischen Vorschlagen für das Neusiedlerseegebiet und die Hortobagy Duszta im Anhang). *Wiss. Arb. Burgenland* 44: 387-436.
- FESTETICS,A. 1971. Das Niedermoor "Hansag" - Vorschlag zu einem burgenländischen Adler-und-Trappen-reservat. *Natur und Land* 57: 125-135.
- FLEGG,J.J.M. 1975. Bird population and distribution changes and the impact of man. *Bird Study* 22: 191-202.
- FOKKEMA,J. 1979. Het effect van de nazorg. [The effects of human nest-protection.] *Vanellus* 32: 170-181. In Dutch.
- FULLER,R. & BUXTON,N. 1982. Machair under threat: unique and fragile habitats. *BTO News* 122:5.
- GELD,J.VAN DER. 1981. Weidevogels en weidevogelbescherming in de Schaaalsmeer polder. [Meadowbirds and their protection in the Schaalmeerpolder, North Holland.] *Graspieper* 1: 54-59. In Dutch.
- GELD,J. VAN DER. 1982. Wat veranderde er in 30 jaren tijd in het Wormer- en Jisperveld? [What changed in 30 years in Wormer and Jisperveld?] *Grutter* 6: 55-59. In Dutch.
- GELDER,A.D.E. 1980. De invloed van de Ruilverkaveling "Alblasserwaard" op de weidevogelpopulatie in het gelijknamige gebied. [The influence of agricultural improvements on the meadowbird populations in the Alblasserwaard.] In: Klomp,H., Woldhek,S. & de Bruin,C. (eds.) *Weidevogels in de verdrukking*. Vogelbescherming, Zeist, pp. 71-80. In Dutch.
- GLUE,D.E. 1971. Saltmarsh reclamation stages and their associated birdlife. *Bird Study* 18: 187-198.
- GORTEN,H.P. 1974. Weidevogelstrategie. [Meadowbird strategy.] *Vogeljaar* 22: 645-651.
- GRUNDE,T. 1973. Gefährdung von Limikolenkuken durch Rinder. *Charadrius* 9:18.
- GULDERMOND,A. & TANGER,D. 1986. Het effect van intensief graslandbeheer in Waterland op weidevogels. [Effects of intensive agricultural practices on meadowbirds in Waterland.] *Vogeljaar* 34: 1-16. In Dutch.
- HENDRIKSE,C.J., OOSTERVELD,E., VAN OS,B.L.J. & WURING,G. 1984. De invloed van de ruilverkavelingen 'Rolle' en 'Anloo' op de weidevogelstand. [The influence of agricultural improvement programmes (Rolle and Anloo) on meadowbird populations.] *Vogeljaar* 32: 194-200. In Dutch.
- HENDRIKSMA,J.T. 1967. De nazorg. [Nest and egg protection.] *Vanellus* 20: 61-67. In Dutch.
- HENDRIKSMA,J.T. 1977. Kan een natuurbeschermer eirapper zijn? [Can a nature conservationist be egg collector?] *Argus* 2(1): 28-30. In Dutch.
- HOOGENHOUT,H. 1970. Het instellen van weidevogelreservaten. [Creation of meadowbird reserves.] *Vogeljaar* 18: 258-263.
- HOUSDEN,S. 1982. The EEC and machair development. *BTO News* 122: 4-5.
- JONG,H.DE. 1976. Over het beheer van weidevogel populaties, mede in relatie tot landinrichtingsprojekten, in het bijzonder in Noord-Holland. [On the management of meadowbird populations.] *Cultuurtechn. Tijdschrift* 16(3): 97-113. In Dutch.
- JONG,H.DE. 1977. Experiences with the man-made meadowbird reserve "Kievitslanden" in Flevoland (The Netherlands). *Biol. Cons.* 12: 13-31.
- JONG,H.DE. 1980. Over het beheer van weidevogelreservaten. [On the management of meadowbird reserves.] In: Klomp,H., Woldhek,S. & de Bruin,C. (eds.) *Weidevogels in de verdrukking*. Vogelbescherming, Zeist, pp. 23-32. In Dutch.
- JONG,H.DE. 1972. De nestbeschermmer. [The nest-protection apparatus.] *Vanellus* 25: 52-55. In Dutch.
- JONGSMA,J.M. 1980. Ander arderzoek hard nodig! [Different studies badly needed!] In: Klomp,H., Woldhek,S. & de Bruin,C. (eds.) *Weidevogels in de verdrukking*. Vogelbescherming, Zeist, pp. 39-48. In Dutch.
- KAMP,H. 1984. Kieviten in de verdrukking. [Endangered lapwings.] *Vanellus* 37: 42-44. In Dutch.
- KAMP,H. 1983. Sloterdijkse kieviten houden met moeite stand. Enkele bijzonderheden over het broedseizoen 1982. [There are still lapwings in Sloterdijk. Some remarks on breeding since 1982.] *Vanellus* 36: 13-16. In Dutch.
- KIEVITENCOMMISSIE. 1976. Enquête over het rapen van kievitsereren. [Enquiry on the collecting of Lapwing eggs.] *Argus* 1(4): 13-15. In Dutch.
- KLOMP,H. 1977. Kievitseieren rapen populatie - biologisch gezien. [Collecting lapwing eggs - a biological point of view.] *Argus* 2(1): 23-25.
- KLOMP,H., WOLDHEK,S. & DE BRUIN,C. (eds.) 1980. *Weidevogels in de verdrukking*. [Endangered meadowbirds.] Uitgave Vogelbescherming, Zeist, 121 pp. In Dutch.
- KOY,L.P.V.VAN DER. 1980. De weidevogelstand in het Beusichemse Veld voor en na de ruilverkaveling. [Meadowbirds in the Beusichemse Veld before and after agricultural improvements.] In: Klomp,H., Woldhek,S. & de Bruin,C. (eds.) *Weidevogels in de verdrukking*. Vogelbescherming, Zeist, pp. 89-90. In Dutch.
- LANGSLOW,D.R. 1983. The impacts of afforestation on breeding shorebirds and raptors in the Uplands of Britain. In: Evans,P.R., Hafner,H. & L'Hermite,P. (eds.) *Shorebirds and Large Waterbirds Conservation*, EC Proceedings 1983: 17-25.
- LOORIJ,T. 1979. Kievitseieren 1979. [Lapwing eggs 1979.] *Argus* 4: 7-9. In Dutch.
- MATTER,H. 1982. Einfluss intensiver Feldbewirtschaftung auf den Bruterfolg des Kiebitzes (*Vanellus vanellus*) in Mitteleuropa. *Orn. Beob.* 79: 1-24.
- MURTON,R.K. & WESTWOOD,N.J. 1974. Some effects of agricultural change on the English avifauna. *Brit. Birds* 67: 41-69.
- NORDERHAUG,M. 1979. Problems in Arctic conservation. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 73: 59-68.
- OKILL,J.D. 1982. 10-year Agricultural plan for Scotland. *Wader Study Group Bull.* 36:6.
- PAASSEN,A.VAN. 1982. Actief beheer gevraagd

- voor onze weidevogels. [Active management needed for our meadowbirds.] *Natuur & Milieu* (juni 1982): 6-9. In Dutch.
- PAASSEN,A.G.VAN. 1983. Aktief weidevogelbeheer. [Active meadowbird management.] *Vanellus* 36: 74-77. In Dutch.
- PEETSMA,J. 1978. Nazorg of weldwerk? [Egg and nest protection or fieldwork?] *Vanellus* 31: 38-41. In Dutch.
- PETTERSON,B. 1980. Changes in the bird fauna as a consequence of experimentally created openings in the vegetation cover of Lake Hornborgasjon. *Var Fagelvard* 39: 397-404.
- PIENKOWSKI,M.W. 1983. The impact of tourism on coastal breeding shorebirds in Western and Southern Europe: an introduction to general discussion. In: Evans,P.R., Hafner,H. & L'Hermite,P. (eds.) *Shorebirds and Large Waterbirds Conservation EC Proceedings* 1983: 36-42.
- ROL,W. 1982. Relatie weidevogels - landbouw. [Relation meadowbirds-agriculture.] *Grutter* 6: 3-10. In Dutch.
- ROOS,G.T.DE. 1981. The impact of tourism upon some breeding wader species on the Isle of Vlieland in the Netherlands' Wadden Sea. *Meded. Landbouwhogeschool Wageningen* 81(4): 1-131.
- ROOS,G.T.DE. 1982. The impact of tourism upon some wader species on a Dutch Wadden Island. In: Luck,G. & Michaelis,h. (eds.) *Ecological effects of tourism in the Wadden Sea*, pp. 109-126. Landwirtschaftsverlag, Munster.
- RUITENBEEK,W. & TANGER,D. 1983. Weidevogelbescherming een zaak van boeren en buitenlui. [Protection of meadowbirds: a problem for farmers and nature conservationists.] *Vogels* 3: 102-105. In Dutch.
- SCOTT,D.A. (ed.) 1982. *Managing Wetlands and Their Birds. A manual of wetland and waterfowl management*. Proceedings of the Third Technical Meeting on Western Palearctic Migratory Bird Management, held at the Biologische Station Rieselfelder Munster, Federal Republic of Germany, 12-15 October 1982. IWRB, Slimbridge, 360 pp.
- SMITH,K. 1981. Land drainage - the threat to our wetlands. *BTO News* 117: 4-5.
- SONDELL,J. 1978. (Restoration of waterfowl habitats at Lake Kvismaren, Central Sweden.) *Anser*, Suppl. 3: 217-224. In Swedish with English summary.
- SPAN,S. 1960. Iets over het gebruik van nestbeschermers en een middel tot afweer van kraaien. [On the use of nest-protectors and a way of scaring crows.] *Vanellus* 13: 79-99.
- SPAN,S. 1970. Hoe effectief nazorg kan zijn. [How effective nest-protectors can be.] *Vanellus* 23: 29-33.
- SPIJKERMAN,J. 1957. Het vee en onze weidevogels. [Cattle and our meadowbirds.] *Vanellus* 10: 177-178. In Dutch.
- STEINER,E. 1983. Die Auswirkungen von Meliorationsmassnahmen auf den Wasservogelbrutbestand zweier kleinen Fischteiche im Waldviertel. *Egretta* 26: 47-50.
- USPENSKII,S.M. 1982. [Problems of protection of birds in the Arctic and Subarctic.] *Ornitologia* 17: 18-21. In Russian.
- VAISANEN,R.A. & RAUHALA,P. 1983. Succession of land bird communities on large scale drainibgs of peatlands for forestry. *Ann. Zool. Fenn.* 20: 115-127.
- VEEN,J. 1973. De verstoring van weidevogel populaties. [The disturbance of meadowbird populations.] *Stedebouw en Volkshuisvesting* 54(1): 16-29. In Dutch.
- VERSTRAEL,T., TER KEURS,W., VAN DER ZANDE,A. & VAN DER WEIJDEN,W. 1983. De verstoring van weidevogel populaties door wegen. [Disturbance of meadowbird populations by roads.] *Vogeljaar* 31: 138-151. In Dutch.
- VOSKAR,J. 1978. Vplyv budovania rybnicnej oblasti v Inacovciach na avifaunu Statnej prirodnej rezervacie Senne. [Effect of construction of pond land in Inacovce on avifauna of state nature reserve Senne.] *Ceskoslovenske ochrana prirody. Vyskumne prace z ochrany prirody* 1: 3-86. In Czech.
- WERF,D.VAN DER. 1975. Invloeden van agrarische methoden op de weidevogelstand. [Influence of agricultural methods on the meadowbird population land.] *Vanellus* 28: 7-10. In Dutch.
- WILLIAMS,G., HENDERSON,A. GOLDSMITH,L. & SPREADBOROUGH,A. 1983. The effects on birds of land drainage improvements in the North Kent marshes. *Wildfowl* 34: 33-47.
- WILSON,J.R. 1978. Agricultural influences on waders nesting on the south Uist machair. *Bird Study* 25: 198-206.
- WIND,H. 1978. De invloed van wegen en boerderijen op de verspreiding van weidevogels. [The influence of roads and farms on the distribution of meadowbirds.] *Vanellus* 31: 72-76.
- WOLFF,W.J., REIJNDERS,P.J.H. & SMIT,C.J. 1982. The effect of recreation on the Wadden Sea ecosystem: many questions, but few answers. In: Luck,G. & Michaelis,H. (eds.) *Ecological effects of tourism in the Wadden Sea*, pp. 85-108. Landwirtschaftsverlag, Munster.
- YALDEN,D.W. 1984. Common Sandpiper numbers and recreational pressures in the Derwent Valley. *Magpie* 3: 38-46.
- ZANDE,A.N.VAN DER, TER KEURS,W.J. & VAN DER WEIJDEN,W.J. 1980. The impact of roads on the densities of four bird species in an open field habitat - evidence of a long distance effect. *Biol. Cons.* 18: 299-321.



## 6.6. SURVEY TECHNIQUES

- BARRETT,J. & BARRETT,C. 1984. Aspects of censusing breeding Lapwings. *Wader Study Group Bull.* 42: 45-47.
- DIJK,G.VAN. 1981. (Censusing breeding meadowbirds.) *Limosa* 54: 143-144. In Dutch with English summary.
- EBER,G. 1968. Brutvogelbestandsaufnahmen im Naturschutzgebiet "Emsdettener Venn" - Ein Beitrag zur Diskussion über quantitative Erfassungsmethoden. *Schriftenr. Landesst. Naturschutz und Landschaftspflege in NRW* 5: 83-124.
- FULLER,R.J. 1981. Aspects of counting Lapwings and Curlews breeding on lowland grassland. *Wader Study Group Bull.* 33: 14-16.
- FULLER,R.J. 1984. Some differences in the ways that observers estimate numbers of waders breeding at high density. *Wader Study Group Bull.* 40: 8-11.
- FULLER,R.J., GREEN,G.H. & PIENKOWSKI,M.W. 1983. Field observations on methods used to count waders breeding at high density in the Outer Hebrides, Scotland. *Wader Study Group Bull.* 39: 27-29.
- GREEN,R.E. 1985. Estimating the abundance of breeding Snipe. *Bird Study* 32: 141-149.
- HILDEN,O. 1979. (Effects of the advances in field ornithology on bird censuses.) *Lintumies* 14: 9-14. In Finnish with English summary.
- HILDEN,O. 1979. (Further remarks on the comparability of old and new line transect censuses.) *Lintumies* 14: 140-142. In Finnish with English summary.
- I.A.W.M. 1985. *Interprovinciale richtlijnen voor het inventariseren van weidevogels. [Inter-provincial guidelines for surveying meadowbirds.]* Report IAWM, 19 pp. In Dutch.
- JACKSON,D.B. & PERCIVAL,S.M. 1983. The breeding waders of the Hebridean machair: a validation check of the census methods. *Wader Study Group Bull.* 39: 20-24.
- JARVINEN,O. & VAISANEN,R.A. 1983. Correction coefficients for line transect censuses of breeding birds. *Ornis Fenn.* 60: 97-104.
- KALAS,J.A. & BYRKJEDAL,I. 1984. Line transects of waders in an alpine area: a methodological study. *Ann. Zool. Fenn.* 21: 399-402.
- LANGSLOW,D.R. & REED,T.M. 1985. Inter-year comparisons of breeding wader populations in the uplands of England and Scotland. In: Taylor,K., Fuller,R.J. & Lack,P.C. (eds.). *Bird census and atlas studies.. BTO, Tring.* pp. 165-173.
- LEHTONEN,L. 1979. (Über die Methoden der quantitativen Vogelforschung und deren Zuverlässigkeit.) *Lintumies* 14: 1-8. In Finnish with German summary.
- NILSSON,S.G. 1982. Seasonal changes in census efficiency of birds at marshes and fen mires in southern Sweden. *Hol. Ecol.* 5: 55-60.
- REDMOND,R.L., BICAK,T.K. & JENNI,D.A. 1981. An evaluation of breeding season census techniques for Long-billed Curlew (*Numenius americanus*). *Studies in Avian Biol.* 6: 197-201.
- REED,T.M. 1983. Within-season variation in the detection of Redshank *Tringa totanus* on upland moorlands. *Wader Study Group Bull.* 39: 49.
- REED,T.M. & FULLER,R.J. 1983. Methods used to assess populations of breeding waders on machair in the Outer Hebrides. *Wader Study Group Bull.* 39: 14-16.
- REED,T.M., WILLIAMS,T.D. & WEBB,A. 1983. The Wader Study Group Survey of Hebridean waders: was the timing right? *Wader Study Group Bull.* 39: 17-19.
- REED,T.M., BARRETT,C., BARRETT,J., HAYHOW,S. & MINSHULL,B. 1985. Diurnal variability in the detection of waders on their breeding grounds. *Bird Study* 32: 71-74.
- SMITH,K.W. 1981. Snipe censusing methods. *Bird Study* 28: 246-248.
- SUMMERS,R. & NICOLL,M. 1982. Problems in censusing breeding waders in S.W. Iceland. *Wader Study Group Bull.* 34:28.
- SVENSSON,S. 1978. A simplified territory mapping technique for estimating bird numbers on bogs. *Var Fagelvarld* 37: 9-17.
- WEBB,A., TEED,T.M. & WILLIAMS,T.D. 1983. The Hebridean wader survey: did the observers record in the same way? *Wader Study Group Bull.* 39: 24-26.



## 6.7. OTHER TECHNIQUES

- BAKER,A.J. 1983. Genetic variation in some shorebird populations: implications for studies of migratory species. *Wader Study Group Bull.* 39:57. Abstract.
- BAKER,A.J., LYNCH,A. & EDWARDS,C. 1985. Biochemical genetic studies of shorebirds: methods and applications. *Wader Study Group Bull.* 44: 34-39.
- CHERNICHKO,I.I. 1984. (Birds' traps and the results of their use in northwest Prichernomorye.) *Proc. Oka State Reserve, Ryazan* 15: 72-86. In Russian with English summary.
- FERNs,P. & GREEN,H. 1975. Methods of catching and studying breeding waders. *Wader Study Group Bull.* 16: 9-12.
- GALBRAITH,H. & GREEN,R. 1985. The prediction of hatching dates of Lapwing clutches. *Wader Study Group Bull.* 43: 16-18.
- GRAUL,W.D. 1979. An evaluation of selected capture techniques for nesting shorebirds. *N. Am. Bird Bander* 4: 19-21.
- GREEN,G.H., FERNs,P.N. & BISHOP,R.M. 1976. Methods of catching and studying breeding waders - an addendum. *Wader Study Group Bull.* 17: 21-23.
- GREEN,G.H., PIENKOWSKI,M.W., BROWN,S.C., FERNs,P.N. & MUDGE,G.P. 1978. Methods used for wader studies. In: Green,G.H. & Greenwood,J.J.D. (eds.) *Joint Biological Expedition to North East Greenland 1974*, pp. 38-51. Dundee University Printing Unit.
- GREEN,R.E. 1984. Estimating pre-fledging survival rates: a request for information. *Wader Study Group Bull.* 40:7.
- GREEN,R.E. 1984. Nomograms for estimating the stage of incubation of wader eggs in the field. *Wader Study Group Bull.* 42: 36-39.
- KAGARISE,C.M. 1978. A simple trap for capturing nestling Wilson's Phalaropes. *Bird-Banding* 49: 281-282.
- KOOPMAN,K. & HULSCHER,J. 1976. Catching breeding waders on their nests. *Wader Study Group Bull.* 19: 17-19.
- MILLS,J.A. & RYDER,J.P. 1979. Trap for catching shore and seabirds. *Bird-Banding* 50: 114-120.
- PAASSEN,A.G.VAN, VELDMAN,D.H. & BEINTEMA,A.J. 1984. A simple device for determination of incubation stages in eggs. *Wildfowl* 35: 173-178.
- PARR,R. 1981. Trapping and colour-ringing golden plovers in NE Scotland. *Ring* 1981: 244-246.
- PRATER,T. 1973. What to do with breeding waders and their pulli. *Wader Study Group Bull.* 8: 9-11.
- REDFERN,C.P.F. 1982. Estimating the pre-fledging mortality of waders: a comment on Yates' proposal. *Wader Study Group Bull.* 34:12.
- SORDAHL,T.A. 1980. A nest trap for Recurvirostrids and other ground-nesting birds. *N. Am. Bird Bander* 5: 1-3.
- YATES,B.J. 1981. Estimating pre-fledging mortality from ringing data: a proposal. *Wader Study Group Bull.* 33:11.

## 6.8. MISCELLANEOUS

- ALERSTAM,T. & HOGSTEDT,G. 1980. Spring predictability and leap-frog migration. *Ornis Scand.* 11: 196-200.
- ALERSTAM,T. & HOGSTEDT,G. 1982. Bird migration and reproduction in relation to habitats for survival and breeding. *Ornis Scand.* 13: 25-37.
- ANDREYEV,A.V. 1984. [Individual energetics and species adaptive features in some tundra birds.] In: Martin,J., Matveyeva,N., Piin,T., Semyonova,V. & Chernov,J. (eds.) *[Adaptations of organisms to tundra environments.]* Tallin (Proceedings of the All-Union Conference, 27-30 Nov. 1984), pp. 15-20. In Russian.
- BAKER,M.C. 1977. Shorebird food habits in the Eastern Canadian Arctic. *Condor* 79: 56-62.
- BAKER,M.C. & BAKER,A.E.M. 1973. Niche relationships among six species of shorebirds on their wintering and breeding ranges. *Ecol. Monogr.* 43: 193-212.
- BEINTEMA,A.J. 1984. Het weer en de weidevogels. [Weather and meadowbirds.] *Vogels* 4: 54-56. In Dutch.
- BEINTEMA,A.J. 1979. Recent changes in timing of breeding of inland breeding wader species (meadowbirds) in the Netherlands. *Wader Study Group Bull.* 26:25.
- BENGSTON,S.-A. 1963. On the influence of snow upon the nesting success in Iceland 1961. *Var Fagelvarld* 22: 97-122. In Swedish with English summary.
- BERGMAN,G. 1964. Zum Problem der gemischten Kolonien: Tonbad- und Dressurversuche mit Limikolen und Anatiden. *Ornis Fenn.* 41: 1-13.
- BLAIR,H.M.S. 1950. "Rodent-run" distraction-behaviour in birds. *Ibis* 92:476.
- BRIGGS,K.B. 1979. Three wader species using the same nest site. *Wader Study Group Bull.* 27:37.
- BYRKJEDAL,I. 1979. Nest predation in relation to snow-cover as a factor influencing the start of breeding in shorebirds. *Wader Study Group Bull.* 26:23.
- BYRKJEDAL,I. 1980. Nest predation in relation to snow-cover - a possible factor influencing the start of breeding in shorebirds. *Ornis Scand.* 11: 249-252.
- CAMPBELL,B. 1974. Wader nesting associations. *Brit. Birds* 67:82.
- CONNORS,P.J., SMITH,K.G. & MYERS,J.P. 1981. Annual variation in breeding and post-breeding shorebird numbers in Arctic Alaska. *Wader Study Group Bull.* 33:41.
- DANKS,H.V. 1971. A note on the early season food of arctic migrants. *Can. Field-Nat.* 85: 71-72.
- DUFFEY,E., CREASEY,N. & WILLIAMSON,K. 1950. The "rodent-run" distraction-behaviour of certain waders. *Ibis* 92: 27-33.
- DYRCZ,A., WITKOWSKI,J. & OKULEWICZ,J. 1981. Nesting of 'timid' waders in the vicinity of 'bold' ones as an antipredator strategy. *Ibis* 123: 542-545.
- DYRENFURTH,I. & HOHN,E.O. 1963. Steroid hormone content of the gonads of phalaropes and certain other birds in relation to sexual behaviour in phalaropes. *J. Physiol.* 169: 42-43.
- FERNs,P.N. 1978a. The breeding plumage of wading birds. In: Green,G.H. & Westwood,J.J.D. (eds.) *Joint Biological*

- Expedition to North East Greenland 1974*, pp. 71-75. Dundee University Printing Unit.
- FERNS, P.N. 1978b. The onset of prebasic body moult during the breeding season on some high-Arctic waders. *Bull. Brit. Orn. Club* 98: 118-122.
- FLINT, V.E. & KONDRATIEV, A.J. 1977. Materialien zur Biologie des Kiebitzregenpfeifers. *Beitr. Vogelkd.* 23: 265-277.
- GOCHFELD, M. 1984. Antipredator behavior: aggressive and distraction displays of shorebirds. In: Burger, J. & Olla, B.L. (eds.) *Shorebirds. Breeding behavior and populations*. Plenum Press, New York, pp. 289-378.
- GORANSSON, G., KARLSSON, J., NILSSON, S.G. & ULFSTRAND, S. 1975. Predation on bird's nests in relation to antipredator aggression and nest density: an experimental study. *Oikos* 26: 117-120.
- GREEN, G.H., GREENWOOD, J.J.D. & LLOYD, C.S. 1977. The influence of snow conditions on the date of breeding of wading birds in north-east Greenland. *J. Zool., Lond.* 183: 311-328.
- GREEN, G.H., GREENWOOD, J.J.D. & LLOYD, C.S. 1978. The effect of snow conditions on the date of breeding in waders. In: Green, G.H. & Greenwood, J.J.D. (eds.) *Joint Biological Expedition to North East Greenland 1974*, pp. 75-78. Dundee University Printing Unit.
- GROTE, H. 1937. Zur Fortpflanzungsbiologie einiger Strandläuferarten (*Calidris*). *Beitr. Fortpfl.-biol. Vogel* 13: 127-132, 233-234.
- GUSEV, A.A. 1981. [Transportation of nests by waders from flooded nesting places.] *Ornitologia* 16: 165-166. In Russian.
- HOHN, E.O. 1957. Observations on display and other forms of behavior of certain arctic birds. *Auk* 74: 203-214.
- HOHN, E.O. 1958. Observations on the behaviour of certain Arctic birds. *Arctic* 11: 93-101.
- JEHL, J.R., Jr. & HUSSELL, D.J.T. 1966. Effects of weather on reproductive success of birds at Churchill, Manitoba. *Arctic* 19: 185-191.
- JOHNS, J.E. 1964. Testosterone-induced nuptial feathers in phalaropes. *Condor* 66: 449-455.
- JOHNS, J.E. & PFEIFFER, E.W. 1963. Testosterone-induced incubation patches of phalaropes birds. *Science* 140: 1225-1226.
- KALAS, J.A. & ROALKVAM, R. 1983. Feeding habits of breeding birds in a western Norwegian estuary. *Fauna norv. Ser. C, Cinclus* 6: 73-77.
- KAMENEV, V.M. 1984. [Adaptive peculiarities of the breeding cycle of some arctic birds.] In: Martin, J., Matveyeva, N., Piin, T., Semyonova, V. & Chernov, J. (eds.) *[Adaptations of organisms of the arctic environments.]* Tallin, pp. 72-76. In Russian.
- KHLEBOSOLOV, E.I. 1983. (On trophic selectivity in some tundra Charadriiformes.) *Zool. Zh.* 62: 963-965. In Russian with English summary.
- KHLEBOSOLOV, E.I. 1984. [Species diversity and adaptive strategy of tundra bird life: shorebirds.] In: Martin, J., Matveyeva, N., Piin, T., Semyonova, S. & Chernov, J. (eds.) *[Adaptations of organisms to the arctic environments.]* Tallin, pp. 181-183. In Russian.
- KING, B. 1978. Waders nesting on buildings. *Brit. Birds* 71: 598.
- KISTCHINSKI, A.A. 1982. Trophic relationships between birds and some invertebrates in tundra ecosystems. *Ornithological Studies in the USSR. Zoological Institute, USSR Academy of Sciences*: 44-74.
- KONDRATIEV, A.J. 1977. (Stages of incubation and nest behaviour in the Charadriiformes.) *Zool. Zh.* 56: 1668-1674. In Russian with English summary.
- KONDRATIEV, A.J. 1982. Nesting regimes of tundra shorebirds and factors defining them. In: *Abstracts of Symposia and Poster Presentations XVIII Congr. Int. Orn.*, Moscow: 223-224.
- KORTE, K.de. 1984. Arctische steltlopers (2) Kornoetstrandloper, Drieteenstrandloper. Daarse Strandloper, Bonte Strandloper. [Arctic waders (2).] *Vogels* 4: 62-65. In Dutch.
- KUMARI, A. 1958. (The food of the waders in the peat bogs of Estonia.) *Orn. kogunuk Tartu* 1: 195-215. In Estonian with English summary.
- KOSICEK, M. 1986. *Entoparasitenfauna der Limikolen und Lariden im Seewinkel*. Phil. Diss. Univ. Wien.
- MACLEAN, G.L. 1972. Problems of display postures in the Charadrii (Aves: Charadriiformes). *Zool. Afr.* 7: 57-74.
- MACLEAN, G.L. 1975. Belly-soaking in the Charadriiformes. *J. Bombay Nat. Hist. Soc.* 72: 74-82.
- MACLEAN, S.F., Jr. 1969. *Ecological determinants of species diversity of arctic sandpipers near Barrow, Alaska*. Ph.D. thesis, Univ. California, Berkeley, 191 pp.
- MACLEAN, S.F., Jr. 1974. Lemming bones as a source of calcium for Arctic sandpipers. *Ibis* 116: 552-557.
- MAXSON, S.J. & ORING, L.W. 1978. Mice as a source of egg loss among ground-nesting birds. *Auk* 95: 582-584.
- MAYO, A.L.W. & CAMPBELL, B. 1976. Wader nesting associations. *Brit. Birds* 69: 82.
- MCCAFFERY, B.J. 1982. Geographic variation in predator-mobbing behavior - a hypothesis. *Wader Study Group Bull.* 35: 20.
- MELTOFT, H. 1977. 'Fly-away trick' of some arctic waders. *Brit. Birds* 70: 333-336.
- MESTER, H. 1971. Federlinge auf Limikolen - Gelegen. *J. Orn.* 112: 109-130.
- MILLER, E.H. 1983. The structure of aerial displays in three species of Calidridinae (Scolopacidae). *Auk* 100: 440-451.
- MOLLER, A.P. 1978. (Breeding schedule, colony size, clutch size and nesting production in some Charadriiformes species on Laeso, North Jutland.) *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 72: 41-40. In Danish with English summary.
- MYERS, J.P. & PITELKA, F.A. 1979. Variations in summer temperature patterns near Barrow, Alaska: analysis and ecological interpretation. *Arctic Alpine Res.* 11: 131-144.
- NICOLL, C.S., PFEIFFER, E.W. & FEVOLD, H.R. 1967. Prolactin and nesting behavior in phalaropes. *General Comp. Endocrinol.* 8: 61-65.
- NORTON, D.W. 1972. Incubation schedules of four species of Calidrine sandpipers at Barrow, Alaska. *Condor* 74: 164-176.
- NORTON, D.W. 1973. *Ecological energetics of Calidridine sandpipers breeding in northern Alaska*. Ph. D. dissertation, Univ. of Alaska, Fairbanks, 163 pp.
- OWEN, J.H. 1927. Behaviour of nesting birds in floods. *Brit. Birds* 21: 46-47.
- PIENKOWSKI, M.W. 1983. A poor breeding season in 1983 for some waders on the Taymir Peninsula. *Wader Study Group Bull.* 39: 34.
- SIMMONS, K.E.L. 1953. Some aspects of the aggressive behaviour of three closely related plovers (*Charadrius*). *Ibis* 95: 115-127.

- SIMMONS,K.E.L. 1955. The nature of the predator-reaction of waders towards humans: with special reference to the role of the aggressive-, escape- and brooding-drives. *Behaviour* 8: 130-173.
- SORDAHL,T.A. 1981. Predator-mobbing behaviour in the shorebirds of North America. *Wader Study Group Bull.* 31: 41-44.
- SPJOTVOLL,O. 1972. (Observations on the breeding of various species during a heavy snowfall in June 1971 in the Dovre mountain area, south central Norway.) *Sterna* 11: 97-104. In Norwegian with English summary.
- SPERRY,C.C. 1940. Food habits of a group of shorebirds: Woodcock, Snipe, Knot and Dowitchers. *Wildl. Res. Bull.* 1: 1-37.
- STRIJBOS,J.P. 1979. Over weidevogels, die hun legsel verdedigen. [On meadowbirds which defend their brood.] *Vogeljaar* 27: 165-167.
- SUTTON,G.M. 1981. On aerial and ground displays of the world's Snipes. *Wilson Bull.* 93: 457-477.
- TIKHONOV,A.V. & FOKIN,S.YU. 1981. [Lek and calls of waders.] *Ornitologia* 16: 64-72. In Russian.
- TIKHONOV,A.V. & FOKIN,S.YU. 1982. (Defence behaviour of Charadriiformes in the nesting period.) *Ornitologia* 17: 54-65. In Russian with English summary.
- TOMKOVICH,P.S. 1982. Territoriality of some monogamous species of Calidridinae Sandpipers. In: *Abstracts of Symposia and Poster Presentations XVIII Congr. Int. Orn., Moscow*: 300.
- WEST,G.C. & NORTON,D.W. 1975. Metabolic adaptations of tundra birds. In: Vernberg,F.J. (ed.) *Physiological Adaptations to the Environment*. Intext Educational Bull., New York, pp. 301-329.
- YARBROUGH,C.G. 1970. Summer lipid levels of some subarctic birds. *Auk* 87: 100-110.




## 6.9. OYSTERCATCHER *HAEMATOPUS OSTRALEGUS*

- ASHFORD,W.J. 1923. Unusual nest of Oystercatcher. *Brit. Birds* 17:87.
- ARCHIBALD,C.F. 1896. Nesting habits of the Oystercatcher. *Zoologist* 1896:275.
- BARNES,J.A.C. 1950. Repeated bigamy of Oystercatcher. *Brit. Birds* 43: 23-25.
- BENNEMA,F. 1979. Jongenproductie door Scholeksters in de Paesenerpolder. [Production of young by Oystercatchers in the Paesenerpolder, Friesland.] Werkdocument R.I.J.P. 1979-285 Abw., 84 pp. In Dutch.
- BENSON,S.V. 1948. Injury-feigning of Oystercatcher. *Brit. Birds* 41:222.
- BERNHOFT-OSA,A. 1952. Om antallet av egg hos tjellen (*Haematopus ostralegus*L.). *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 46: 118-120. In Danish.
- BESER,H.J. & VON HELDEN-SARNOWSKI,S. 1974. Zur Ökologie und Biologie des Austerfischer (*Haematopus ostralegus* L.) am südlichste Punkt seiner Verbreitung in Deutschland. *Charadrius* 10: 37-54.
- BLASZYK,P. 1953. Zum Bruten des Austerfischer in Binnenland. *Vogelwelt* 74: 41-45.
- BOSCH,G. 1968. Vreemde broedgewoonten van de Scholekster. [Unusual breeding habits of the Oystercatcher.] *Vanellus* 21:167. In Dutch.
- BRIGGS,K.B. 1980. Notes on the feeding techniques of inland feeding Oystercatchers. *Wader Study Group Bull.* 28: 31-32.
- BRIGGS,K.B. 1981. Nest-site selection in riverside-nesting Oystercatchers *Haematopus ostralegus*. *Wader Study Group Bull.* 31:8.
- BRIGGS,K.B. 1984. The breeding ecology of coastal and inland Oystercatchers in north Lancashire. *Bird Study* 31: 141-147.
- BRIGGS,K.B. 1984. Injuries to Oystercatchers wintering and breeding inland in north-west England. *Wader Study Group Bull.* 40: 39-41.
- BRIGGS,K.B. 1984. Repeated polygyny by Oystercatchers. *Wader Study Group Bull.* 40: 42-44.
- BROWN,R.H. 1925. Fledging period of Oystercatchers. *Brit. Birds* 19:76.
- BROWN,R.H. 1946. "Injury-feigning" of Oystercatchers. *Brit. Birds* 39:60.
- BUXTON,E.J.M. 1939. The breeding of the Oystercatcher. *Brit. Birds* 33: 184-193.
- CAMPBELL,B. 1967. Clutch size in Oystercatcher. *Brit. Birds* 40:126.
- CAMPREDON,P. 1978. Quelques aspects de la reproduction de l'Huitrier pie sur la réserve naturelle du Banc d'Arguin. *Courbageot* 5: 4-7.
- COOMBER,R. 1975. Contrasting predator-reactions of two Oystercatcher chicks. *Brit. Birds* 68: 157-158.

- COOMBER,R. 1978. Oystercatcher driving lamb from nest. *Brit. Birds* 71:538.
- COWIN,W.S. & LADAS,E.F. 1939. Incubation period of the Oystercatcher. *Brit. Birds* 33: 112-113.
- DARE,P.J. & MERCER,A.J. 1968. Wool causing injuries to legs and feet of Oystercatchers. *Brit. Birds* 61: 257-263.
- DICKSON,R.C. 1977. Oystercatcher hatching Lapwing's eggs. *Brit. Birds* 70:36.
- DIRCKSEN,R. 1932. Die Biologie des Austernfischers, der Brandseeschwalbe und der Kustenseeschwalbe nach Beobachtungen und Untersuchungen auf Norderoog. *J. Orn.* 80: 427-521.
- DIJKSEN,L. 1980. Enige gegevens over broedseizoen en broedsukses bij scholeksters (*Haematopus ostralegus* L.) in de duinen. [Some data on breeding season and success of Oystercatchers nesting in the dunes.] *Watervogels* 5: 3-7. In Dutch.
- EDWARDS,G., HOSKING,E. & SMITH,S. 1948. Aggressive display of the Oystercatcher. *Brit. Birds* 41: 236-243.
- ELLISON,N.F. & JOHNSTON,T.L. 1946. Injury-feigning of Oystercatcher. *Brit. Birds* 39:60.
- FOKKEMA,J. 1977. Over het mitkommen van jongen bij de Scholekster. [On the hatching of young Oystercatchers.] *Vanellus* 30: 144-146. In Dutch.
- GLOE,P. 1983. Vorwärts- und aufwärtsdrehender Austernfischer (*Haematopus ostralegus*). *Orn. Mitt.* 35: 155-156.
- GLOE,P. 1984. Ende Oktober junggeföhrender Austernfischer (*Haematopus ostralegus*). *Orn. Mitt.* 36: 88-89.
- GREENHALGH,M.E. 1969. A comparison of breeding success of the Oystercatcher between inland and coastal areas in N.W. England. *Naturalist, Leeds* 926: 87-88.
- HARRIS,M.P. 1967. The biology of Oystercatchers on Skokholm Island, S. Wales. *Ibis* 109: 180-193.
- HARRIS,M.P. 1969. Effect of laying date on chick production in Oystercatchers and Herring Gulls. *Brit. Birds* 62: 70-75.
- HARRIS,M.P. 1970. Territory limiting the size of breeding population of the Oystercatcher (*Haematopus ostralegus*) - a removal experiment. *J. Anim. Ecol.* 39: 707-713.
- HARRIS,M.P. & SAFRIEL,U.N. 1983. Breeding efforts and survivorship of breeding Oystercatchers on Skokholm. *Wader Study Group Bull.* 39:43. Abstract.
- HAVERSCHMIDT,F. 1946. Injury-feigning of Oystercatcher. *Brit. Birds* 39: 59-60.
- HAVERSCHMIDT,F. 1946. Notes on the nest-sites of the Oystercatcher and the Long-eared Owl as a hole breeder. *Brit. Birds* 39: 334-335.
- HEPPLESTON,P.B. 1971. Nest site selection by Oystercatchers in the Netherlands and Scotland. *Neth. J. Zool.* 21: 208-211.
- HEPPLESTON,P.B. 1972. The comparative breeding ecology of Oystercatchers in inland and coastal habitats. *J. Anim. Ecol.* 41: 23-51.
- HOEKSTRA,J. 1984. Opvallend gedrag van de scholekster. [Remarkable behaviour of the Oystercatcher.] *Vanellus* 37: 53-54. In Dutch. Removal of unfertilised eggs.
- HOOGWERF,A. 1974. Plaatstrouw bij een albino Scholekster *Haematopus ostralegus* L. op Vlieland. [Site fidelity of albinistic Oystercatcher on Vlieland.] *Limosa* 47: 147-149. In Dutch.
- HOOGWERF,A. 1975. Opnieuw dubbele leggels bij de Scholekster *Haematopus ostralegus*. [Again double clutches in Oystercatchers.] *Limosa* 48:116. In Dutch.
- HORLYK,N.-O. & LIND,H. 1978. Pecking response of artificially hatched Oystercatcher (*Haematopus ostralegus*) young. *Ornis Scand.* 9: 138-145.
- HULSCHER,J.B. 1972. De scholekster, een nieuwkomer onder de weidevogels. [The Oystercatcher, a new-comer under the meadowbirds.] *Vanellus* 25: 206-211. In Dutch.
- HULSCHER,J.B. 1977. Wat verkeersslachtoffers van Scholeksters ons nog kunnen leren. [What road-casualties can learn us about.] *Vanellus* 30: 170-179. In Dutch.
- HUXLEY,J.S. & MONTAGUE,F.A. 1925. Studies on the courtship and sexual life of birds. V. The Oystercatcher. *Ibis* 12(1): 868-897.
- JONG,J.DE. 1975. Scholeksters als verkeersslachtoffers in Friesland in de periode augustus 1971 - augustus 1975. [Oystercatchers as road-casualties in Friesland in August 1971 - August 1975.] *Vanellus* 28: 179-185. In Dutch.
- JUNGFER,W. 1954. Über Paartreue, Nistplatztreue und Alter der Austernfischer auf Mellum. *Vogelwarte* 17: 6-15.
- KEIDEL,H. 1984. De Scholekster (*Haematopus ostralegus*) in de Paesener Lannen. [The Oystercatcher in the Paesener Lannen, Friesland.] Werkdocument R.I.J.P. 1984-39 Abw., 73 pp. In Dutch.
- KEIGHLEY,J. & BUXTON,E.J.M. 1948. The incubation period of the Oystercatcher. *Brit. Birds* 41: 261-266.
- KUMERLOEVE,H. 1950. Zur Biologie Amrumer Austernfischer. *Columba* 2: 22, 44-46.
- LEAST,I.H. 1980. Successful multiple nest-use by Oystercatchers. *Brit. Birds* 73:220.
- LIND,H. 1965. Parental feeding in the Oystercatcher (*Haematopus o. ostralegus* (L.)). *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 59: 1-31.
- MAKKINK,G.F. 1942. Contribution to the knowledge of the behaviour of the Oystercatcher. *Ardea* 31: 23-74.
- MARTINEZ,A., MOTIS,A., MATHEU,E. & LLIMONA,F. 1983. Data on the breeding biology of the Oystercatcher *Haematopus ostralegus* L. in the Ebro Delta. *Ardea* 71: 229-234.
- MEDDERMAN,R.M. 1954. Notes on the nesting of Oystercatchers on Skokholm in 1953. *Skokholm Bird Obs. Report* 1953: 27-29.
- MERCER,A.J. 1968. Individual weight change in breeding Oystercatchers. *Bird Study* 15: 93-98.
- MILLS,P.R. & TEKKE,M.J. 1978. Oystercatchers nesting on roofs. *Brit. Birds* 71:308.
- MUNRO,C.A. 1984. Roof nesting Oystercatchers. *Bird Study* 31:148.
- NEVIN,W.S. & TICEHURST,N.F. 1951. Bigamy of Oystercatcher. *Brit. Birds* 44: 208-209.
- NORTON-GRIFFITHS,M. 1969. The organisation, control and development of parental feeding in the Oystercatcher. *Behaviour* 34: 55-114.
- PATON,W.S. & WILLIS,D.P. 1973. Unusual nest sites of Oystercatchers. *Scot. Birds* 7: 405-406.
- PELT-LECHNER,A.A.VAN. 1925. (Oological oddities 14: Unusual eggs of the Oystercatcher.) *Ardea* 14: 114-115. In Dutch with English summary.
- PRING,C.J. 1922. Large clutch of Oystercatcher eggs. *Brit. Birds* 16: 136-137.
- REINER,H. 1981. Dachbrut des Austernfischer (*Haematopus ostralegus*) in Bremerhaven. *Vogelk. Ber. Nieders.* 13:17.
- RITTINGHAUS,H. 1963. Sonderbare Nistplätze des Austernfischers. *Natur und Museum* 93: 155-164.
- ROBERTS,E.L. 1947. Injury feigning of Oystercatcher. *Brit. Birds* 40:284.

- SAFRIEL,U.N. 1981. Social hierarchy among siblings in broods of the Oystercatcher. *Behav. Ecol. Sociobiol.* 9: 59-63.
- SAFRIEL,U.N. 1982. Effects of disease on social hierarchy of young Oystercatchers. *Brit. Birds* 75: 365-369.
- SAFRIEL,U.N. 1983. Diet-related breeding success, inland breeding and population increase of British Oystercatchers. *Wader Study Group Bull.* 39:44. Abstract.
- SAFRIEL,U.N. 1985. Diet dimorphism within an Oystercatcher *Haematopus ostralegus* population - adaptive significance and effects on recent distribution dynamics. *Ibis* 127: 287-305.
- SAFRIEL,U.N. & HARRIS,M.P. 1982. Spatial and seasonal distribution of 'dermatitis', a disease of Oystercatchers on Skokholm and its ecological effects. In: *Abstracts of Symposia and Poster Presentations XVIII Congr. Int. Orn.*: 277-278.
- SAFRIEL,U.N., HARRIS,M.P., BROOKE,M.de L. & BRITTON,C.K. 1984. Survival of breeding oystercatchers *Haematopus ostralegus*. *J. Anim. Ecol.* 53: 867-878.
- SCHNAKENWINKEL,G. 1964. *Über Orts-, Nistplatz-, Paartreue und Alter Mellumer Austernfischer. Prufungsarbeit Padag. Hochschule Westf.-Lippe, Abt. Bielefeld.*
- SCHANKENWINKEL,G. 1970. Studien an der population des Austernfischers (*Haematopus ostralegus*) auf Mellum. *Vogelwarte* 25: 336-355.
- SIMMONS,K.E.L. & CROWE,R.W. 1953. Displacement-sleeping in the Avocet and Oystercatcher as a reaction to predators. *Brit. Birds* 46: 405-409.
- SMITH,D. 1981. Oystercatchers excavating tops of fenceposts. *Brit. Birds* 74: 41-42.
- SWENNEN,C. & DE BRUIJN,L.L.M. 1980. (The density of breeding territories of the Oystercatcher *Haematopus ostralegus* on Vlieland.) *Limosa* 53: 85-90. In Dutch with English summary.
- TEKKE,M.J. 1978. Oystercatchers nesting on roofs. *Brit. Birds* 71:308.
- TICEHURST,N.F. 1950. Bigamy of Oystercatcher. *Brit. Birds* 43: 307-309.
- TOFT,G.O. 1983. Food-stealing in territorial and non-territorial Oystercatchers during the breeding season. *Wader Study Group Bull.* 39:49. Abstract.
- TRIPLET,P. & SUEUR,F. 1983. Elevage d'une jeune Avocette *Recurvirostra avosetta* par un couple d'Huitriers pies *Haematopus ostralegus* dans le Marquenterre (Somme). *Oiseau et R.F.O.* 53: 251-260.
- VARRALL,K. 1977. Oystercatcher's nest of goose droppings. *Brit. Birds* 70: 164-165.
- VAUK,G.VON & MATHISKE,U. 1980. (Successful breeding of Oystercatchers on a roof in downtown Bremerhaven.) *Seevogel* 1: 47-48. In German with English summary.
- VINES,G. 1977. Habitat selection and differential survival of Oystercatchers: the need for more precise ringing data. *Ringers Bull.* 5:8.
- VISSEER,K.J. 1983. De annexatie door scholeksters van een gruttolegsel. [Oystercatchers annex Black-tailed Godwit brood.] *Vanellus* 36: 26-28. In Dutch.
- WALTERS,J. 1982. (Late breeding of Oystercatcher *Haematopus ostralegus*.) *Limosa* 55:100. In Dutch with English summary.
- WALTERS,J. 1984. Prolonged incubation of addled clutch by Oystercatcher. *Brit. Birds* 77: 155-156.
- WILLIAMSON,K. 1943. The behaviour pattern of the western Oystercatcher in defense of nests and young. *Ibis* 85: 486-490.
- WILLIAMSON,K. 1950. Distraction behaviour of the Oystercatcher. *Scot. Nat.* 62: 61-63.
- WILLIAMSON,K. 1952. Regional variation in the distraction displays of the Oystercatcher. *Ibis* 94: 85-96.
- WILLIS,D.P. 1973. Unusual nest site of Oystercatchers. *Scot. Birds* 7:406.



## 6.10. BLACK-WINGED STILT *HIMANTOPUS HIMANTOPUS*

- DUBOIS,P. 1984. WSG International Project on Black-winged Stilts. *Wader Study Group Bull.* 42: 10-11.
- EVERY,B. 1974. Abnormal clutch-size for the Black-winged Stilt. *Ostrich* 45:260.
- FRISCH,O.von. 1961. Zur Jugendentwicklung und Ethologie des Stelzenlaufers und der Brachschwalbe. *Z. Tierpsychol.* 18: 67-70.
- GORIUP,P.D. 1982. Behaviour of Black-winged Stilts. *Brit. Birds* 75: 12-29.
- GOUTNER,V. 1985. Evaluation and results of the 1985 breeding season's work on Black-winged Stilts in Greece. *Wader Study Group Bull.* 45:11. Abstract.
- HAMILTON,R.B. 1975. Comparative behavior of the American Avocet and the Black-necked Stilt. *Orn. Monogr.* 17, 98 pp.
- WESTERHAGEN,W.VON. 1958. Über Verbreitung und Wanderungen des Stelzenlaufers in Europa. *Orn. Beob.* 55: 138-155.
- WESTERHAGEN,W.VON. 1966. Die Ausbreitung des Stelzenlaufers. *Falke* 9: 287-288.
- YEATES,G.K. 1941. Some breeding-habits of the Black-winged Stilt. *Brit. Birds* 35: 42-46.
- WOLLEMANN,M. 1978. (Two kinds of alarm sound of the Black-winged Stilt (*Himantopus himantopus*). *Puszta* 7: 22-23. In Hungarian with English summary.

## 6.11. AVOCET *RECURVIROSTRA AVOCETTA*

- ADRET,P. 1981. Analyse de l'organisation de l'Avocette (*Recurvirostra avosetta*) au cours de la phase d'elevage. These 3eme Cycle, Rennes, 192 pp.
- ADRET,P. 1982. The sound signals of the adult Avocet *Recurvirostra avosetta* during the perinatal phase. *Ibis* 124: 275-287.
- ADRET,P. 1983. (A study of the parental behaviour in Avocets in the nesting colony. Inter- and intra-family spatial organization.) *Can. J. Zool.* 61: 603-615. In French with English summary.
- ADRET,P. 1984. (Spatial organization in broods of young Avocets on their rearing grounds.) *Terre Vie* 39: 193-208. In French with English summary.
- BIE,S.DE & ZIJLSTRA,M. 1979. Some remarks on the behaviour of the Avocet (*Recurvirostra avosetta L.*) in relation to different breeding places. *Ardea* 67: 68-69.
- BIE,S.DE & ZIJLSTRA,M. 1985. (Avocets *Recurvirostra avosetta* in the Oostvaardersplassen: freshwater marshes for safe breeding?) *Limosa* 58: 41-48. In Dutch with English summary.
- DONTSCHEV,S. 1963. Über die Brutökologie des Sabelschnablers in Bulgarien. *Fragmenta Balcanica* 4: 177-184.
- ENGELMOER,M. & BLOMERT,A.-M. 1985. Broedbiologie van de klunt langs de Friese waddenkust. Seizoen 1983. [Breeding biology of Avocets along the Wadden Sea coast of Friesland in 1983.] *R.IJ.P.-rapport 1985 - 39 Abw.*, Lelystad, 91 pp. In Dutch.
- GIRARD,O. 1985. Spatial organisation of an Avocet colony. *Wader Study Group Bull.* 45: 10-11. Abstract.
- GLEGG,W.E. 1925. On the nesting of the Avocet in the Camargue. *Brit. Birds* 19: 82-87.
- GLOE,P. 1971. Beitrag zum Brutbiotop des Sabelschnablers in Schleswig-Holstein. *Orn. Mitt.* 23: 3-9.
- GLOE,P. 1978. Zum Nahrungserwerb des Sabelschnablers, *Recurvirostra avosetta*. *Corax* 6: 47-48.
- GLOE,P. 1979. Über eine Variante des Nahrungserwerbs erwachsener Sabelschnablers (*Recurvirostra avosetta*). *Corax* 7: 117-118.
- GOUTNER,V. 1984. Belly-soaking in the Avocet. *Ostrich* 55: 167-168.
- GOUTNER,V. 1985. Breeding ecology of the Avocet (*Recurvirostra avosetta L.*) in the Evros delta (Greece). *Bonn. Zool. Beitr.* 36: 37-50.
- HUXLEY,J.S. 1925. The absence of "courtship" in the Avocet. *Brit. Birds* 19: 88-94.
- HUXLEY,J.S. 1927. Das Fehlen des Paarungsspiels beim Sabelschnabler. *Orn. Mber.* 35: 1-7.
- KALLAS,J. 1974. Nesting ecology of the Avocet in Kaina Bay. In: Kumari,E., et al. (eds.) *Estonian wetlands and their life*. Valgus, Tallinn, pp. 119-138.
- KOHLER,B. 1986. *Habitatnutzung und Nahrungsökologie des Sabelschnablers (Recurvirostra avosetta L.) und des Dunklen Wasserlaufers (Tringa erythropus Pallus) im Seewinkel*. Phil. Diss. Univ. Wien.
- LEBRET,T. 1978. Aanvallen van kluten *Recurvirostra avosetta* op bergeenden *Tadorna tadorna*. [Attacks by Avocets on Shelducks.] *Limosa* 49: 17-23. In Dutch.
- LEBRET,T. 1982. Kluten, kieviten en koeien. [Avocets, lapwings and cattle.] *Vogels* 2: 173-175. In Dutch.
- MAKKINK,G.F. 1932. Einige Beobachtungen über die Paarungsbiologie des Sabelschnablers. *Ardea* 21: 38-43.
- MAKKINK,G.F. 1936. An attempt at an ethogram of the European Avocet with ethological and psychological remarks. *Ardea* 25: 1-62.
- MAKOWSKI,H. 1951. Über das Hochbauen von Nestern bei Kranich und Sabelschnabler. *Vogelwelt* 72: 117-119.
- OCSAI,A. 1984. (Breeding of Avocets (*Recurvirostra avosetta*) on adjacent field to the village Heves.) *Aquila* 91:203. In Hungarian with English summary.
- OLNEY,P.J.S. 1970. Studies on Avocet behaviour. *Brit. Birds* 63: 206-209.
- POCOCK,R.I. 1907. On the nesting of the Avocets in the Zoological Gardens. *Aviculture* 2(5): 258-263.
- PANZKE,C. 1980. Der Brutverlauf beim Sabelschnabler (*Recurvirostra avosetta*) 1977 in der Leybucht. *Vogelk. Ber. Niedersachs* 12: 1-10.
- ROBILLER,F. & BORRMANN,K. 1979. Nestreviergrenze und Verhaltensweisen der Sabelschnabler am Salzsee "Budosszek" in Ungarn. *Falke* 26: 262-269.
- ROBILLER,F. & BORRMANN,K. 1980. Ergänzende Untersuchungen über die Nestabstände von Sabelschnabler und Seeregenpfeifer am Budosszek-to in Ungarn. *Falke* 27: 152-155.
- RUITENBEEK,W. 1984. Gedrag en sociaal systeem van de Kluut (*Recurvirostra avosetta*). [Behaviour and social system of Avocets.] *Graspieper* 4: 89-115. In Dutch.
- RUITENBEEK,W. 1985. De Kluut (*Recurvirostra avosetta*). *Wet. Med. KNNV* 169, 80 pp.

- SIMMONS,K.E.L. & CROWE,R.W. 1953. Displacement-sleeping in the Avocet and Oystercatcher as a reaction to predators. *Brit. Birds* 46: 405-409.
- SMIT,A. & VAN SCHIEVEEN, W.H. 1975. Paringsgedrag bij Kluten - unieke fotoserie. [Mating behaviour of Avocets - a unique photos-series.] *Vogeljaar* 23: 108-113. In Dutch.
- SORDAHL,T.A. 1982. Antipredator behaviour of American Avocet and Black-necked Stilt chicks. *J. Field Orn.* 53: 315-325.
- SPILLNER,W. 1972. Sabelschnabler, Lebensbilder aus der Brutbiologie. *Falke* 19: 200-209.
- STANESCU,D. 1969. (Beobachtungen über Recurvirostra avosetta und *Sterna hirundo* in der Brutkolonie von Beibugeac.) *Ocrotirea Naturii* 13: 73-82. In Rumanian with German summary.
- STANESCU,D. 1975. (Paarbildung und Balz bei Recurvirostra avosetta). *Studii si Comunicari (Sibiu)* 19: 363-391. In Rumanian with German summary.
- STANESCU,D. 1976a. (Versuch eines Ethogramms über das Embryonalverhalten bei Recurvirostra avosetta.) *Studii si Comunicari (Sibiu)* 20: 307-317. In Rumanian with German summary.
- STANESCU,D. 1976b. (Agressivität gegenüber eigenen Küken bei Recurvirostra avosetta.) *Studii si Comunicari (Sibiu)* 20: 319-325. In Rumanian with German summary.
- STANESCU,D. 1976c. (Über Brut assoziationen des Sabelschnablers in Rumanien.) *Studii si Comunicari (Sibiu)* 20: 327-345. In Rumanian with German summary.
- STANESCU,D. 1977a. Construirea cuibului, depunerea ou aler si efectul atrapelor ou, la Recurvirostra avosetta L. 1758. *Studii si Comunicari* 21: 343-354. In Rumanian.
- STANESCU,D. 1977b. Recurvirostra avosetta - teritorium si teritorialitate. *Studii si Comunicari* 21: 355-367. In Rumanian.
- STANESCU,D. 1977c. Recurvirostra avosetta. Manifestari genotipice cu si fara valoare semantica. *Studii si Comunicari* 21: 369-387. In Rumanian.
- STANESCU,D. 1977d. Consideratiuni asupra probabilitatii instaurarii rilor intraspecifici in functie de amplitudinea elementelor cu caracter agresiv cuprinse in sistemul de comunicare difug (Recurvirostra avosetta L. 1758). *Studii si Comunicari* 21: 389-393. In Rumanian.
- STANESCU,D. 1978. Recurvirostra avosetta. Stolul. Formare si comportament. *Studii si Comunicari* 22: 373-382. In Rumanian.
- STERBETZ,I. 1957. (Data on the nesting of the Avocet and the Kentish Plover in the surroundings of Hodmezovasarhely.) *Aquila* 63/64: 278, 338. In Hungarian with English summary.
- SUEUR,F. 1984. Quelques donnees sur la reproduction de l'Avocette (Recurvirostra avosetta) dans le Marquenterre (Somme). *Oiseau et R.F.O.* 54: 131-136.
- SUEUR,F. 1985. Note complémentaire sur l'utilisation de l'espace chez l'avocette Recurvirostra avosetta. *Rev. Ecol. (Terre Vie)* 40: 119-121.
- TEMME,M. 1964. Das Verleiten beim Sabelschnabler. *Vogelkosmos* 1: 39-41.
- TEMME,M. 1965. Nestplatzzeigen und Begattung beim Sabelschnabler. *Vogelkosmos* 2: 244-246.
- TJALLINGII,S.J. 1972. Habitat selection of the Avocet (Recurvirostra avosetta) in relation to feeding. *Proc. XVth Proc. Int. Orn. Congr.*: 696-697.
- TJALLINGII,S.P. 1977. De Kluut, een bedreigde pionier. [The Avocet, an endangered pioneer.] *Lepelaar* 49: 14-16. In Dutch.
- TCHERNITCHKO,I.I. 1980. [Structure of breeding colonies of avocets in north-eastern part of Prichernomorje.] *Ornitologia* 15: 80-88. In Russian.
- WALTERS,J. 1972. The fledging period of the Avocet. *Bird Study* 19: 251-252.
- WALTERS,J. 1980. The onset of moult in Avocets. *Bird Study* 27:108.
- YESOU,P. 1985. The breeding chronology of the Avocet. *Wader Study Group Bull.* 45:10. Abstract.



## 6.12. STONE CURLEW *BURHINUS OEDICNEMUS*

- BANZHAF,W. 1933. Ein Beitrag zur Brutbiologie des Triels. *J. Orn.* 81: 311-321.
- BIRD,G. 1933. Some habits of the Stone Curlew. *Brit. Birds* 27: 114-116.
- CHRISTEN,W. 1979. Geringer Nestabstand zweier Trielpaare im Elsass. *Orn. Beob.* 76:41.
- CHRISTEN,W. 1980. Entwicklung und ökologie der Triel population (*Burhinus oedicnemus*) im Elsass. *Orn. Beob.* 77: 201-208.
- CREUTZ,G. 1953. Beobachtungen am Triel. *Beitr. Vogelkd.* 3: 199-211.
- FERRY,C. 1956. Sur l'écologie de l'Oedicnème en Côte-d'Or. *Oiseau* 26: 61-65.
- FRISCH,O.VON. 1959. Beobachtungen bei einer Gefangenschaftsbrut des Triels. *Vogelwelt* 80: 97-101.
- GLUE,D. & MORGAN,R. 1974. Breeding statistics and movements of the Stone Curlew. *Bird Study* 21: 21-28.
- HLASEK,J. 1979. Dytik uhorni. [Stone Curlew.] *Pamatky a priroda* 10:625. In Czech.
- MAYAUD,N. 1939. Le Courlis de terre ou Oedicnème criard eleve-t-il normalement deux ou plusieurs nichées par an? *Oiseau* 9: 214-218.
- MODLINGER,P. 1973. Über eine Zucht des Triels. *Gef. Welt* 97: 123-124.
- MODLINGER,P. 1975. (Die Zucht in der Gefangenschaft als einer der gehbaren Wege für die Rettung der gefährdeten Arten: Zucht des Triels.) *Aquila* 80-81: 189-196. In Hungarian with German summary.
- NETHERSOLE-THOMPSON,D. 1933. Some observations on the nesting of the Stone Curlew. *Ool. Rec.* 13: 82-90.
- PENROSE,F.G. 1913. Field-notes on a pair of Stone Curlews. Have they an appreciable sense of smell? *Brit. Birds* 6: 266-269.

- RANDIK,A. 1970. Leziak obycajny - *Burhinus oedicnemus*. [Stone Curlew.] *Ochrana fauny* 4(2):4. str. obalky. In Czech.
- SCOTT,R.E. 1965. Some observations on the Stone Curlew at Dungeness. *Bird Notes* 31: 261-265.
- STEMMLER-MORATH,C. 1945. Beobachtungen bei der Aufzucht junger Triele. *Vogel der Heimat* 15: 164-170.
- STEMMLER-MORATH,C. 1951. Beobachtungen bei der Aufzucht junger Triele. *Zool. Garten* 18: 47-53.
- VOGEL,P. & VOGEL,C. 1972. Zur Okologie und Verbreitung des Trieles im Elsass. *Orn. Beob.* 69: 153-168.
- WADEWITZ,O. 1955. Zur Brutbiologie des Trieles. *Beitr. Vogelkd.* 4: 86-107.
- WAYRE,P. 1971. Breeding of the Stone Curlew at the Norfolk Wildlife Pak. *Zoo Year Book* 11:137.
- WESTWOOD,N.J. 1983. Breeding of Stone Curlews at Weeting Heath, Norfolk. *Brit. Birds* 76: 291-304.

### 6.13. COLLARED PRATINCOLE *GLAREOLA PRATINCOLA*

- CERVA,F. 1929. Die Brachschwalbe und ihre Aufzucht aus dem Ei. *Aquila* 34/35: 184-194.
- FRISCH,O.VON. 1961. Zur Jugendentwicklung und Ethologie des Stelzenlaufers und der Brachschwalbe. *Z. Tierpsychol.* 18: 67-70.
- MacLEAN,G.L. 1973. Red-winged Pratincoles (*Glareola pratincola fuelleborni*) nesting in Natal. *Bokmakerie* 25: 61-63.
- MAKATSCH,W. 1952. Ein Beitrag zur Biologie der Brachschwalbe. *Larus* 4/5: 89-98.
- MULLER,M. 1948. TagesbUchnotizen über die Aufzucht einer Brachschwalbe. *Orn. Beob.* 45: 111-121.
- MULLER,M. 1953. Die Brachschwalbe "Du". *Schweizerische Monatsschr.* 13:17.
- NADLER,T. 1969. Zur Biologie der Brachschwalbe. *Falke* 16: 232-236.
- STERBETZ,I. 1974. Die Brachschwalbe, *Glareola pratincola*. Die Neue Brehm-Bucherei, Band. 462. Wittenberg-Lutherstadt. 111 pp.
- TALPEANU,M. 1963. Donnees sur la biologie de *Glareola pratincola pratincola* (L.) et *Motacilla flava feldegg*. *Mich. Trav. Mus. Hist. Nat. Antipa* 4: 401-415.
- VINOKUROV,A.A. 1958. (On distribution and biology of the Pratincole.) *Bull. Soc. Nat. Moscow, ser. Biol.* 63: 141-142.
- YEATES,G.K. 1948a. Some notes on the nesting habits of the Pratincole. *Brit. Birds* 41: 301-303.
- YEATES,G.K. 1948b. Quelques notes sur la reproduction de la Glareole. *Oiseau* 18: 98-103.

### 6.14. LITTLE RINGED PLOVER *CHARADRIUS DUBIUS*

- AMMERSBACH,R. 1943. Brutbiologische Beobachtungen am Nest des Flussregenpfeifers. *Pollicchia N.F.* 11: 125-129.
- AMTMANN,E. & ENGLANDER,H. 1963. Über die Brutgemeinschaft von Flusseeschwalbe und Flussregenpfeifer. *Niederrhein* 30: 73-75.
- ARMSTRONG,E.A. 1952. The distraction displays of the Little Ringed Plover and territorial competition with the Ringed Plover. *Brit. Birds* 45: 55-59.
- ARPPE,H. 1983. (Little Ringed Plover *Charadrius dubius* incubating pieces of mortar.) *Ornis Fenn.* 60:90. In Finnish with English summary.
- BERTHELOT,Y. 1985. Du refroidissement par mouillage des oeufs et des poussins chez le Petit Gravelot et la Sterne Pierregarin. *Nos Oiseaux* 38: 49-58.
- BESER,H.J. 1977. Zur Brutökologie des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius*) in zwei Kiesgruben am Niederrhein. *Charadrius* 13: 65-70.
- BRINGELAND,R. 1965. (Temporary habitats of the Little Ringed Plover.) *Sterna* 6: 281-295. In Norwegian with English summary.
- BUB,H. 1958. Untersuchungen an einer Population des Flussregenpfeifers. *Beitr. Vogelkd.* 5: 268-283.
- CREUTZ,G. 1931. Nistbeobachtungen bei einem Parchen des Flussregenpfeifers. *Beitr. Fort Pfl.-Biol. Vogel* 7: 167-170.
- DATHE,H. 1951. Blick in die Kinderstube des Flussregenpfeifers. *Natur und Volk* 81: 223-228.
- DATHE,H. 1953. Der Flussregenpfeifer. *Charadrius dubius*. Die Neue Brehm-Bucherei, Band. Wittenberg-Lutherstadt. 38 pp.
- DATHE,H. 1963. Zur Brutbeteiligung der Geschlechter beim Flussregenpfeifer. *Orn. Mitt.* 15: 197-198.
- DATHE,H. & MULLER,H.J. 1932. Zur Brutbiologie des Flussregenpfeifers. *Beitr. Fort Pfl.-Biol. Vogel* 8: 60-65.
- DVORSKY,M. & DVORSKA,J. 1980. Neobvykla snuska kulika ricniho (*Charadrius dubius* Gm.). [The unusual clutch of Little Ringed Plover.] *Zpravy MOS* 1980: 125-126. In Czech.
- ERLEMANN,P. 1983. Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) brutet auf Kahlschlag in geschlossenem Waldbereich. *Vogel und Umwelt* 2:261.
- ERLINGER,G. 1985. Feldbruteneine chance fur den Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*). *Oko. L.* 7(3): 9-11.
- FERRY,C. 1957. Sur la reproduction du Petit Gravelot dans le Finistere. *Oiseau* 27: 28-33.
- GATTER,W. 1971. Aufenthalt und raumliche Bewegungen einer Flussregenpfeifer-Population (*Charadrius dubius*). *Anz. orn. Ges. Bayern* 10: 100-106.
- HEDENSTROM,A. & VUORINEN,J. 1982. (Little Ringed Plover, *Charadrius dubius*, breeding semi-colonially.) *Var Fagelvarid* 41:408. In Swedish with English summary.
- HOLZINGER,J. 1974. Zur Frage der Nachtlichen Brutablosung beim Flussregenpfeifers *Charadrius dubius*. *J. Orn.* 115: 46-56.

- HOLZINGER,J. 1975. Untersuchungen zum Verhalten des Flussregenpfeifers *Charadrius dubius* beim gestortem und ungestortem Brutablauf. *Anz. orn. Ges. Bayern* 14: 166-173.
- HOLZINGER,J. & SCHILHAUSL,K. 1971. Zur Gewichtsentwicklung junger Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*). *Anz. orn. Ges. Bayern* 10: 107-109.
- HOLZINGER,J. & SCHILHAUSL,K. 1972. Untersuchungen zur Brutbiologie an einer sudwestdeutschen Population des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius*). *Beitr. naturk. Forsch. Sudw.-Dtschl.* 31: 31-101.
- KROSCHE,O. 1936. Zur Brutbiologie des Flussregenpfeifers. *Beitr. FortPfl.-Biol. Vogel* 12: 93-101.
- LAVEN,H. 1939. Über das Jungenschlupfen beim Flussregenpfeifer. *Aus der Heimat* 52: 206-211.
- LOEH,E. 1957. Ein versetztes Flussregenpfeifernest wurde angenommen. *Falke* 4:32.
- LIBBERT,W. 1931. Zur Brutbiologie des Flussregenpfeifers. *Beitr. Fort Pfl.-Biol. Vogel* 7: 215-216.
- MESTER,H. 1960. Die Frage der Brutbeteiligung beim Flussregenpfeifer. *Orn. Mitt.* 12: 46-48.
- OHLENDORF,A. 1932. Einige Brutbiologische Beobachtungen am Nest des Flussregenpfeifers. *Beitr. Fort Pfl.-Biol. Vogel* 8: 96-100.
- PRIKRYL,V. 1966-1967. Nekolik zajimavosti ze zivotu kulika rincniho (*Charadrius dubius* Scop.). [Some remarks from the life of Little Ringed Plover.] *Ziva* 15: 31-33 and *Zpravy MOS* 1966-67: 25-32. In Czech.
- PRIOR,L.J. 1976. Breeding of the Little Ringed Plover *Charadrius dubius*. *Avic. Mag.* 82-127.
- REINSCH,A. 1981. Ein Funfergelege des Flussregenpfeifers *Charadrius dubius*. *Anz. orn. Ges. Bayern* 20:85.
- REISER,K.-H. & HEIN,K. 1974. Zum Vorkommen und zur Brutbiologie des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius*) in Schleswig-Holstein. *Corax* 5: 9-30.
- RINGE,F. 1973. Zum Status und zur Brutbiologie des Flussregenpfeifers im Kreise Osnabrück. *Osnabrucker Naturw. Mitt.* 2: 89-100.
- SCHONLE,E. 1983. (Observations on a small population of Little Ringed Plovers *Charadrius dubius*.) *Orn. Beob.* 80: 183-189. In German with English summary.
- SCHONWETTER,M. 1953. Ein merkwürdiges Ei des Flussregenpfeifers. *Beitr. Vogelkd.* 3: 124-125. White spots on egg.
- SCHOSSLER,W. 1969a. Aussergewöhnliche Brutplatz des Flussregenpfeifers. *Orn. Mitt.* 21: 42-43.
- SCHOSSLER,W. 1969b. Über "Nisthilfe" beim Flussregenpfeifer. *Orn. Mitt.* 21:163.
- SCHUCKING,A. 1973. Zur Verbreitung und Brutbiologie des Flussregenpfeifers im Raum Hagen/Westf. *Natur und Heimat* 33: 76-81.
- SIMMONS,K.E.L. 1953a. Some aspects of the aggressive behaviour of three closely related plovers (*Charadrius*). *Ibis* 95: 115-127.
- SIMMONS,K.E.L. 1953b. Some studies on the Little Ringed Plover. *Avic. Mag.* 59: 191-207.
- SIMMONS,K.E.L. 1955. The significance of voice in the behaviour of the Little Ringed and Kentish Plovers. *Brit. Birds* 48: 106-114.
- SIMMONS,K.E.L. 1956. Territory in the Little Ringed Plover. *Ibis* 98: 390-397.
- SLUITERS,J.E. 1938. Bijdrage tot de biologie van den Kleinen Plevier. [Contributions to the biology of the Little Ringed Plover.] *Ardea* 27: 123-151.
- SLUITERS,J.E. 1948. Notes on the breeding of the Little Ringed Plover. *Limosa* 21: 83-85.
- SLUITERS,J.E. 1954. Waarnemingen over de drie bij Amsterdam broedende pluviersoorten (*Leucopolius a. alexandrinus*, *Charadrius dubius curonicus* en *Ch. hiaticula*). [Observations on the three plover species breeding near Amsterdam: Kentish, Little Ringed and Ringed Plover.] *Limosa* 27: 71-86. In Dutch with English summary.
- SMITH,J. & SMITH,M. 1974. Behaviour of Ringed Plover in defence of nest. *Brit. Birds* 67:78.
- STEIN,F. 1958. Beitrag zur Biologie des Flussregenpfeifers. *Beitr. Vogelkd.* 5: 247-268.
- STEIN,F. 1959. Zur Biologie des Flussregenpfeifers. *Beitr. Vogelkd.* 6: 311-339.
- STEIN,F. 1962. Brutbiologische und ethologische Untersuchungen am Flussregenpfeifer. *Falke, Sonderheft* 4: 28-33.
- STEIN,F. 1966. Vergleichende morphologische und ethologische Untersuchungen zur Jugendentwicklung von Fluss- und Sandregenpfeifer. *Beitr. Vogelkd.* 11: 221-246.
- TEYE,W. 1976. Ungewöhnlichen Brutplatz des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius*). *Vogelk. Ber. Niedersachs.* 8:50.
- ULBRICHT,J. 1979. Zur Territorialstruktur einer "Kolonie" des Flussregenpfeifers. *Falke* 26: 351-354.
- VOIPOO,P. 1956. Zur Verbreitungsdynamik von *Charadrius dubius* Scop. in Binnenfinnland, besonders am Saimasee. *Ann. Zool. Fenn.* "Vanamo" 18: 1-22.
- VOLKMANN,G. 1977. Ungewöhnlicher Brutplatz des Flussregenpfeifers. *Vogel und Heimat* 26:114.



- VOWINKEL,K. 1976. Flussregenpfeifer *Charadrius dubius* frisst den Inhalt zerstorten Eier. *Anz. orn. Ges. Bayern* 15:222.
- WALTERS,J. 1955. Het opruimen van beschadigde eieren bij Kleine Pluvier en Strandpluvier. [Removing damaged eggs by Little Ringed and Kentish Plovers.] *Natura* 55: 89-91. In Dutch.
- WALTERS,J. 1956. Eiruckgewinnung und Nistplatz orientierung bei See- und Flussregenpfeifer. *Limosa* 29: 103-129.
- WALTERS,J. 1957a. Über den Balzruf des Flussregenpfeifers. *Ardea* 45: 62-72.
- WALTERS,J. 1957b. Das Fortschaffen beschädigter Eier bei Fluss- und Seeregenpfeifer. *Orn. Mitt.* 9: 27-28.
- WALTERS,J. 1958. Über die Brutflecktemperaturen bei See- und Flussregenpfeifern. *Ardea* 46: 124-138.
- WALTERS,J. 1961. Notes on the chicks of the Little Ringed Plover. *Bird Study* 8: 15-18.
- WASSENICH,V. 1974. Diskussionsbeitrag zum Thema Wassertransport beim Flussregenpfeifer, *Charadrius dubius*. *Regulus* 11: 130-142.
- WEBER,H. 1941. Brutbeobachtungen vom Flussregenpfeifer. *Natur und Heimat* 8: 14-18.
- WERDER,J.-P. & GILLIERON,G. 1978. Site de nidification étonnant pour le Petit Gravelot. *Nos Oiseaux* 34: 354-355.
- WYSS,H. 1946. Beobachtungen an brutenden Flussregenpfeifern. *Orn. Beob.* 43: 61-71.
- ZAGON,A. 1974. Kis lile: *Charadrius dubius* L. feszklesi adatai. [Daten über die Brut des Flussregenpfeifers.] *Aquila* 80/81: 285-286, 303. In Hungarian.

## 6.15. RINGED PLOVER *CHARADRIUS HIATICULA*

- ARMSTRONG,A.E. 1952. The distraction displays of the Little Ringed Plover and territorial competition with the Ringed Plover. *Brit. Birds* 45: 55-59.
- ATKIN,K. 1977. Ringed Plover nesting under cover. *Brit. Birds* 70: 500-501.
- CUISIN,H. 1957. Un curieux comportement du Grand Pluvier à collier (*Charadrius hiaticula*). *Oiseaux France* 19:207.
- DRESSLER,E. & STREIFFELER,H. 1963. Sandregenpfeifer macht einem Austernfischer das Gelege streitig. *Falke* 10: 9-11.
- ECK,S. 1976. Randbemerkungen zur Taxonomie der Sandregenpfeifer. *Beitr. Vogelkd.* 22: 38-48.
- EDWARDS,G., HOSKING,E. & SMITH,S. 1947. Aggressive display of the Ringed Plover. *Brit. Birds* 40: 12-19.
- FERRY,C. Sur la reproduction de *Charadrius hiaticula* en Bretagne. *Alauda* 23: 81-96.
- HAACK,W. 1969. Feldbruten des Sandregenpfeifers im Ostholtsteinischen Binnenland. *Corax* 3: 31-34.
- HOLZ,R., KNEIS,P. & SIEFKE,A. 1982. Investigations on territorial requirements of the Ringed Plover (*Charadrius hiaticula*) and their population-ecological consequences. *Abstracts of Symposia & Poster Presentations XVIII Congr. Int. Orn.*, Moscow: 207-208.
- KESKPAIK,J., IVANOVA,N., KESKPAIK,T. & KALLIS,A. 1970. [The factors determining the structure of stereotypic behaviour of the family groups of *Charadrius h. hiaticula* L.] *Eesti NSV Teaduste Akad. Toimetised Biologia* 19: 95-210. In Russian.
- KNEIS,P. 1980. Eine Beobachtung zur Individualerkennung beim Sandregenpfeifer. *Falke* 27: 342-343.
- KOEHLER,A. & KOEHLER,O. 1935. Brutende Sandregenpfeifer. *Natur und Volk* 65: 27-32.
- KOEHLER,O. & ZAGARUS,A. 1937. Beiträge zum Brutverhalten des Halsbandregenpfeifers. *Beitr. Fort Pfl.Biol. Vogel* 13: 1-9.
- LAIVEN,H. 1938. Beiträge zur Brutbiologie des Halsbandregenpfeifers. *Beitr. Fort Pfl.Biol. Vogel* 14: 49-54, 90-95.
- LAIVEN,H. 1940. Beiträge zur Biologie des Sandregenpfeifers (*Charadrius hiaticula* L.). *J. Orn.* 88: 183-287.
- LAIVEN,H. 1943. Der Legeakt beim Sandregenpfeifer. *Orn. Mber.* 51: 113-116.
- MARPLES,G. 1931. Experimental studies of the Ringed Plover. The retrieving, recognition, orientation and rotation of its eggs by the bird. *Brit. Birds* 25: 34-44.
- MASON,A.G. 1947. Territory in the Ringed Plover. *Brit. Birds* 40: 66-70.
- NEERGAARD PETERSEN,C. 1917. Ejendommelig yngleplads for Praestekraven (*Aegialitis hiaticula*). [Remarkable breeding site of Ringed Plover.] *Dansk Orn. For. Tidsskr.* 11: 145-147. In Danish.
- PIENKOWSKI,M.W. 1978. Studies on the feeding and breeding behaviour of Ringed Plovers in the Mestersvig Area. In: Green,G.H. & Greenwood,J.J.D. (eds.) *Joint biological expedition to North East Greenland 1974*, pp. 69-70. Dundee Univ. Printing Unit, Dundee.
- PIENKOWSKI,M.W. 1983. Development and foraging behaviour in young Ringed Plovers *Charadrius hiaticula* in Greenland and Britain. *Dansk Orn. For. Tidsskr.* 77: 133-147.
- PIENKOWSKI,M.W. 1984. Behaviour of young Ringed Plovers *Charadrius hiaticula* and its relationship to growth and survival to reproductive age. *Ibis* 126: 133-155.
- PIENKOWSKI,M.W. 1984. Breeding biology and population dynamics of Ringed Plovers *Charadrius hiaticula* in Britain and Greenland: nest-predation as a possible factor limiting distribution and timing of breeding. *J. Zool., Lond.* 202: 83-114.
- PLATH,L. 1976. Sandregenpfeifer als Ackerbruter. *Falke* 23: 124-125.
- PRATER,A.J. 1974. Breeding biology of the Ringed Plover *Charadrius hiaticula*. *Proc. Wader Symp. IWRB Warsaw* 1973: 15-22.
- PRATER,A.J. 1976. Breeding biology of the Ringed Plover in Britain. *Bird Study* 23: 155-161.
- REGNELL,S. 1965. (A short contribution to the breeding biology of the Ringed Plover (*Charadrius hiaticula*).) *Var Fagelvärld* 24: 310-313. In Swedish with English summary.
- RITTINGHAUS,H. 1953. Adoptionsversuche mit Sand- und Seeregenpfeifern. *J. Orn.* 94: 144-159.
- ROSE,G. 1983. Erfolgreiche Brut eines Sandregenpfeifers (*Charadrius hiaticula*) trotz ungewöhnlich kritischer Gelegelage. *Vogelk. Ber. Niedersachs.* 15:84.

- SIEFKE,A. 1982. Grosse und Struktur eines Brutbestandes des Sandregenpfeifers in ihrer Beziehung zu Dismigration und lokalen Umwelteinflüssen. *Beitr. Vogelkd.* 28: 89-106.
- SIEFKE,A. 1982. Formation and fidelity of pairs in populations of Ringed Plover (*Charadrius hiaticula*). *Abstracts of Symposia & Poster Presentations XVIII Congr. Int. Orn., Moscow*: 285-286.
- SIEFKE,A. 1983. Beobachtungen zur Tages-Brutrhythmis des Sandregenpfeifers bei Bigynie. *Beitr. Vogelkd.* 29: 103-106.
- SIMMONS,K.E.L. 1953. Some aspects of the aggressive behaviour of three closely related plovers (*Charadrius*). *Ibis* 95: 177-188.
- SLUITERS,J.E. 1954. Waarnemingen over de drie bij Amsterdam broedende pluviersoorten (*Leucopolius a. alexandrinus*, *Charadrius dubius curonicus*, en *Ch. h. hiaticula*). [Observations on three plover species breeding near Amsterdam: Kentish, Little Ringed and Ringed Plover.] *Limosa* 27: 71-86. In Dutch with English summary.
- SMITH,T.L. 1921. A Ringed Plover's "nests". *Brit. Birds* 15: 26-32.
- STEIN,F. 1966. Vergleichende morphologische und ethologische Untersuchungen zur Jugendentwicklung von Fluss- und Sandregenpfeifer. *Beitr. Vogelkd.* 11: 221-246.
- TAYLOR,R.C. 1974. A method for sexing adult Ringed Plovers *Charadrius hiaticula* L. in summer plumage. *Wader Study Group Bull.* 11: 15-17.
- VAISANEN,R.A. 1969. Evolution of the Ringed Plover (*Charadrius histicula* L.) during the last hundred years in Europe. *Ann. Acad. Sci. Fenniae A IV Biologica* 149: 1-90.
- WALTERS,J. 1982. Van plevieren, sterns en mensen. [On plovers, terns and people.] *Vogels* 2: 220-223. In Dutch.
- WELLS,M.J. & JACKSON,D.B. 1985. Utilisation of habitat by Ringed Plovers (*Charadrius hiaticula*) breeding on South Uist, Outer Hebrides. *Wader Study Group Bull.* 45: 9-10. Abstract.
- WILLIAMSON,K. 1947. The distraction display of the Ringed Plover. *Ibis* 89: 511-513.

## 6.16. KENTISH PLOVER *CHARADRIUS ALEXANDRIDUS*

- BARRETT,J. 1946. Ground display of Kentish Plover. *Brit. Birds* 39: 286-287.
- BOYD,R.L. 1972. Breeding biology of the Snowy Plover at Cheyenne Bottoms Waterfowl Management Area, Barton Country, Kansas. M.Sc. Thesis, Kansas State Teachers College, Emporia.
- DECROIX,G. & KERAUTRET,L. 1972. Notes sur la reproduction et le comportement du Gravelot a collier interrompu sur le littoral du Leon. *Ar Vran* V(1): 5-8.
- DOS SANTOS JUNIOR,J.R. 1982. Um ninho de borrelo *Charadrius alexandrinus*. [A young of the Kentish Plover.] *Cyanopica* 2: 17-32. In Portuguese.
- DYBBRO,T. 1970. (The Kentish Plover as a breeding bird in Denmark.) *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 64: 205-222. In Danish with English summary.
- ERARD,C. 1963. Sur le comportement de diversion de Gravelot a collier interrompu a l'egard de l'homme. *Alauda* 31: 262-284.
- GREVE,K. 1958. Polygamie beim Seeregenpfeifer (*Charadrius alexandrinus*). *Vogelwelt* 99:184.
- KAINADY,P.V.G. & AL-DABBAGH,K.Y. 1976. Some Observations on the behaviour of incubating *Charadrius alexandrinus* on hot summer days. *Bull. Barash. nat. Hist. Mus.* 3: 121-137.
- LESSELS,K. 1983. Le role de la predation dans l'évolution de la taille des familles chez le Gravelot a collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*) (Camargue). *Rap. Ann. Station Biol. de la Tour du Valat* 1983: 57-60.
- LESSELS,C.M. Breeding biology of the Kentish Plover. *Wader Study Group Bull.* 37:8. Abstract.
- LESSELS,C.M. 1983. The mating system of Kentish Plovers *Charadrius alexandrinus*: some observations and experiments. *Wader Study Group Bull.* 39:43. Abstract.
- LESSELS,C.M. 1984. The mating system of Kentish Plovers *Charadrius alexandrinus*. *Ibis* 126: 474-483.
- NAKAZAWA,R. 1979. (Incubation behaviour of the Kentish Plover *Charadrius alexandrinus* with special reference to the share of sexes and effect ground temperature.) *J. Yamashina Inst. Ornithol.* 11: 54-63. In Japanese with English summary.
- PAGE,G.W., STENZEL,L.E., WINKLER,D.W. & SWARTH,C.W. 1983. Spacing out at Mono Lake: breeding success, nest density, and predation in the Snowy Plover. *Auk* 100: 13-24.
- PAGE,G.W., WARRINER,J.S., WARRINER,J.C. & STENZEL,L.E. 1983. Polygamous breeding in Snowy Plovers. *Wader Study Group Bull.* 39:60. Abstract.
- PAGE,G.W., STENZEL,L.E. & RIBIC,C.A. 1985. Nest site selection and clutch predation in the Snowy Plover. *Auk* 102: 347-353.
- PURDUE,J.R. 1976a. Thermal environment of the nest and related parental behavior in Snowy Plovers *Charadrius alexandrinus*. *Condor* 78: 180-185.
- PURDUE,J.R. 1976b. Adaptations of the Snowy Plover on the Great Salt Plains, Oklahoma. *S. West Nat.* 31: 347-357.
- PURDUE,J.R. & HAINES,H. 1977. Salt water tolerance and water turnover in the Snowy Plover. *Auk* 94: 248-255.
- RITTINGHAUS,H. 1950. Über das Verhalten eines vom Sandregenpfeifer ausgebrüteten und geführten Seeregenpfeifers. *Vogelwarte* 15: 187-192.
- RITTINGHAUS,H. 1953. Adoptionsversuche mit Sand- und Seeregenpfeifern. *J. Orn.* 94: 144-159.
- RITTINGHAUS,H. 1956. Untersuchungen am Seeregenpfeifer (*Charadrius alexandrinus* L.) auf der Insel Oldeoog. *J. Orn.* 97: 117-155.
- RITTINGHAUS,H. 1957. Missbildungen an Füssen bei frischgeschlüpften Seeregenpfeifern. *Natur und Volk* 87: 103-108.
- RITTINGHAUS,H. 1961. Der Seeregenpfeifer, *Charadrius alexandrinus*. Die Neue Brehm-Bucherei, Band 282. Wittenberg-Lutherstadt, 126 pp.
- ROBILLER,F. & BOUZMANN,K. 1980. [Further data on inter-nest distances of Avocets and

- Kentish Plover at Budosszek-to in Hungary.] *Falke* 27: 152-157. In German.
- SCHENK,J. 1934. A szeki lile feszkelese Budapesten. [Das nisten des Seeregenpfeifers.] *Term. tud. Kozl.* 66: 45-64.
- SIMMONS,K.E.L. 1951. Distraction-display in the Kentish Plover. *Brit. Birds* 44: 181-187.
- SIMMONS,K.E.L. 1953. Some aspects of the aggressive behaviour of three closely related plovers (*Charadrius*). *Ibis* 95: 177-188.
- SIMMONS,K.E.L. 1955. The significance of voice in the behaviour of the Little Ringed and Kentish Plovers. *Brit. Birds* 48: 106-114.
- SLUITERS,J.E. 1954. Waarnemingen over de drie bij Amsterdam broedende pluviersoorten (*Leucopolius a. alexandrinus*, *Charadrius dubius curonicus* en *Ch. h. hiaticula*). [Observations on three plover species breeding near Amsterdam: Kentish, Little Ringed and Ringed Plover.] *Limosa* 27: 71-86. In Dutch with English summary.
- STANESCU,D. 1971. (Versuch eines Ethogramms des Seeregenpfeifers wahrend der Brutzeit.) *Stud. Com. Muz. Brukenthal* 16: 285-313. In Rumanian with German summary.
- STERBETZ,I. 1957. (Data on the nesting of the Avocet and the Kentish Plover in the surroundings of Hodmezovasarhely.) *Aquila* 63/64: 278, 338. In Hungarian with English summary.
- STOEPKER,M.C. & DIJKSEN,A.J. 1977. Strandplevier broedt Swee maal. [Kentish Plover breeds twice.] *Watervogels* 2: 20-21. In Dutch.
- TRIPLET,P. 1979. Comportement du Gravelot a collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*). *Avocette* 3(3-4):38.
- WALTERS,J. 1960. Uber das Kukenstadium des Seeregenpfeifers. *Vogelwelt* 81: 91-94.
- WALTERS,J. 1962. Zum Thema: Balzflug und ruf des Seeregenpfeifers. *Vogelwelt* 83: 139-142.
- WALTERS,J. 1954a. Der Brutanteil der Geschlechter beim Seeregenpfeifer. *Vogelwelt* 72: 185-188.
- WALTERS,J. 1954b. De alarmroep van de Strandpluvier. [The alarmcall of the Kentish Plover.] *Natura* 51: 45-46. In Dutch.
- WALTERS,J. 1955. Het opruimen van beschadigde eieren bij de Kleine Pluvier en Strandpluvier. [Removal of damaged eggs by Little Ringed and Kentish Plover.] *Natura* 52: 89-91.
- WALTERS,J. 1956. Eiruckgewinnung und Nistplatzorientierung bei See- und Flussregenpfeifer. *Limosa* 29: 103-129.
- WALTERS,J. 1957a. Das Fortschaffen beschädigter Eier bei Fluss- und Seeregenpfeifer. *Orn. Mitt.* 9: 27-28.
- WALTERS,J. 1957b. Gedrag in de legperiode en arbeidsverdeling bij de Strandpluvier. [Behaviour during laying and parental labour division in the Kentish Plover.] *Ardea* 45: 24-62. In Dutch with English summary.
- WALTERS,J. 1959. Waarnemingen bij twee Strandplevierenbroedsels op Texel. [Observations on two Kentish Plover-broods on Texel.] *Ardea* 47: 48-67. In Dutch.
- WARRINER,J. & WARRINER,R. 1977. The Snowy Plover project. *Point Reyes Bird Obs.* 42: 1-2.
- WARRINER,J. & WARRINER,R. 1978. Pajaro's Plovers. *Point Reyes Bird Obs.* 45: 4-5.
- WIDRIG,R.S. 1979. Reincubation of flooded Snowy Plover *Charadrius alexandrinus* nest. *Wader Study Group Bull.* 27:40. Abstract.
- WILSON,R.. 1980. *Snowy Plover nesting ecology on the Oregon coast.* M.Sc. Thesis, Oregon State University, Cornwallis.
- WILSON-JACOBS,R. & MESLOW,E.C. 1984. Distribution, abundance and nesting characteristics of Snowy Plovers on the Oregon Coast. *Northwest Sci.* 58: 40-48.
- ZIMMERMANN,H. 1951. Zur Brutbiologie des Seeregenpfeifers. *Orn. Mitt.* 3: 270-273.

## 6.17. DOTTEREL *CHARADRIUS MORINELLUS*

- BYRKJEDAL,I. 1983. Coexistence of Golden Plover and Dotterel on the breeding grounds: coexistence or symbiosis? *Wader Study Group Bull.* 39: 48-49. Abstract.
- FRANKE,H. 1952. Unser Mornellregenpfeifer. *Vogelkd. Nachr. Osterr.* 1: 2-3.
- FRANKE,H. 1953. Zur Biologie des Mornellregenpfeifers. *Photographie und Forschung* 5: 200-206.
- HABLE,E. & PRASEN,I. 1978. Erfahrungen bei der Handaufzucht von Kuken des Mornellregenpfeifers, *Eudromias morinellus* (L.). *Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum* 7(2): 89-93.
- GILROY,N. 1923. Observations on the nesting of the Dotterel. *Ool. Rec.* 3: 1-7.
- HAVILAND,M. 1917. Notes on the breeding habits of the Dotterel on the Yenesei. *Brit. Birds* 11: 6-11.
- HEYDER,R. 1962. Nachlese zur Verbreitung und Biologie des Mornellregenpfeifers. *Zool. Abh. Ber. Mus. Tierkd. Dresden* 26: 103-111.
- HILDEN,O. 1966. Über die Brutbeteiligung der Geschlechter beim Mornellregenpfeifer, *Charadrius morinellus* L. *Ornis Fenn.* 43: 16-19.
- KALAS,J.A. & BYRKJEDAL,I. 1984. Breeding chronology and mating system of the Eurasian Dotterel (*Charadrius morinellus*). *Auk* 101: 838-847.
- KOPKE,G. 1967. Beobachtungen am Brutplatz des Mornellregenpfeifers. *Orn. Mitt.* 19: 247-249.
- NETHERSOLE-THOMPSON,D. 1973. *The Dotterel.* Collins, London, 288 pp.
- PAGE,D. 1978. Female Dotterel tending chick. *Brit. Birds* 71:38.
- PULLIAINEN,E. 1970. On the breeding biology of the Dotterel *Charadrius morinellus*. *Ornis Fenn.* 47: 69-73.
- PULLIAINEN,E. 1971. Breeding behaviour of the Dotterel (*Charadrius morinellus*). *Varrio Subarctic Res. Sta. Dept.* 24.
- RITTINGHAUS,H. 1962. Untersuchungen zur Biologie des Mornellregenpfeifers (*Eudromias morinellus* L.) in Swedish Lappland. *Z. Tierpsychol.* 19: 539-558.
- STEINIGER,F. 1953. Beiträge zur Brutbiologie des Mornellregenpfeifers. *Vogelwelt* 74: 81-91.
- WILKIE,A. 1980. Incubation behaviour of the Dotterel. In: Innes,J.L. (ed.) *Cambridge Norwegian Expedition 1978 Report:* 34-58.
- WILKIE,A.O.M. 1981. Incubation rhythm and behaviour of a Dotterel *Charadrius morinellus* nesting in Norway. *Ornis Fenn.* 58: 11-20.

## 6.18. GOLDEN PLOVER *PLUVIALIS APRICARIA*

- BENGTSON,S.-A., NILSSON,A., NORDSTROM,S. & RUNDGREN,S. 1976. Effect of bird predation on lumbricid populations. *Oikos* 27: 9-12.
- BENGTSON,S.-A., RUNDGREN,S., NILSSON,A. & NORDSTROM,S. 1978. Selective predation on lumbricids by Golden Plover *Pluvialis apricaria*. *Oikos* 31: 164-168.
- BRINKMANN,W. 1941. Vom Zug- und Brutleben des Goldregenpfeifers im Emslands. *Orn. Mber.* 49: 12-15.
- BYRKJEDAL,I. 1975. (Skeletal remains of microrodents as a source of calcium for Golden Plovers, *Pluvialis apricaria*, during the egg-laying period.) *Sterna* 14: 197-198. In Norwegian with English summary.
- BYRKJEDAL,I. 1978. Variation and secondary interpretation in S.W. Norwegian Golden Plover *Pluvialis apricaria* populations. *Ornis Scand.* 9: 101-110.
- BYRKJEDAL,I. 1978. Altitudinal differences in breeding schedules of Golden Plovers *Pluvialis apricaria* (L) in south Norway. *Sterna* 17: 1-20.
- BYRKJEDAL,I. 1980. Summer food of the Golden Plover *Pluvialis apricaria* at Hardangervidda, southern Norway. *Hol. Ecol.* 3: 40-49.
- BYRKJEDAL,I. 1983. Coexistence of Golden Plover and Dotteral on the breeding grounds: competition or symbiosis? *Wader Study Group Bull.* 39: 48-49. Abstract.
- BYRKJEDAL,I. 1985. Time-activity budget for breeding Greater Golden Plovers in Norwegian mountains. *Wilson Bull.* 97: 486-501.
- BYRKJEDAL,I. & KALAS,J.A. 1983. Plover's Page turns into Plover's Parasite: a look at the Dunlin/Golden Plover association. *Ornis Fenn.* 60: 10-15.
- CAMPBELL,L.H. 1978. Notes on the breeding biology of the Golden Plover in Southern Scotland. *Edinburgh Ringing Group Report* 1978: 37-38.
- EDWARDS,P.J. 1982. Plumage variation, territoriality and breeding displays of the Golden Plover *Pluvialis apricaria* in southwest Scotland. *Ibis* 124: 88-96.
- KOPKE,G. 1971. Beobachtungen an Goldregenpfeifer-Brutplätzen im westlichen Niedersachsen. *Orn. Mitt.* 23: 87-90.
- LANGSLOW,D.R. 1983. Breeding ecology of the upland Golden Plover. In: Boyd,H. (ed.) *First western hemisphere waterfowl and waterbird symposium IWRB*, 1983: 101-104.
- NETHERSOLE-THOMPSON,D. & NETHERSOLE-THOMPSON,C. 1961. The breeding behaviour of the British Golden Plover. In: Bannerman,D.A. (ed.) *The Birds of the British Isles* 10: 206-214.
- PARR,R. 1979. Sequential breeding by Golden Plovers. *Brit. Birds* 72: 499-503.
- PARR,R. 1980. Population study of Golden Plover, *Pluvialis apricaria*, using marked birds. *Ornis Scand.* 11: 179-189.
- PARR,R. 1981. Trapping and colour-ringing Golden Plovers in NE Scotland. *Ring* 1981: 244-246.
- PITT,F. 1929. Notes on the effect of temperature upon the breeding behaviour of birds, with special reference to the Northern Golden Plover and the Fieldfare (*Turdus pilaris*). *Ibis* 12(5): 53-71.
- RATCLIFFE,D.A. 1976. Observations on the breeding of the Golden Plover in Great Britain. *Bird Study* 23: 63-116.
- SAUER,E.G.F. 1962. Ethology and ecology of Golden Plovers on St. Lawrence Island, Bering Sea. *Psych. Forschung* 26: 399-470.
- REED,T.M. & LANGSLOW,D.R. 1985. The timing of breeding in the Golden Plover *Pluvialis apricaria*. In: Taylor,K., Fuller,R.J. & Lack,P.C. (eds.). *Bird census and atlas studies*. BTO, Tring, pp. 123-129.
- STEINIGER,F. 1959. *Die Grossen Regenpfeifer. Neue Brehm Bucherei*, Band 240. Wittenberg-Lutherstadt, 90 pp.
- WILLIAMSON,K. 1948. Field notes on nidification and distraction-display in the Golden Plover. *Ibis* 90: 90-98.

## 6.19. LAPWING *VANELLUS VANELLUS*

- AGARDI,E. 1921. *Vanellus vanellus* L. korai feszkesele. [Fruhes Bruten von Kiebitz.] *Aquila* 28: 172, 206. In Hungarian.
- ALATALO,R. 1976. (Exceptional repeat nesting in Great Tit (*Parus major*) and the Lapwing (*Vanellus vanellus*)). *Aureola* 1: 68-72. In Finnish with English summary.
- BEINTEMA,A.J. 1978. Kievitseieren en kuikens in de kou. [Lapwing eggs and chicks in the cold.] *Vogeljaar* 26: 74-78. In Dutch.
- BERGER,G. 1980. Durch Kalteeinbruch bedingte Verhaltensreaktionen bei Kiebitzen (*Vanellus vanellus* L.). *Beitr. Vogelkd.* 26: 58-59.
- BESER,H.J. 1983. Schachtelbrut beim Kiebitz (*Vanellus vanellus* L.). *Charadrius* 19:11.
- BESER,H.J. 1983. Mauserbeginn bei brutenden Kiebitzen (*Vanellus vanellus* L.). *Charadrius* 19: 11-13.
- BESER,H.J. & HELDEN-SARNOWSKI,S.VON. 1982. Zur Ökologie einer Ackerpopulation des Kiebitzes *Vanellus vanellus*. *Charadrius* 18: 93-113.
- BLASZYK,P. 1960. Verhalten und Verluste beim Kiebitz und einiger anderen Vogelarten im Durrejahr 1959. *Vogelwelt* 81: 97-112.
- BOANO,G. & VASCHETTI,B. 1984. (A record of possible double clutch in the Lapwing *Vanellus vanellus*. *Avocetta*) 8: 43-44. In Italian with English and French summaries.
- BOHAC,D. 1963. Sysel jako skudce nasad cejky chocholate. [Pouched marmot like enemy of Lapwing's clutch.] *Ziva* 11:141.
- BROWN,R.H. 1936. The food of young Lapwings. *Brit. Birds* 30:134.
- BUB,H. 1975. Flugelmasse und Gewichte einer Kiebitz-Population in Nordwest-Deutschland. *Beitr. Naturk. Niedersachs* 28: 14-18.
- BURKLI,W. & JUAN,M. 1984. Aussergewöhnliche Brut des Kiebitz *Vanellus vanellus* in Oberengadin. *Orn. Beob.* 81:72.
- DABELSTEEN,T. 1978. An analysis of the song flight of the Lapwing (*Vanellus vanellus* L.) with respect to causation, evolution, and adaptations to signal function. *Behaviour* 66: 136-178.
- DIRKSEN,S. 1981. Dicht bij elkaar broeden van Kievit en Tureluur. [Close breeding of Lapwings and Redshanks.] *Aythya* 20(3): 18-23. In Dutch.

- DRESCHER,E. 1910. Über Nesttreue eines Kiebitzparchens. *Ber. Ver. schles. Orn.* 3: 48-51.
- DRESCHER,E. 1913. Eine Kiebitzstudie. *Ber. Ver. schles. Orn.* 5: 20-33.
- ELLIOT,R.D. 1985. The exclusion of avian predators from aggregations of nesting lapwings (*Vanellus vanellus*). *Anim. Behav.* 33: 308-314.
- ELLIOT,R.D. 1985. The effects of predation risk and group size on the anti-predator responses of nesting Lapwings *Vanellus vanellus*. *Behaviour* 93: 168-187.
- ENNION,E.A.R. 1949. *The Lapwing*. Methuen, London, 47 pp.
- ERIKSSON,M.O.G. & GOTMARK,F. 1982. Habitat selection: do passerines nest in association with Lapwings *Vanellus vanellus* as defence against predators? *Ornis Scand.* 13: 189-192.
- ETTRUP,H. & BAK,B. (Breeding season, clutch size and young production of Danish Lapwings *Vanellus vanellus*.) *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 79: 43-55. In Danish with English summary.
- FELLENBERG,W.O. 1967. Zur Brutverbreitung und Brutbiologie des Kiebitzes in Sauerland. *Anthus* 4: 41-50.
- FRISCH,O.VON. 1957. Brutgemeinschaft Rotschenkel-Kiebitz. *Vogelwelt* 78: 153-155.
- FRISCH,O.VON. 1959. Kiebitzbruten in Gefangenschaft mit Aufzucht von Rotschenkeln durch ein Kiebitzpaar. *J. Orn.* 100: 307-312.
- FULLER,R.J. 1983. The relative growth of bill, tarsus and wing of Lapwing chicks in the Outer Hebrides. *Ring. & Migr.* 4: 139-144.
- GLOE,P. 1982. Enge Brutnachbarschaft von Kiebitz (*Vanellus vanellus*) und Rotschenkel (*Tringa totanus*). *Orn. Mitt.* 34:201.
- HAVERSCHMIDT,F. 1984. Het eerste kievitsei 1969-1984. [The first lapwing-egg 1969-1984.] *Vanellus* 37:96. In Dutch.
- HAVILAND,M. 1915. Notes on the courtship of lapwing. *Zoologist* 4(19): 217-225.
- HEER,E. 1983. Erdklumpen an Zehen gefährden Kiebitzkuken (*Vanellus vanellus*). *Orn. Mitt.* 35:189.
- HEIM,J. 1959. Gewichtszunahme von Jungkiebitzen bei natürlichen Aufwachsen. *Orn. Beob.* 56: 2-8.
- HEIM,J. 1962. Beobachtungen an einem farberingten Kiebitzweibchen. *Orn. Beob.* 59: 65-69.
- HEIM,J. 1974. Eiablage, Gelegegrosse und Brutdauer beim Kiebitz. *Orn. Beob.* 71: 283-288.
- HEIM,P.J. 1978. (Data on populations and ecology of the Lapwing *Vanellus vanellus* in the Nuoler Ried, 1948-1977.) *Orn. Beob.* 75: 85-94. In German with English summary.
- HEINS,R. 1982. Schlupftermine und Schlupferfolg beim Kiebitz (*Vanellus vanellus*). *Corax* 9:46.
- HILL,B. 1983. Hand-rearing the Lapwing *Vanellus vanellus* and related observations. *Avic. Mag.* 89: 77-83.
- HOGSTEDT,G. 1974. Length of the pre-laying period in the Lapwing *Vanellus vanellus* L. in relation to its food resources. *Ornis Scand.* 5: 1-4.
- IMBODEN,C. 1970. Zur Ökologie einer Randzones-Population des Kiebitz in der Schweiz. *Orn. Beob.* 67: 41-58.
- IMBODEN,C. 1971. Der Biotop des Kiebitz in der Schweiz. *Rev. Suisse Zool.* 78: 578-586.
- IMBODEN,C. 1974. Zug, Freindansiedlung und Brutperiode des Kiebitz in Europa. *Orn. Beob.* 71: 5-134.
- JACKSON,R. & JACKSON,J. 1975. A study of breeding Lapwings in the New Forest, Hampshire 1971-1974. *Ring. & Migr.* 1: 18-27.
- KIRCHHOFF,K. 1971. Kiebitz, Brutverbreitung, Brutbiologie und Zug in Berichtsgebiet. *Hamburger avifaun. Beitr.* 9: 47-99.
- KIRSCH,K.W. 1974. Brutzeiterhebungen beim Kiebitz (*Vanellus vanellus*) im Landkreis Lüneburg. *Vogelk. Ber. Niedersachs.* 6: 15-16.
- KLABNIK,L. 1984. [A contribution to the population dynamics and breeding bionomy of the Lapwing (*Vanellus vanellus* L.) in the Sluknov headland.] *Zpravy MOS* 1984: 107-120. In Czech with German summary.
- KLOMP,H. 1951. Over de achteruitgang van de Kievit in Nederland en gegevens over het legmechanisme en het eiproduktievermogen. [On the decline of the Lapwing in The Netherlands and data on the laying-mechanism of egg-production capacity.] *Ardea* 39: 143-182. In Dutch with English summary.
- KLOMP,H. 1954. De terreinrekeus van de Kievit. (Habitat selection in the Lapwing.) *Ardea* 42: 1-139. In Dutch with English summary.
- KLOMP,H. & SPEEK,B.J. 1971. Survival of young Lapwings in relation to time of hatching. *Bird Study* 18: 229-231.
- KOOIKER,G. 1977. Über aktuelle und potentielle Storfaktoren einer Kiebitzpopulation während der Brutt- und Aufzugsperiode. *Orn. Mitt.* 29: 112-119.
- KOOIKER,G. 1979. Beobachtungen über das Feindverhalten beim Kiebitz (*Vanellus vanellus*). *Orn. Mitt.* 31: 299-332.
- KOOIKER,G. 1983. Der Kiebitz (*Vanellus vanellus*) - Zur Ökologie flugbetriebsgefährdender Vogelarten. *Vogel und Luftverkehr* 3: 52-59.
- KOOIKER,G. 1984. Brutökologische Untersuchungen an einer Population des Kiebitzes (*Vanellus vanellus*). *Vogelwelt* 105: 121-132.
- KOOIKER,G. 1985. Zum Verhalten und zur tageszeitlichen Aktivität von zwei Kiebitz-Männchen (*Vanellus vanellus*) in der Vorbrutphase (Marz). *Vogelwelt* 106: 93-100.
- KVAERLUND,M. 1973. (Is the lapwing a "watch-dog" for other wader species?) *Sterna* 12: 85-90. In Norwegian with English summary.
- LAVEN,B. 1941. Beobachtungen über Balz und Brut beim Kiebitz (*Vanellus vanellus* L.). *J. Orn., Ergänzungsnrbd.* III: 1-64.
- LEUZINGER,H. 1982. Erdklumpen an Zehen und Schnabel von Kiebitzkuken (*Vanellus vanellus*). *Orn. Beob.* 79: 65-66.
- LIND,H. 1957. Territorialopforsel hos Vibe (*Vanellus vanellus* L.) am efterarert. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 51: 22-29. In Danish.
- LISTER,M.D. 1939. An account of the Lapwing population on a Surrey farm. *Brit. Birds* 32: 260-271.
- LISTER,M.D. 1964. The Lapwing habitat enquiry, 1960-61. *Bird Study* 11: 128-147.
- MATTER,H. 1976. Auswirkung des Wetters auf die Kukensterblichkeit beim Kiebitz. Lizentiatarbeit, Universität Bern.
- MATTER,H. 1982. Einfluss intensiver Feldbauernwirtschaft auf den Bruterfolg des Kiebitzes *Vanellus vanellus* in Mitteleuropa. *Orn. Beob.* 79: 1-24.
- MESTER,H. 1978. Zur Biologie von Kiebitz-Federlingen. *Angew. Parasitol* 19: 20-28.
- MEY,E. 1980. Bigynie beim Kiebitz. *Beitr. Vogelkd.* 26:59.
- MOHRING,G. 1961. Aussergewöhnlicher Brutplatz des Kiebitz. *Beitr. Vogelkd.* 7:365.
- NETHERSOLE-THOMPSON,D. 1961. The breeding behaviour and breeding biology of the Lapwing. In: Bannermann,D.A. (ed.) *The Birds of the British Isles* 10: 265-274.

- NICHOLSON,E.M. 1938/39. Report on the Lapwing habitat inquiry, 1937. *Brit. Birds* 32: 170-191, 207-229, 255-259.
- NITSCHE,G. 1982. Zwerg-ei im Kiebitzgelege (*Vanellus vanellus*). *Orn. Mitt.* 34:204.
- NOVRUP,L. 1937. Viberede med 5 aeg. *Flora og Fauna* 43:176. In Danish.
- PETERSEN,B. 1965. Viberede med 5 aeg. *Feldornithologen* 7:26 In Danish.
- PRILL,H. 1976. Auswirkungen einer Trockenperiode auf den Brutbestand einer Kiebitzpopulation. *Falke* 23: 11-13.
- RASMUSSEN,C.A. 1942. Nar Viben har aeg. Naver, Kobenhavn, 50 pp. In Danish.
- REDFERN,C. 1980. The growth and development of Lapwing pulli. *Edinburgh Ringing Group Report* 8: 23-31.
- REDFERN,C.P.F. 1982. Lapwing nest sites and chick mobility in relation to habitat. *Bird Study* 29: 201-208.
- REDFERN,C.P.F. 1983. Aspects of the growth and development of Lapwings *Vanellus vanellus*. *Ibis* 125: 266-272.
- REDFERN,C.P.F. 1983. An analysis of nesting success and hatching success in a Lapwing population. *Wader Study Group Bull.* 39: 31-32.
- RINKEL,F. 1942. Waarnemingen over het gedrag van de Kievit (*Vanellus vanellus* (L.)) gedurende de broedfijd. [Observations on the behaviour of the Lapwing in the breeding period.] *Ardea* 29: 108-147. In Dutch.
- SCHENK,H. 1930. Nadasban kolto bibicek. [Im Rohr brutende Kiebitz.] *Aquila* 36/37: 308, 339. In Hungarian.
- SCHLAFER,W. 1979. Teichralle - *Gallinula chloropus* - totet und verzehrt Kiebitzkuken - *Vanellus vanellus*. *Luscinia* 44:90.
- SEITZ,A. 1950. Beobachtungen über die Bodenbalz beim Kiebitz. Ein Versuch zur Analyse der Paarbildung. *Z. Tierpsychol.* 7: 275-286.
- SPENCER,K.G. 1953. *The Lapwing in Britain*. Brown, London, 166 pp.
- STIEFEL,A. 1961. *Beitrage zur Biologie und Ethologie des Kiebitzes (Vanellus vanellus L.)*. Unveroff. Diplom-Arbeit Zool. Inst. der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg.
- SVENSSON,L.O. 1973. (Probable polygamy in the Lapwing, *Vanellus vanellus*.) *Var Fagelvarld* 32:47. In Swedish with English summary.
- SZCEPANIK,A. 1983. (Nesting of *Vanellus vanellus* on water-pasture in Warta Valley.) *Pozn. Kw. Przyj Nauk, Wydz. Mat.-Przyr., Pr. Kom. Biol.* 67: 43-55. In Polish with English summary.
- THOMAS,J.F. 1937. Incubation periods of some waders and fledgling period of lapwing. *Brit. Birds* 33:85.
- TIMMERMAN,A. & MORZER BRUYNS,M.F. 1959. Het broedseizoen van de Kievit *Vanellus vanellus* in 1957. [The breeding season of the Lapwing in 1957.] *Ardea* 47: 87-98.
- TOFT,G.O. 1984. Conflict of interests between the sexes, and possible mate fidelity in polygynously mated Lapwings *Vanellus vanellus*. *Ornis Fenn.* 16:124.
- TOLMAN,R. 1969. *De Kievit. [The Lapwing.]* Bosch & Keuning. Baarn, 183 pp. In Dutch.
- TOOK,G.E. 1966. Lapwing driving sheep from nest. *Brit. Birds* 30:90.
- ULRICH,A. 1973. Die Verbreitung des Kiebitzes in Kreis Wolmirstedt und der Einfluss unterschiedlicher Wasserstandsverhaltrusse auf den jährlichen Brutbestand. *Apus* 3: 10-16.
- VEPSALAINEN,K. 1968. The effect of the cold spring 1966 upon the Lapwing in Finland. *Ornis Fenn.* 45: 33-47.
- WITTRUP JENSEN,C.J. 1963. Vibepar med spaede. *Feldornithologen* 5:79. In Danish.
- ZHUKOV,V.S. 1982. [Territorial behaviour of the Lapwing (*Vanellus vanellus*) in Baraba steppe.] *Ornitologia* 17: 181-182. In Russian.



## 6.20. KNOT *CALIDRIS CANUTUS*

- DOROGOY,I.V. 1982. (Materials to Biology of the Knot on the Wrangel Island.) *Vestnik Zool.* 1982(5): 65-69. In Russian with English summary.
- EKBLAW,W.E. 1918. Finding the nest of the Knot. *Wilson Bull.* 30: 97-100.
- FLINT,V.E. 1972. The breeding of the Knot on Wrangelya (Wrangel) Island, Siberia: comparative remarks. *Proc. West. Found. Vertebr. Zool.* 2: 27-29.
- HARRISON,C.J.O. 1965. A re-examination of alleged eggs of the Knot (*Calidris canutus*). *Ool. Rec.* 39: 2-3.
- HOBSON,W. 1972. The breeding biology of the Knot (*Calidris c. canutus*) with special reference to arctic non-breeding. *Proc. West. Found. Vertebr. Zool.* 2: 5-26.
- NETTLESHIP,D.N. 1967. *Breeding biology of Ruddy Turnstones and Knots at Hazen Camp, Ellesmere Island, N.W.T.* - M.Sc. Thesis, Univ. Saskatchewan, Saskatoon, Canada, 175 pp.
- NETTLESHIP,D.N. 1968. The incubation period of the Knot. *Auk* 85:687.
- NETTLESHIP,D.N. 1974. The breeding of the Knot *Calidris canutus* at Hazen Camp, Ellesmere Island, N.W.T. *Polarforschung* 44: 8-26.
- PLESKE,T. 1928. Birds of the Eurasian Tundra. *Mem. Boston Soc. Nat. Hist.* 6: 267-273.
- SPERRY,C.C. 1940. Food habits of a group of shorebirds: woodcock, snipe, knot and dowitcher. *Wildl. Res. Bull.* 1: 1-37.
- TICEHURST,C.B. 1930. Remarks of the downy young of the Knot and other waders. *Bull. Brit. Orn. Club* 51: 5-9.
- WITTS,B.F. undated. Waders. Section 4D. In: *The report of the Joint Services Expedition to Princess Marie Bay, Ellesmere Island, 1980.* 4D1-27.

## 6.21. SANDERLING *CALIDRIS ALBA*

- GREEN,G.H. 1975. Sanderling, Greenland and colour rings. *Wader Study Group Bull.* 15: 13-15.
- PARMELEE,D.F. 1970. Breeding behavior of the Sanderling in the Canadian High Arctic. *Living Bird* 9: 97-146.
- PARMELEE,D.F. & PAYNE,R.B. 1973. On multiple broods and the breeding strategy of arctic Sanderlings. *Ibis* 115: 218-226.
- PIENKOWSKI,M.W. & GREEN,G.H. 1976. Breeding biology of Sanderlings in north-east

- Greenland. *Brit. Birds* 69: 165-177.
- PIENKOWSKI,M.W. & GREEN,G.H. 1978. Observations on the breeding biology of the Sanderling. In: Green,G.h. & Greenwood,J.J.D. (eds.) *Joint Biological Expedition to North East Greenland 1974*, pp. 68-69. Dundee University Printing Unit.
- PIENKOWSKI,M.W. & GREENWOOD,J.J.D. 1979. Why change mates? *Biol. J. Linn. Soc.* 12: 85-94.

## 6.22. LITTLE STINT *CALIDRIS MINUTA*

- ARHEIMER,O. & NYHOLM,E. 1966. Smasnappen (*Calidris minuta*) for första gangen Gunnens hackande i Sverige. *Var Fagelvärld* 25: 143-147.
- CHRISTOLEIT,E. 1936. Zur Balz des Zwergstrandlaufers. *Beitr. FortPfl.-Biol. Vogel* 12: 177-187, 239-251.
- HAVILAND,M.D. 1915. Notes on the breeding-habits of the Little Stint. *Brit. Birds* 8: 202-208.
- HILDEN,O. 1978. (Occurrence and breeding biology of the Little Stint *Calidris minuta* in Norway.) *Proc. First Nordic*

- Congr. Ornithol. Anser*, Suppl. 3: 96-100. In Swedish with English summary.
- HILDEN,O. 1983. Mating system and breeding biology of the Little Stint *Calidris minuta*. *Wader Study Group Bull.* 39:47. Abstract.
- KISTCHINSKI,A.A. & FLINT,V.E. 1973. [Occurrence of double-nesting in the Little Stint (*Calidris minuta*).] In: *Fauna and ecology of waders*. Vol. 1, pp. 56-57. In Russian.
- REYNOLDS,J.F. 1972. Little Stint incubating eight eggs. *Brit. Birds* 65:529.

## 6.23. TEMMINCK'S STINT *CALIDRIS TEMMINCKII*

- ASCHMANN,B. & SCHMIDT,G. 1968. Wegtragen von Eiresten durch Temminckstrandlaufer (*Calidris temminckii*). *Vogelwelt* 89:180.
- BOTTOMLEY,J.B. & BOTTOMLEY,S. 1973. Temminck's Stint incubating seven eggs. *Brit. Birds* 66:311.
- BREIEHAGEN,T. 1983. (Temminck's Stint, *Calidris temminckii*, and Common Sandpiper, *Actitis hypoleucus*, laying in the same nest.) *Var Fuglefauna* 6: 44-45. In Norwegian with English summary.

- CARIDROIT,F., MAYAUD,N. & VOLOSS,C. 1949. Plumage nuptial du Becasseau de Temminck et structure testiculaire. *Rev. Scientifique* 87: 151-152.
- EDWARDS,G.R. 1934. Breeding of Temminck's Stint in Scotland. *Brit. Birds* 28: 97-99.
- HAVILAND,M.D. 1916. Notes on the breeding-habits of Temminck's Stint. *Brit. Birds* 10: 157-165.
- HILDEN,O. 1965. Zur Brutbiologie des Temminckstrandlaufers, *Calidris temminckii* (Leisl.). *Ornis Fenn.* 42: 1-5.

- HILDEN,O. 1972. Mortality and average age of Temminck's Stint (*Calidris temminckii*). *Proc. XV Congr. Int. Ornithol.*: 116-117.
- HILDEN,O. 1975. Breeding system of Temminck's Stint *Calidris temminckii*. *Ornis Fenn.* 52: 117-146.
- HILDEN,O. 1978. Population dynamics in Temminck's Stint *Calidris temminckii*. *Oikos* 30: 17-28.
- HILDEN,O. 1979. Nesting of Temminck's Stint *Calidris temminckii* during an arctic snowstorm. *Ornis Fenn.* 56: 30-32.
- HILDEN,O. 1979. Territoriality and site tenacity of Temminck's Stint *Calidris temminckii*. *Ornis Fenn.* 56: 56-74.
- MAYAUD,N. 1948. Remarques sur le plumage nuptial du Bécasseau de Temminck. *Bull. Soc. Zool.* 73: 220-224.
- SOUTHERN,H.N. & LEWIS,W.A.S. 1938. The breeding behaviour of Temminck's Stint. *Brit. Birds* 31: 314-321.
- TOMKOVICH,P.S. & FOKIN,S.Y. 1983. (On the ecology of the Temminck's Stint in Northeast Russia.) *Ornitologia* 18: 40-56. In Russian with English summary.
- TOMKOVICH,P.S. & FOKIN,S.Y. 1984. [Behaviour of Temminck's Stint (*Calidris temminckii*) during the breeding season.] In: Sokolov,V.E. (ed.). *[Signalling and ecology of mammals and birds.] Nauka, Moscow.* pp. 208-226. In Russian.

## 6.24. PURPLE SANDPIPER *CALIDRIS MARITIMA*

- BENGSTON,S.-A. 1970. Breeding behaviour of the Purple Sandpiper in West Spitsbergen. *Ornis Scand.* 1: 17-25.
- BENGSTON,S.-A. 1975. (Observations on the breeding biology of the Purple Sandpiper *Calidris maritima* on Svalbard.) *Fauna* 28: 81-86. In Norwegian with English summary.
- BENGSTON,S.-A. & FJELLBORG,A. 1975. Summer food of the Purple Sandpiper (*Calidris maritima*) in Spitsbergen. *Astarte* 8: 1-6.
- CANE,C. 1979. Observations on the behaviour of the Purple Sandpiper *Calidris maritima* during incubation and hatching. In: Innes,J.L. (ed.) *Cambridge Norwegian Expedition 1978 Report* pp. 59-66, Cambridge.

- KEITH,D.B. 1938. Observations on the Purple Sandpiper in Northeastland. *Proc. Zool. Soc. London* 108A: 185-194.
- LARSON,S. 1978. (Purple Sandpiper, *Calidris maritima*, and Golden Plover, *Pluvialis apricaria*, laying in the same nest.) *Var Fagelvarld* 37:137. In Swedish with English summary.
- SUTTON,G.M. & PARMELEE,D.F. 1955. The Purple Sandpiper in southern Baffin Island. *Condor* 57: 216-220.
- SWANBERG,P.O. 1945. Om skarsnappen i svenska fjällen och dess hackningsbiologi. *Fauna och Flora* 40: 108-133, 154-169. In Swedish.

## 6.25. DUNLIN *CALIDRIS ALPINA*


- BAKER,M.C. 1982. Individuality of vocalizations in Dunlin: a possible acoustic basis for recognition of parent by offspring. *Auk* 99: 771-774.
- BREIEHAGEN,T. 1984. Adoption of a brood of Temminck's Stint *Calidris temminckii* by the Dunlin *Calidris alpina*. *Ornis Fenn.* 61: 95-96.
- BROWN,R.H. 1938. Breeding-habits of the Dunlin. *Brit. Birds* 31: 362-366.
- BYRKJEDAL,I. & KALAS,J.A. 1983. Plover's Page turns into Plover's Parasite: a look at the Dunlin/Golden Plover association. *Ornis Fenn.* 60: 10-15.
- DWENGER,R. 1976. Über beobachtungen am nest des Alpenstrandlaufers. *Falke* 23: 165-167.
- ETHERIDGE,B. 1982. Distribution of Dunlin *Calidris alpina* nests on an area of South Uist machair. *Bird Study* 29: 239-243.
- ETHERIDGE,B. & TAYLOR,W.G. 1982. Biometrics of breeding Dunlins *Calidris alpina* from South Uist. *Wader Study Group Bull.* 36: 2-3.
- ETHERIDGE,B. & TAYLOR,W.G. 1982. Breeding Dunlins on a South Uist machair meadow in 1983. *Wader Study Group Bull.* 36: 4-5.
- HELDT,R. 1966. Zur Brutbiologie des Alpenstrandlaufers, *Calidris alpina schinzii*. *Corax* 1: 173-188.
- HOLMES,R.T. 1966. Feeding ecology of the Red-backed Sandpiper (*Calidris alpina*) in arctic Alaska. *Ecology* 47: 32-45.
- HOLMES,R.T. 1966. Breeding ecology and annual cycle adaptations in the Red-backed Sandpiper in northern Alaska. *Condor* 68: 3-46.

- HOLMES,R.T. 1970. Differences in population density, territoriality, and food supply of Dunlin on arctic and subarctic tundra. *Symp. Brit. Ecol. Soc.* 10: 303-319.
- HOLMES,R.T. 1971. Latitudinal differences in the breeding and molt schedules of Alaskan Red-backed Sandpipers (*Calidris alpina*). *Condor* 73: 93-99.
- JONSSON,P.E. 1983. Breeding Dunlins *Calidris alpina schinzii* in S.W. Sweden: some results from a population study. *Wader Study Group Bull.* 39:43. Abstract.
- JONSSON,P.E. 1985. (Location of nest, habitat choice and breeding success of Dunlins in Skane.) In: Tjernberg,M. (ed.) *(The Southern Dunlin Calidris alpina schinzii in Sweden)* Statens naturvardsverk, Solna. pp. 35-54. In Swedish with English summary.
- KREISCHE,H. 1977. Alpenstrandlaufergelege hoher gesetzt. *Falke* 24:269.
- KROL,A. 1982. Population study of Dunlin (*Calidris alpina schinzii*) near Gdansk, Poland - preliminary results. In: *Abstracts of Symposium & Poster Presentations XVIII Congr. Int. Orn. Moscow* 1982: 229-236.
- KROL,E. 1985. Numbers, reproduction and breeding behaviour of Dunlin *Calidris alpina schinzii* at the Reda mouth, Poland. *Acta orn.* 21.
- NORTON,D.W. 1970. Thermal regimes of nests and bioenergetics of chick growth in the Dunlin (*Calidris alpina*) at Barrow, Alaska. - M.Sc. thesis, Univ. Alaska, Fairbanks, Alaska, 78 pp.

- OAKES,C. 1948. "Plover's page" behaviour of Dunlin. *Brit. Birds* 41: 226-228.
- SCHMIDT,G.A.J. 1975. Flugbalz beim Sichelstrandläufer, *Calidris alpina*. *Beitr. Vogelk.* 21: 156-157.
- SOIKKELI,M. 1967. Breeding cycle and population dynamics of the Dunlin (*Calidris alpina schinzii*) in Finland. *Ann. Zool. Fenn.* 4: 158-198.
- SOIKKELI,M. 1970. Dispersal of Dunlin *Calidris alpina* in relation to sites of birth and breeding. *Ornis Fenn.* 47: 1-9.
- SOIKKELI,M. 1970. Mortality and reproductive rates in a Finnish population of Dunlin *Calidris alpina*. *Ornis Fenn.* 47: 149-158.
- SOIKKELI,M. 1974. Population dynamics of Dunlin in Finland. *Proc. Wader Symp. IWRB Warsaw 1973*: 61-62.
- SOIKKELI,M. 1974. Size variation of breeding Dunlin in Finland. *Bird Study* 21: 151-154.
- THIN,R.G. 1942. Dunlin brooding nestling Redshanks instead of its own eggs. *Brit. Birds* 36: 116-117.

## 6.26. BROAD-BILLED SANDPIPER *LIMICOLA FALCINELLUS*

- FLINT,V.E. 1973. [On the biology of eastern Broad-billed Sandpipers.] In: *Fauna and ecology of waders* Vol. 1: 98-100.
- GROTE,H. 1943. Zur Verbreitung von *Limicola falcinellus*. *Orn. Monatsb.* 51: 45-47.
- KLIEBE,A. & KLIEBE,K. 1985. Beobachtungen zur Flugbalz und zum Verhalten des Sumpflaufers (*Limicola f. falcinellus*) in Nordskandinavien. *Vogelwelt* 106: 62-65.



## 6.27. RUFF *PHILOMACHUS PUGNAX*

- ANDERSEN,F.S. 1944. Contributions to the breeding biology of the Ruff (*Philomachus pugnax*). *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 38: 26-30.
- ANDERSEN,F.S. 1948. Contributions to the biology of the Ruff (*Philomachus pugnax* (L.)). II. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 42: 125-148.
- ANDERSEN,F.S. 1951. Contributions to the biology of the Ruff (*Philomachus pugnax* (L.)). III. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 45: 145-173.
- BANCKE,P. 1965. *Brushanen. [Ruffs.]* Rhodos, Kobenhavn, 88 pp. In Danish.
- BANCKE,P. & MEESENBURG,H. 1952. A study of the display of the Ruff (*Philomachus pugnax*). *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 46: 98-109.
- BANCKE,P. & MEESENBURG,H. 1958. A study of the display of the Ruff (*Philomachus pugnax*). II. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 52: 118-141.
- BONT,A.DE & BONT,A.-F.DE. 1947. Comportement des Chevaliers combattants nicheurs dans la bruyère au nord de Turnhout. *Gerfaut* 37: 14-21.
- BRINKKEMPER,J. 1978. Over honkjes, satellieten en hennen. [On Ruffs.] *Pieper* 17: 17-24. In Dutch.
- BRINKKEMPER,J. 1979. De Kemphaan in Nederland. [The Ruff in The Netherlands.] *Wet. Med. KNNV* 137. Hoogwoud. In Dutch.
- CANT,R.G.H. 1961. Ruff displaying to Knot. *Brit. Birds* 57:33.
- CHRISTOLEIT,E. 1924. Zum Balzspiel des Kamplaufers. *Zool. palearctica* 1: 181-197.
- DRENCKHAHN,D. 1973. Zur Beteiligung männlicher Kamplaufer an der Brutpflege. *Corax* 4: 147-150.
- EFTELAND,S. 1977. [A day at the lekking arena of the Ruffs.] *Falco* 6: 37-43. In Norwegian.
- HOFER,A. 1982. Tournament of the Ruffs. *Anim. Kinadom* 85: 24-33.
- HOGAN-WARBURG,A.J. 1966. Social behavior of the Ruff *Philomachus pugnax*. (L.). *Ardea* 54: 109-229.
- KLIEBE,K. 1969. Einiges über die "Vorbalz" beim Kampfläufer (*Philomachus pugnax*) und Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*). *J. Orn.* 104: 245-250.
- KOBUS,D. 1967. Das Verhalten des Kampfläufer weibchens zur Brutzeit. *Orn. Mitt.* 19: 112-114.
- KVAERNE,M. 1970. Observations on *Philomachus pugnax* on their display-grounds at Fokstua, Dovre, Central Norway, in 1969. *Sterna* 9: 22-27.
- LA FRANCE,S. 1982/83. Unusual display of Ruffs at Bedricktown, New Jersey. *Cassinia* 60: 60-61.
- LINDEMANN,W. 1951. Über Balzerscheinungen und die Fortpflanzungsbioologie beim Kampfläufer. *Z. Tierpsychol.* 8: 210-224.
- MEESENBURG,H. 1968. *Brushanen. [Ruffs.]* Fiskeri-og Sjøfartsmuseet, Esbjerg, 28 pp. In Danish.
- MESSENBURG,H. & TOUGAARD,S. 1978. Brushanen. Tagtagelser fra Tipperne i arene 1950, 52, 61, 65, 66, 77. *Kaskelot* 33: 3-18. In Danish.
- MILDENBERGER,H. 1953. Zur Fortpflanzungsbioologie des Kampfläufers. *J. Orn.* 94: 124-143.
- PORTIELJE,A.F.J. 1931. Versuch zu einer verhaltungsphysiologischen Deutung des Balzgebarens der Kampfschnepfe. *Proc. VIIth Int. Orn. Congr.. Amsterdam* 1930: 156-172.
- REYNOLDS,J.D. 1984. Male Ruff display to three females near Churchill, Manitoba. *Blue Jay* 42: 219-221.
- RHIJN,J.G.VAN. 1982. Behavioural differences between independent and satellite males in the Ruff (*Philomachus pugnax*). *Proc. XVth Int. Orn. Congr.*: 682.
- RHIJN,J.G.VAN. 1973. Behavioural dimorphism in male Ruffs *Philomachus pugnax* (L.). *Behaviour* 47: 153-229.
- RHIJN,J.G.VAN. 1975. Over de spreekwoordelijke "vechtlust" van Kemphaantjes. [On the "fighting" of Ruffs.] *De Levende Natuur* 78: 16-23. In Dutch.

- RHIJN, J.G.VAN. 1982. Ecological determinations of alternative mating strategies in Ruffs (*Philomachus pugnax*). In: Abstracts of Symposia & Poster Presentations XVIII Congr. Int. Orn. Moscow: 90.
- RHIJN, J.G.VAN. 1983. On the maintenance and origin of alternative strategies in the Ruff *Philomachus pugnax*. *Ibis* 125: 482-498.
- SCHEUFLER, H. & STIEFEL, A. 1985. *Der Kampfläufer, Philomachus pugnax*. Neue Brehm-Bucherei, Band 574, Ziemsen Verlag, Wittenberg-Lutherstadt, 212 pp.
- SELOUS, E. 1906. Observations tending to throw light on the question of sexual selection in birds, including a day to day display on the breeding habits of the Ruff (*Machetes pugnax*). *Zoologist* 4: 60-65, 161-182, 285-294, 367-381, 419-428.
- SELOUS, E. 1929. Schaubalz und geschlechtliche Auslese beim Kampfläufer. *J. Orn.* 77: 262-309.
- SHEPARD, J. 1976. Factors influencing female choice in the lek mating system of the Ruff. *Living Bird* 14: 87-111.
- SIEDEL, F. 1960. Am Turnierplatz der Kampfhahne. *Kosmos, Stuttgart* 56: 471-476.
- SPILLNER, W. 1971. Das Balzverhalten des Kampfläufers. *Falke* 18: 148-161.
- TOLCHIN, V.A. 1983. [Of distribution and ecology of the Ruff on south of Eastern Siberia.] *Ekologija pozvon. zhivotnykh Vostochnoi Sibiri Irkutsk:* 75-90. In Russian.
- TOLMAN, R. 1959. Afwijkend ei van de *Philomachus pugnax*. [Unusual egg of Ruff.] *Limosa* 32:154. In Dutch.
- TURNER, E.L. 1920. Some notes on the Ruff. *Brit. Birds* 14: 146-153.

## 6.28. JACK SNIPE *LYMNOCRYPTES MINIMUS*

- CHISLETT, R. 1927. Notes on the breeding of the Jack Snipe. *Brit. Birds* 21: 2-6.
- KLIEBE, K. 1974. Beobachtungen zur Flugbalz der Zwergschneepfe. *Vogelwelt* 95: 30-33.
- NILSSON, S.G. & NILSSON, I.N. 1978. Population, habitat and display activity of the Jack Snipe *Lymnocryptes minimus* in southern Sweden. *Var Fagelvarld* 37: 1-8.
- SAEMANN, D. 1970. Frühjahrsbeobachtungen an der Zwergschneepfe in Mittelsachsen. *Beitr. Vogelkd.* 15: 194-196.



## 6.29. SNIPE *GALLINAGO GALLINAGO*

- ALTUM, B. 1855. Über das Meckern der Bekassine. *Naumannia* 5: 362-371.
- BACMEISTER, W. 1944. Vom "Meckern" der Bekassine. *Beitr. FortPfl. Biol. Vogel* 20: 24-27.
- BORGGREVE, B. 1860. Auch ein Wort über das Meckern der Bekassine. *J. Orn.* 8: 63-73.
- CARR-LEWTY, R.A. 1943. The aerodynamics of the drumming of the Common Snipe. *Brit. Birds* 36: 230-234.
- GREEN, R. 1982. A study of the breeding biology of Common Snipe on lowland water meadows in Cambridgeshire, England. *IWRB Woodcock & Snipe Res. Group Newslet.* 8: 8-9.
- GREEN, R.E. 1983. The feeding economy and growth of Common Snipe chicks. *Wader Study Group Bull.* 39:42. Abstract.
- GREEN, R.E. 1984. Feeding and breeding of Common Snipe. *Ibis* 126:457. Abstract.
- GREEN, R.E. 1985. Growth of Snipe chicks *Gallinago gallinago*. *Ring. & Migr.* 6: 1-5.
- HAGEN, Y. 1944. Vom "Meckern" der Bekassine. *Beitr. FortPfl. Biol. Vogel* 20: 91-93.
- IWANOWA, N.S. 1970. [On the breeding biology and post-embryonal development of Snipe.] *Westn. Leningr. Univ.* 15: 24-35. In Russian.
- JACKEL, A.J. 1857. Das Schnurren oder Mackern der Bekassine. *Naumannia* 7: 21-33.
- JACKEL, A.J. 1858. Über das Schnurren der Bekassine. *Naumannia* 8: 490-495.
- JACKEL, A.J. 1862. Einige Bemerkungen zu dem Aufsatze: Auch ein Wort über das Meckern der Bekassine von B. Borggrov. *J. Orn.* 10: 213-223.
- KRAGENOW, P. 1970. Gruppenbalz der Bekassine (*Gallinago gallinago*)? *Beitr. Vogelkd.* 15:350.

- LEISLER, B. & MAZZUCCO, K. 1967. Bekassine (*Gallinago gallinago*) tragt Jungvogel fort. *Egretta* 10(2).
- LYNES, H. 1913. Early drumming of the snipe and its significance. *Brit. Birds* 6: 354-359.
- MACHIKUNAS, A. 1983. [Some aspects of behaviour of Common Snipe during a breeding period.] *Ornitologia* 18: 198-199. In Russian.
- MANSON-BAHR, P.H. 1907. On the "bleating" or "drumming" of the Snipe. *Proc. Zool. Soc. London* 1907: 12-35.
- MANSON-BAHR, P.H. 1931. On the breeding displays of certain waders, with special reference to the Snipe family. *Bull. Brit. Orn. Club* 51: 84-99.
- MASON, C.F. & MACDONALD, S.M. 1976. Aspects of the breeding biology of the Snipe. *Bird Study* 23: 33-37.
- MCKIBBEN, L.A. & HOFMANN, P. 1985. Breeding range and population studies of Common Snipe in California. *Calif. Fish Game* 71: 68-75.
- PARROT, C. 1904. Vom Liebesspiel der Bekassine. *Orn. Mber.* 12: 37-41.
- REDDIG, E. 1981. Die Bekassine. *Capella gallinago*. Neue Brehm-Bucherei, Band 533. Wittenberg-Lutherstadt. 112 pp.
- ROSENBERG, E. 1933. Ett bidrag till enkelbeckasineus fortplantnings biologi. *Fauna och Flora* 28: 255-262. In Swedish.
- RUTSCHKE, E. 1976. Zur Struktur der Schallfedern von Bekassinen (Capella). *Beitr. Vogelk.* 22: 12-25.
- THONEN, W. 1969. Auffallender Unterschied zwischen den instrumentalen Balzlaute der europäischen und nord-amerikanischen Bekassine. *Orn. Beob.* 66: 6-13.
- WILLIAMSON, K. 1950. The distraction behaviour of the Faeroe Snipe. *Ibis* 92: 66-74.

- WILLIAMSON,K. 1959. Snipe at St. Kilda. *Bird Notes* 29: 5-8.  
 WILLIAMSON,K. 1960. The development of young Snipe studied by mist-netting. *Bird Study* 7: 63-76.



### 6.30. GREAT SNIPE *GALLINAGO MEDIA*

- AVERY,M. 1979. Lekking behaviour of Great Snipe *Capella media*. In: Innes,J.L. (ed.). *Cambridge Norwegian Expedition 1978 Report* pp. 67-73, Cambridge.  
 AVERY,M. & SHERWOOD,G. 1982. The lekking behaviour of Great Snipe. *Ornis Scand.* 13: 72-78.  
 ELVELAND,J. & TJERNBERG,M. 1984. (The vegetation on some display grounds of the Great Snipe, *Gallinago media*, in Sweden.) *Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.* 60: 125-140. In Swedish with English summary.  
 FERDINAND,L. 1966. Display of the Great Snipe (*Gallinago media* Latham). *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 60: 14-34.  
 FERDINAND,L. & GENSBOL,B. 1966. Maintenance of territory in the Great Snipe (*Gallinago media* Latham) on the display ground. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 60: 35-43.

- KARPOWITSCH,W.N. 1962. [A study on the nature of the display of the Great Snipe by means of ringing.] *Trudy Okskogo Gos. Sapovedn.* 4: 185-191. In Russian.  
 LEMNELL,P.A. 1978. Social behaviour of the Great Snipe *Capella media* at the arena display. *Ornis Scand.* 9: 146-163.  
 LEMNELL,P.A. & LARSSON,P.-O. 1967. Studier over revirhavhande vid dubbelbeckasinens arenaspill. *Zool. Revy* 29: 75-88.  
 ROHWEDER,J. 1891. Am Baltzplatz von *Gallinago major*. *J. Orn.* 39: 419-426.  
 SPJOTVOLL,O. 1978. [Some observations on the lekking of the Great Snipe.] *Sterna* 12: 269-280. In Norwegian.  
 SWANBERG,P.O. 1965a. Vara beckasiner - II. Dubbelbeckasinens spel. *Var Fugelvarld* 24:128.  
 SWANBERG,P.O. 1965b. Studies of less familiar birds. 138. Great Snipe. *Brit. Birds* 58: 504-508.

### 6.31. WOODCOCK *SCOLOPAX RUSTICOLA*

- BERLICH,H. & KALCHREUTER,H. 1983. A study on harvesting roding Woodcock in spring. *Proc. 2nd. Eur. Woodcock & Snipe Workshop, IWRB:* 92-99.  
 DEPPE,H.-J. 1975. Angaben zum Durchzug, Brutvorkommen und Brutbeginn der Waldschneepfe (*Scolopax rusticola*) in Norddeutschland. *Vogelwelt* 96: 201-213.  
 DES FORGES,G. 1975. Behaviour of an incubating Woodcock. *Brit. Birds* 68: 421-428.  
 FADAT,C., FERRAND,Y. & OSTERMEYER,R. 1981. A three-year study on breeding biology of Woodcock in France. *IWRB Woodcock & Snipe Res. Group, Newslet.* 7: 27-29.  
 FINCHER,F. 1985. Roding at night and vertical escape flight of Woodcock. *Brit. Birds* 78:195.  
 GRACHEV,Yu.N. 1983. [On the nesting of the Woodcock in flood-plain middle part of Chu River (Kazakhstan).] *Ptitsy Sibiri. Tez. dokl. k 2.Sib. ornit. konf., Gorno-Altaisk:*168. In Russian.  
 GREKOV,V.S., SIDENKO,V.P., STEPANKOVSKAYA,L.D., MALIKOVA,M.V., NEKHOROSHIKH,Z.N., VARISHEVA,F.N., BEREZYUK,J.V., & VOLKOVA,G.K. 1981. Biology of *Scolopax rusticola* in the south-western Ukraine. *IWRB Woodcock & Snipe Res. Group Newslet.* 7: 44-46.  
 HEGEN,Y. 1950. (How a Woodcock sitting on the ground attracts the attention of partners in mating flight.) *Var Fagelvarld* 9: 195-199. In Swedish with English summary.  
 HALLER,W. 1932. Ein Beitrag zur Brutbiologie der Waldschneepfe. *Vogel der Heimat* 2: 164-166.  
 HALLER,W. 1944 & 1945. Altes und Neues aus dem Brutleben der Waldschneepfe. *Vogel der Heimat* 15: 37-39, 61-71.  
 HARRADINE,J. 1979. The Woodcock production survey. *WAGBI Mag.* 1979: 12-14.

- HARRADINE,J. 1983. The Woodcock production survey in Great Britain. *Proc. 2nd. Eur. Woodcock & Snipe Workshop IWRB:* 100-117.  
 HAVRE,G.VAN. 1930. Observations sur le vol nuptial de la Becasse. *Gerfaut* 20: 7-9.  
 HERKEURATH,H. 1983. Bemerkenswerte Verhaltensbeobachtungen an Waldschneepfe (*Scolopax rusticola*) und Schwarzpecht (*Dryocopus martius*) im Wildschutzgebiet Edersee. *Vogelk. Hefte Edertal* 9:90.  
 HIRONS,G. 1979. The roding behaviour of the European Woodcock *Scolopax rusticola* - An alternative hypothesis. *Procs. First Eur. Woodcock & Snipe Workshop, IWRB:* 13-20.  
 HIRONS,G. 1980. The significance of roding by Woodcock *Scolopax rusticola*: an alternative explanation based on observation of marked birds. *Ibis* 122: 350-354.  
 HIRONS,G. 1983. The breeding biology and behaviour of the Woodcock *Scolopax rusticola*. *Ibis* 125:589.  
 HIRONS,G. 1983. A five-year study of the breeding behaviour and biology of the Woodcock in England - A first report. *Proc. 2nd. Eur. Woodcock & Snipe Workshop, IWRB:* 51-67.  
 HUDEC,K. 1968. Otazníky kolem hnizdení sluk lesních. [Questions about nesting of Woodcocks.] *Myslivost* 1968: 38-39. In Czech.  
 INGRAM,C. 1978. Carriage of the young and related adaptations in the anatomy of the Woodcock *Scolopax rusticola*. *Ibis* 120:67.  
 LEISCHNIG,S. 1980. Wissenswertes über die Waldschneepfe. *Falke* 27: 412-414.  
 LOWE,V.P.W. 1972. Distraction display by a Woodcock with chicks. *Ibis* 114: 106-107.  
 MARCSTROM,V. & SUNDGREN,F. 1977. On the reproduction of the European Woodcock. *Viltrevy* 10(2): 27-40.

- MIERA,C. 1981. Berichtigende Bemerkungen zur Lage der Eier im Nest der Waldschnepfe. *Falke* 28:426.
- NEMETSCHEK,G. 1977. Beobachtungen zur Flugbalz der Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*). *J. Orn.* 118: 68-86.
- PERTTUNEN,E. 1981. Selection of habitat of the Woodcock (*Scolopax rusticola*) in Joutseno (Finland) in 1980. *IWRB Woodcock & Snipe Res. Group Newslet.* 7: 7-12.
- SAARI,L. 1979. Selection of habitat and roding behaviour of Woodcock in Finland. *Proc. First Eur. Woodcock & Snipe Workshop, IWRB:* 40-41.
- SHORTEN,M. 1974. The European Woodcock (*Scolopax rusticola L.*); a search of the literature since 1940. Game Conservancy Rept. No. 21: 1-93.
- STEINFATT,O. 1938. Das Brutleben der Waldschnepfe. *J. Orn.* 86: 379-424.
- STRONACH,B. 1983. A report concerning the reproductive organs of Woodcock in the month of February. *Proc. 2nd. Eur. Woodcock & Snipe Workshop, IWRB:* 43-50.
- TESTER,J.R. & WATSON,A. 1973. Spacing and territoriality of Woodcock based on roding behaviour. *Ibis* 115: 135-138.
- THOMAS,M. & BURTON,J.L. 1982. Woodcocks roding at night. *Brit. Birds* 75: 467-468.
- TIKHONOV,A.V. & FOKIN,S.YU. 1980. [Acoustic signalization and the behaviour of Woodcock in early ontogenesis. II. The signalization and the behaviour of nestlings.] *Biol. Nauki (Mosc.)* 10: 45-54. In Russian.
- VARGA,F. 1977. Data on the breeding biology of the Woodcock (*Scolopax rusticola*). *Aquila* 83: 300-301.
- WADEWITZ,O. 1966. der Vogel mit dem langen Gesicht. Notizen über die Waldschnepfe. *Falke* 13: 4-5.
- WADEWITZ,O. 1977. Einiges über die Waldschnepfe. *Beitr. Vogelkd.* 23: 101-106.
- WARWICK,T. & VAN SOMEREN,V.D. 1936. The roding of the Woodcock. *Scot. Nat.* 217: 165-172.
- WILSON,J. 1979. Summary report on aspects of the breeding biology of the Woodcock *Scolopax rusticola* in Ireland. *Proc. First Eur. Woodcock & Snipe Workshop, IWRB:* 7-12.
- YEVGENOV,D.N. & KUZYAKIN,V.A. 1981. Roding of *Scolopax rusticola* and boundaries of the geographical complexes. *IWRB Woodcock & Snipe Res. Group Newslet.* 7: 47-48.
- ZEDLITZ,O.VON. 1925. Aus der Kinderstube schwedischer Brutvogel. 4. Die Waldschnepfe. *Beitr. FortPfl.-Biol. Vogel* 1: 65-67.
- ZOMERDIJK,P. 1983. De Houtsnip (*Scolopax rusticola*). Deel 1. [The Woodcock. Part 1.] *Graspieper* 3: 107-121. In Dutch.



### 6.32. BLACK-TAILED GODWIT *LIMOSA LIMOSA*

- BALEN,J.H.VAN. 1959. Over de voortplanting van de grutto, *Limosa limosa* L. [On the reproduction of the Black-tailed Godwit.] *Ardea* 47: 76-86. In Dutch.
- BRINKKEMPER,J. 1982. Over het gedrag van de Grutto (*Limosa limosa*). Diel 1. [On the behaviour of the Black-tailed Godwit. Part 1.] *Graspieper* 2: 54-68. In Dutch.
- BRINKKEMPER,J. 1982. Over het gedrag van de Grutto (*Limosa limosa*). Deel II. [On the behaviour of the Black-tailed Godwit. Part II.] *Graspieper* 2: 94-108. In Dutch.
- BUKINA,T.G. & RIZVANOVA,G.F. 1983. [Breeding biology of the Black-tailed Godwit near Izhevsk town.] *Ornitologija* 18: 187-188. In Russian.
- BYRKJEDAL,I. 1985. Time budget and parental labour division in breeding Black-tailed Godwits *Limosa l. limosa*. *Fauna norv. Ser. C., Cinclus* 8: 24-34.
- EIJERMAN,C. 1976. De relatie bodem en grond-waterpeil en de fluctuatie van de gruttopopulatie in de Eilandspolder. [The relationship between ground-waterlevel and fluctuations of the Godwit population in the Eilandspolder.] *Vogeljaar* 24: 179-183. In Dutch.
- HAVERSCHMIDT,F. 1963. The Black-tailed Godwit. Brill, Leiden, 120 pp.
- HESSE,E. 1920. Über den Blazflug von *Limosa limosa* L. *Orn. Mber.* 28: 52-53.
- HUXLEY,J.S. & MONTAGUE,F.A. 1926. Studies on the courtship and sexual life of birds VI. The Black-tailed Godwit. *Ibis* 11: 1-25.
- JONAS,R. 1979. Brutbiologische Untersuchungen an einer Population der Uferschnepfe (*Limosa limosa*). *Vogelwelt* 100: 125-136.
- KIRCHNER,K. 1969. *Die Uferschnepfe, Limosa limosa*. Neue Brehm-Bücherei, Band 413. Wittenberg-Lutherstadt. 94 pp.
- LIND,H. 1961. Studies on the behaviour of the Black-tailed Godwit. Meddelelse fra Naturfredningsrådets reservatudvalg 66, 157 pp.
- MULDER,T. 1972. *De Grutto in Nederland*. [The Black-tailed Godwit in The Netherlands.] Wet. Med. KNNV 90, Hoogwoud. 52 pp.
- PIERSMA,T. 1983. (Communal roosting of Black-tailed Godwits *Limosa limosa* on the Mokkebank.) *Limosa* 56: 1-8. In Dutch with English summary.
- PLOEG,D.T.E.VAN DER. 1955. Nest van Grutto op kale grond. [Nest of Black-tailed Godwit on barren ground.] *Ardea* 43: 176-177. In Dutch.
- RAUER,G. 1986. Etho-ökologische Untersuchung des Nahrungserwerbes der Uferschnepfe (*Limosa limosa* L.). Phil. Diss. Univ. Wien.
- REES,G.H. 1981. Black-tailed Godwit displaying over heathland. *Brit. Birds* 74:398.
- SCHEUFLER,H., STIEFEL,A. & OPPERMANN,J. 1979. Zwillinge in einem Ei der Uferschnepfe. *Falke* 26: 166-167.
- STALLKNECHT,R. & STALLKNECHT,P. 1965. Untersuchungen und Beobachtungen zur Brutbiologie und Ethologie der Uferschnepfe (*Limosa limosa* L.). Unveröff. Staatsexamensarbeit Zool. Inst. der Pad. Hochschule, Potsdam.
- STALLKNECHT,R. & STALLKNECHT,P. 1966. Die Uferschnepfe. Beiträge zu einigen Verhaltensweisen. *Falke* 13: 400-407.
- STALLKNECHT,R. & STALLKNECHT,P. 1967. Am Nest der Uferschnepfe. *Falke* 14: 264-267, 295-297.

- STALLKNECHT,R. & STALLKNECHT,P. 1967. Verhaltensweisen der Uferschnepfe. *Falke* 14: 338-339.
- STERBETZ,I. 1962. (Ecological problems of the *Limosa limosa* L. after the changes of landscape in Hungary.) *Josa Andras Muz. Evk. (Nyiregyhaza)* 4/5: 211-218. In Hungarian with English summary.
- TOLCHIN,V. & MELNIKOV,U. 1974. [Breeding and ecology of the Black-tailed Godwit in eastern Siberia.] *Biol. nauki* 1974(11): 27-30. In Russian.
- WAGNER,R. 1983. Ein Beitrag zur Ökologie der Uferschnepfe *Limosa limosa* (Linne 1758). *Sonderheft mitt. bl. DBV Landesverb. Hamburg* 11: 25-36.
- WALTERS,J. 1954. Nest van Grutto op kale grond. [Nest of Black-tailed Godwit on barren ground.] *Ardea* 42: 339-340. In Dutch.



### 6.33. BAR-TAILED GODWIT *LIMOSA LAPONICA*

- ROSENIUS,P. 1933. Eine Begegnung mit der Rostroten Uferschnepfe. *Beitr. FortPfl.-Biol. Vogel* 9: 45-48.

### 6.34 WHIMBREL *NUMENIUS PHAEOPUS*

- BLAIR,H.M.S. 1961. Whimbrel breeding habits. In: Bannerman,D.A. (ed.). *The Birds of the British Isles* 9, Edinburgh, pp. 69-74.
- GLEGG,W.E. 1923. A note on the nesting of the Whimbrel. *Brit. Birds* 17: 70-76.
- GUDMUNDSSON,F. 1957. Icelandic Birds XV. The Whimbrel. *Natturufr.* 27: 113-125.
- HARRIS,M.P., MURRAY,S. & WRIGHT,W. 1981. Two Whimbrels laying in one nest. *Scot. Birds* 11: 164-166.
- KUMARI,E. 1977. *Der Regenbrachvogel, Numenius phaeopus*. Neue Brehm-Bucherei. Band 501. Wittenberg-Lutherstadt, 64 pp.
- SKEEL,M. 1976. Nesting strategies and other aspects of the breeding biology of the

- Whimbrel (*Numenius phaeopus*) at Churchill, Manitoba. M.Sc. Thesis, University of Toronto, Toronto.
- SKEEL,M. 1978. Vocalizations of the Whimbrel on its breeding grounds. *Condor* 80: 194-202.
- SKEEL,M.A. 1981. Nesting success of the Whimbrel (*Numenius phaeopus*) in relation to habitat. *Wader Study Group Bull.* 33:40. Abstract.
- SKEEL,M.A. 1983. Nesting success, density, philopatry, and nest-site selection of the Whimbrel (*Numenius phaeopus*) in different habitats. *Can. J. Zool.* 61: 218-225.
- WILLIAMSON,K. 1946. Field-notes on the breeding biology of the Whimbrel. *North-West Nat.* 21: 167-184.

### 6.35 CURLEW *NUMENIUS ARQUATA*

- BOTTOMLEY,J.B. & BOTTOMLEY,S. 1973. Curlews nesting in a wood. *Brit. Birds* 66: 444-445.
- BRINKMANN,M. 1950. Zur Biologie eines Brachvogelpaares. *Vogelwelt* 71: 116-118.
- CERVA,F. 1930. Megfigyelesek a nagypoling feszkelesi viszonyairól. [Beobachtungen über die Nistverhältnisse des Grossen-Brachvogels.] *A Termeszet* 26: 256-257. In Hungarian.
- CUTHBERT,M.F. & PICOZZI,L.A. 1980. Curlew carrying egg. *Brit. Birds* 73:411.
- DIJKSEN,L. 1984. Over het broeden van de Wulp. [On the breeding of the Curlew.] *Skor* 3(1): 5-7. In Dutch.
- ENGEL,A. & SCHMITT,P. 1975. Etude d'une population de Courlis cendres en Alsace. *Alauda* 43: 295-302.
- FRISCH,O.VON. 1956. Zur Brutbiologie und Jugendentwicklung des Brachvogels. *Z. Tierpsychol.* 13: 50-81.

- FRISCH,O.VON. 1959. Die Bedeutung des Elterlichen Warnrufs für Brachvogel- und andere Limicolenküken. *Z. Tierpsychol.* 15: 381-382.
- FRISCH,O.VON. 1964. Der Grosse Brachvogel, *Numenius arquata*. Neue Brehm-Bucherei, Band 335. Wittenberg-Lutherstadt, 42 pp.
- GEWALT,W. 1955. Droh- und Kampfverhalten des Brachvogels gegenüber der Grossstrappe. *Z. Tierpsychol.* 12: 277-285.
- HAVERSMIDT,F. 1981. Nest van een wulp met 6 eieren. [Nest of a Curlew with 6 eggs.] *Vanellus* 34: 142-143. In Dutch.
- HOLZINGER,J. 1982. Einführung zum Artenschutzsymposium Grosser Brachvogel. *Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Wurtt.* 25: 7-14.
- HOLZINGER,J. 1982. Zur Frage von Gefangenschaftszuchten beim Grossen Brachvogel (*Numenius arquata*). *Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Wurtt.* 25: 119-120.

- HOLZINGER,J. & SCHMID,G. (eds.) 1982. *Artenschutzsymposium Grosser Brachvogel.* Beih. Veroff. Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg 25, 124 pp.
- HORST,F. Zur Biologie des Brachvogels. *Vogelwelt* 70: 111-114.
- HUYSKENS,G. & WEESENBEECK,J.VAN. 1966. Wanneer begint de wulp te broeden? [When does the Curlew start breeding?] *Gerfaut* 56: 3-9. In Flemish.
- KIPP,M. 1982. Ergebnisse individueller Farbberingung beim Grossen Brachvogel und ihre Bedeutung für den Biotopschutz. Beih. Veroff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Wurtt. 25: 87-96.
- KUMMER,J. 1982. Frühe Brut eines Grossen Brachvogels (*Numenius arquata*). Beitr. Vogelkd. 27: 373-374.
- LUDWIG,B. 1967. Der Grosse Brachvogel. *Falke* 14: 162-165.
- ORDELMAN,G.J. 1984. Hoe drie wulpenslegsels toch nog jongen voortbrachten. [Three clutches of Curlews were still successful.] *Vogeljaar* 32:56. In Dutch.
- POULSEN,C.M. 1961. Stor Regnspove (*Numenius arquata* L.) og lidt om dens opførsel på yngleplads. *Flora og Fauna* 67: 48-50. In Danish.
- ROSENBERG,E. 1930. Über die Beteiligung der Geschlechter des Brachvogels an der Aufzucht der Jungen. *Beitr. Fortpfl.-Biol. Vogel* 6: 12-15.
- SEITZ,A. 1949. Über das Verhalten zweier isoliert aufgezogener Brachvogel (*Numenius arquata* L.). *Orn. Ber.* 3: 32-39.
- SEITZ,A. 1950. Untersuchungen über die Kumpanverhältnisse des jungen Brachvogels. *Z. Tierpsychol.* 7: 402-417.
- SPILLNER,W. 1971. Brutverhalten des Grossen Brachvogels. *Falke* 18: 122-f29.
- TAYLES,K.V. 1981. Observations at a Curlew nest. *Magpie* 2: 41-45.
- THIMM,E. 1967. Beobachtungen am Nest des Brachvogels. *Orn. Mitt.* 19: 3-6.
- WATSON,A. 1954. Curlew nesting in cornfields. *Scot. Nat.* 66:125.

### 6.36. SPOTTED REDSHANK *TRINGA ERYTHROPEN*

- BERG,B. 1908. Beitrag zur Kenntnis von *Totanus fuscus* (L.) und *littoreus* (L.). *Orn. Mber.* 16: 156-159.
- BLAIR,H.M.S. 1946. The Dusky Redshank in Norway. *Ool. Rec.* 20: 17-21, 33-38.
- CARPELAN,J. 1927. Beiträge zur Kenntnis der Nistplätze und der Fortpflanzung des Dunklen Wasserläufers. *Beitr. Fortpfl.-Biol. Vogel* 3: 5-7.

HILDEN,O. 1979. The timing of arrival and departure of the Spotted Redshank *Tringa erythropus* in Finland. *Ornis Fenn.* 56: 18-23.

RANER,L. 1972. (Polyandry in the Red-necked Phalarope *Phalaropus lobatus* and the Spotted Redshank *Tringa erythropus*.) *Fauna och Flora* 67: 135-138. In Swedish with English summary.

### 6.37. REDSHANK *TRINGA TOTANUS*

- BAKKER,M. 1959. Openliggend nest van de Tureluur *Tringa totanus*. [Open nest of the Redshank.] *Limosa* 32:154. In Dutch.
- BEINTEMA,A.J. & TIMMERMAN,A.,Azn. 1976. De Turelaar als 'zoutliefhebber'. [The Redshank as 'salt-lover']. *Vogeljaar* 24: 17-21. In Dutch.
- BOCKER,H.-U. 1958. Beobachtungen über die Balz des Rotschenkels (*Tringa totanus*). *J. Orn.* 99: 18-22.
- BUB,H. 1957. Der Rotschenkel als Brutnachbar des Kiebitz. *Vogelwelt* 78: 95-96.
- BUB,H. 1958. Rotschenkel und Steinschmatzer transportieren Junge im Schnabel. *Vogelring* 27:151.
- CHANDLER,D.F. & WALKER,A.J. 1985. Habitat use by breeding Redshanks on South Uist. *Wader Study Group Bull.* 45: 25-28.
- EIJERMAN,C. 1977. De invloed van het chloridegehalte van het water op de broed dichtheid van de Tureluur (*Tringa totanus*). [The influence of chloride of the water of the breeding density of the Redshank.] *Watervogels* 2: 15-17. In Dutch.
- FIALA,V. 1964. Vodous rudsonhy (*Tringa totanus* L.). [Redshank (*Tringa totanus* L.)] *Ziva* 12: 75-76. In Czech.
- FRISCH,O.VON. 1957. Brutgemeinschaft Rotschenkel-Kiebitz. *Vogelwelt* 78: 153-155.
- GLOE,P. 1977. Balzend zur Nahrungssuche fliegende Rotschenkel *Tringa totanus*. *Orn. Mitt.* 29: 196-197.
- GLOE,P. 1982. Enge Brutnachbarschaft von

Kiebitz (*Vanellus vanellus*) und Rotschenkel (*Tringa totanus*). *Orn. Mitt.* 34:201.

GROSSKOPF,G. 1958. Zur Biologie des Rotschenkels (*Tringa totanus*). *J. Orn.* 99: 1-17.

GROSSKOPF,G. 1959. Zur Biologie des Rotschenkels II. *J. Orn.* 100: 210-236.

GROSSKOPF,G. 1959. Zum Legebeginn innerhalb einer Population. *Vogelwelt* 80: 161-170.

GROSSKOPF,G. 1963. Weitere Beiträge zur Biologie des Rotschenkels. *Vogelwelt* 84: 65-84.

GROSSKOPF,G. 1970. Der Einfluss von Alter und Partnerwahl auf das Einsetzen des Brutgeschäfts beim Rotschenkel. *J. Orn.* 111: 420-437.

HAKANSSON,G. 1978. (Incubating Redshank, *Tringa totanus*, warming young of Avocet, *Avocetta recurvirostra*.) *Var Fagelvarld* 37: 137-138. In Swedish with English summary.

HALE,W.G. 1956. The lack of territory in the Redshank *Tringa totanus*. *Ibis* 98: 398-400.

HALE,W.G. 1983. Redshanks in the breeding season. *Wader Study Group Bull.* 39:48. Abstract.

HALE,W.G. & ASHCROFT,R.P. 1982. Pair formation and pair maintenance in the Redshank *Tringa totanus*. *Ibis* 124: 471-490.

HALE,W.G. & ASHCROFT,R.P. 1983. Studies of the courtship behaviour of the Redshank *Tringa totanus*. *Ibis* 125: 3-23.

HILDEN,O. 1977. Redshank adopting a chick of the Snipe. *Ornis Fenn.* 54:94.

- HUXLEY, J.S. 1912. A first account of the courtship of the Redshank (*Totanus calidris* L.). *Proc. Zool. Soc. London* 1912: 647-655.
- LUMME, T. & MERILA, E. 1979. (Redshanks (*Tringa totanus*) rebuilding their nests threatened by rising seawater.) *Aureola* 4: 84-86. In Finnish with English summary.
- LUMME, T., MERILA, E. & RONKA, A. 1979. (Eggs of Redshank (*Tringa totanus*) in a nest of Black-headed Gull (*Larus ridibundus*).) *Aureola* 4:34. In Finnish with English summary.
- OJANEN, M. & TYNJALA, M. 1981. Kaksi punajalkavikloa mininut samaan pesaan. *Lintumies* 16: 81-82. In Finnish.
- REINSCH, H.H. 1956. Ein Beitrag zur Balz des Rotschenkels (*Tringa totanus*). *Orn. Mitt.* 8: 126-128.
- ROBILLER, F. & BORRMANN, K. 1980. Nestreviergrenzen vom Rotschenkel am "Budosszekto" in Sudungarn. *Beitr. Vogelkd.* 26: 276-282.
- RUPPELL, G. 1962. Vorlaufige Beiträge zur Kenntnis des Drohverhaltens beim Rotschenkel *Tringa totanus totanus*. *Z. Tierpsychol.* 19: 465-471.
- SCHANDY, T. 1978. [Mating behaviour in Redshank.] *Buskskvetten* 2: 24-27. In Norwegian.
- SMITH, S. & EDWARDS, G.R. 1935. Nuptial display in the Redshank (*Tringa totanus*). *Naturalist* 1: 241-243.
- STIEFEL, A. & SCHEUFLER, H. 1984. *Der Rotschenkel, Tringa totanus*. Neue Brehm-Bucherei, Band 562. Wittenberg-Lutherstadt, 170 pp.
- THIEDE, W. 1960. Über den Baltzflug und das Revier des Rotschenkels (*Tringa totanus*). *J. Orn.* 101: 355-359.
- WALKER, A.J. & CHANDLER, D.F. 1985. Family group movements by breeding Redshanks on South Uist. *Wader Study Group Bull.* 45: 29-31.
- WALTERS, J. Begin der bebroeding bij de Tureluur. [Start of breeding in the Redshank.] *Natura (Eindhoven)* 51: 87-88. In Dutch.
- ZHMUD, M.E. 1983. (On egg-laying by *Tringa totanus* twice-repeated during a season.) *Biul. Mosk. o-va ispyt. prir. otd-biol.* 88: 15-17. In Russian with English summary.

### 6.38. GREENSHANK *TRINGA NEBULARIA*

- CONGREVE, W.M. 1932. Some notes on breeding Greenshanks in Scotland. *Kocsag* 5: 1-7.
- HORTLING, I. 1927. Zur Brutbiologie des Hellen Wasserläufers. *Ornis Fenn.* 4: 80-84.
- NETHERSOLE-THOMPSON, D. 1951. *The Greenshank*. Collins, London, 244 pp.
- NETHERSOLE-THOMPSON, D. 1975. Summer food and feeding habitats of the Greenshank. *Brit. Birds* 68: 284-288.
- NETHERSOLE-THOMPSON, D. 1981. Greenshanks *Tringa nebularia* in northwest Sutherland. *Ibis* 123: 577-578.

- NETHERSOLE-THOMPSON, D. & NETHERSOLE-THOMPSON, M. 1979. *Greenshanks*. Poyser, Berkhamsted, 275 pp.
- THOMPSON, M.L.P. 1982. Movements of a Greenshank chick. *Scot. Birds* 12: 56-57.
- THOMPSON, D.B.A., THOMPSON, P.S. & NETHERSOLE-THOMPSON, D. 1986. Timing of breeding and breeding performance in a population of Greenshanks (*Tringa nebularia*). *J. Anim. Ecol.* 55: 181-200.

### 6.39. GREEN SANDPIPER *TRINGA OCHROPOUS*

- CHRISTOLEIT, E. 1932. Zur Balz des Waldwasserläufers (*Tringa ochropus*). *Beitr. FortPfl.-Biol. Vogel* 8: 185-187.
- DERIM, E.N. & LWOW, B.F. 1961. [On the biology of *Tringa ochropus* in the nesting period.] *Zool. Zurn* 40: 290-292. In Russian.
- HASSE, H. & WOBUS, U. 1964. Der Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) - Brutvogel in der Oberlausitz. *Beitr. Vogelkd.* 9: 426-429.
- KIRCHNER, H. 1978. *Bruchwasserläufer und Waldwasserläufer, Tringa glareola und Tringa ochropus*. Neue Brehm-Bucherei, Band 309. Wittenberg-Lutherstadt. 2 Aufl., 112 pp.


- KRAATZ, S. & BEYER, K.-H. 1982. Zur Brutbiologie des Waldwasserläufers (*Tringa ochropus*). *Beitr. Vogelkd.* 28: 321-356.
- KRAATZ, S. & BEYER, K.-H. 1984. Weitere Beobachtungen zur Brutbiologie des Waldwasserläufers (*Tringa ochropus*). *Beitr. Vogelkd.* 30: 33-47.
- ORING, L.W. 1968. Vocalizations of the Green and Solitary Sandpipers. *Wilson Bull.* 80: 395-420.
- SWANBERG, P.O. 1953. Om bobyggnad hos skogssnappan (*Tringa ochropus*). [On nestbuilding of Green Sandpipers.] *Var Fagelvarld* 12: 192-193. In Swedish.

### 6.40. WOOD SANDPIPER *TRINGA GLAREOLA*

- FERGUSON-LEES, I.J. 1971. Studies of less familiar birds. 164. Wood Sandpiper. *Brit. Birds* 64: 114-117.
- KIRCHNER, H. 1935. Beitrag zur Brutbiologie des Bruchwasserläufers. *Beitr. FortPfl.-Biol. Vogel* 11: 41-50.

- KIRCHNER, H. 1956. Zur Ökologie und Brutbiologie des Bruchwasserläufers in Schleswig-Holstein. *J. Orn.* 97: 21-30.
- KIRCHNER, H. 1960. Beobachtungen an einer Brut des Bruchwasserläufers. *J. Orn.* 101: 340-345.

- KIRCHNER,H. 1978. Bruchwasserlaufer und Waldwasserlaufer, *Tringa glareola* und *Tringa ochropus*. Neue Brehm-Bucherei, Band 309. Wittenberg-Lutherstadt. 2. Auflage, 112 pp.
- KLIEBE,K. 1969. Einiges über die "Vorbalz" beim Kampfläufer (*Philomachus pugnax*) und Brachwasserlaufer (*Tringa glareola*). J. Orn. 104: 245-250.



#### 6.41. COMMON SANDPIPER *ACTITIS HYPOLEUCOS*

- BURKLI,W. 1985. Weitere Brutnen des Flussuferläufers *Actitis hypoleucus* im Oberengadin. Orn. Beob. 82: 69-70.
- HALLER,W. 1954. Bekanntschaft mit dem Flussuferläufer. Vogelring 23: 78-81.
- HALLER,W. & PLETSCHER,F. 1947. Ein Beitrag zur Brutbiologie des Flussuferläufers. Vogel der Heimat 18: 1-14.
- HOLLAND,P.K., ROBSON,J.E. & YALDEN,D.W. 1982. The breeding biology of the Common Sandpiper *Actitis hypoleucus* in the Peak District. Bird Study 29: 99-110.
- HOLLAND,P.K. & YALDEN,D.W. 1983. Common Sandpiper food requirements. Wader Study Group Bull. 37: 7-8. Abstract.
- LOFALDI,L. 1981. On the breeding season biometrics of the Common Sandpiper. Ring. & Migr. 3: 133-136.
- POULSEN,H. 1950. Bidrag til Mudderklirens ethologi. Var Fagelvarld 9: 4-10.
- MAUERSBERGER,G. 1978. Aggressive Verhaltensmuster des Uferläufers, *Tringa hypoleucus*. Orn. Jber. Mus. Heineanum, Halberstadt 3: 73-74.
- PRIKRYL,V. 1970. Nektera data ze zivota pisika obecného - *Tringa hypoleucus* L. [Some data from the life of Common Sandpiper.] Ziva 18:154. In Czechoslovakian.
- STEIN,G. 1926. Zur Brutbiologie des Flussuferläufers. Orn. Mber. 34: 163-169.
- STEIN,G. 1928. Ein weiterer Beitrag zur Brutbiologie von *Tringa hypoleucus*. Orn. Mber. 36: 129-135.
- WADEWITZ,O. 1952. Ein Beitrag zur Biologie des Flussuferläufers, *Actitis hypoleucus*. Beitr. Vogelkd. 3: 1-20.
- WADEWITZ,O. 1957. Weitere Beobachtungsergebnisse am Flussuferläufer, *Actitis hypoleucus*. Beitr. Vogelkd. 6: 2-10.
- WADEWITZ,O. 1959. Der Flussuferläufer. Falke 6: 56-58.
- YALDEN,D.W. 1984. Common Sandpiper numbers and recreational pressures in the Derwent Valley. Magpie 3: 38-46.
- YALDEN,D.W. 1986. Diet, food availability and habitat selection of breeding Common Sandpipers *Actitis hypoleucus*. Ibis 128: 23-36.
- ZIJLSTRA,L. 1972. Waarnemingen bij een broedgeval van de Deverloper langs de IJssel. [Observations at a brood of Common Sandpipers along the river IJssel.] Limosa 45: 30-35. In Dutch.

#### 6.42. TEREK SANDPIPER *XENUS CINEREUS*

- GROTE,H. 1938. Der Terekwasserläufer und sein Nest. J. Orn. 86: 457-465.

#### 6.43. TURNSTONE *ARENARIA INTERPRES*

- BELOPOLSKIJ,L. & GORDAINOWA,G. 1975. (Certain nesting peculiarities of the Turnstone in 1970 in the Barents, White and Baltic Seas.) Comm. Balt. comm. study bird migrations 8: 196-205. In Russian with English summary.
- BERGMAN,G. 1946. Der Steinwalzer, *Arenaria i. interpres* (L.) in seiner Beziehung zur Umwelt. Acta Zool. Fenn. 47: 1-151.
- BERGMAN,G. 1958. Auslösung von Übersprungseinschlafen Soweit Ermudung der akustisch ausgelosten Revierverteidigung durch Magnetophonwiedergabe der Aggressionslaute beim Steinwalzer. Ornith. Fenn. 35: 151-154.
- BREAREY,D.M. 1979. The breeding biology and foraging behaviour of the Turnstone *Arenaria interpres* in Finland. Wader Study Group Bull. 26: 24. Abstract.

- BREAREY,D. & HILDEN,O. 1985. Nesting and egg predation by Turnstones *Arenaria interpres* in larid colonies. Ornis Scand. 16: 283-292.
- CHISLETT,R. 1925. Turnstones on a Baltic inlet. Brit. Birds 19: 2-9.
- DURANGO,S. 1940. Roskarlen, *Arenaria interpres*, som hackfagel i tarnkolonier. Fauna och Flora 35: 23-32. In Swedish.
- FERNES,P.N. 1978. Individual differences in the head and neck plumage of Ruddy Turnstones (*Arenaria interpres*) during the breeding season. Auk 95: 753-755.
- HARIO,M. & RISTO,K. 1979. (Combined brood of the Turnstone.) Ornis Fenn. 56: 35. In Finnish with English summary.
- KORTE,K.D. 1983. Arktische Steltläufer (I). [Arctic waders (I)] Vogels 3: 236-239. In Dutch.

- MacDONALD,S.E. & PARMALEE,D.F. 1962. Feeding behaviour of the Turnstone in Arctic Canada. *Brit. Birds* 55: 241-244.
- NETTLESHIP,D.N. 1967. Breeding biology of Ruddy Turnstones and Knots at Hazen Camp, Ellesmere Island, N.W.T. M.Sc. Thesis, Univ. Saskatchewan, Saskatoon, Canada. 175 pp.
- NETTLESHIP,D.N. 1973. Breeding ecology of Turnstones *Arenaria interpres* at Hazen Camp, Ellesmere Island, N.W.T. *Ibis* 115: 202-217.
- NYSTROM,E.W. 1925. Studier over roskarlen (*Arenaria interpres*) vid boplatsen. *Ornis Fenn.* 2: 97-99. In Swedish.
- SKIPNES,K. 1979. (The breeding behaviour of a pair of Turnstones.) *Var Fuglefauna* 2: 86-94. In Norwegian with English summary.
- STOLL,F.E. 1931. An den Brutplatz von *Oidemia fusca* und *Arenaria interpres*. *J. Orn.* 79: 541-547.
- VUOLANTO,S. 1968. (On the breeding biology of the Turnstone at Norskar, Gulf of Bothnia.) *Ornis Fenn.* 45: 19-24. In Finnish with English summary.
- WHITFIELD,D.P. 1983. The social significance of breeding plumage variability in the Turnstone. *Wader Study Group Bull.* 39: 49. Abstract.
- WILKES,A.H.P. 1922. On the breeding-habits of the Turnstone as observed in Spitsbergen. *Brit. Birds* 15: 172-179.

#### 6.44. RED-NECKED PHALAROPE *PHALAROPUS LOBATUS*

compiled by Sven Blomqvist

- BAHR,P.H. 1908. Some observations on the breeding habits of the Red-necked Phalarope. *Brit. Birds* 1: 202-207.
- CHERNEL,S.VON. 1891. Beobachtungen über das Bruten und den Zug des *Phalaropus hyperboreus* L.. *Proc. 2nd Int. Orn. Congr.* 137-144.
- ERIKSSON,K. 1969. Weibchenschwarme des Odinswassertreters und die Datierung ihrer Gelege in Finnisch Lappland. *Orn. Mitt.* 21: 157-160.
- HAFTORN,S. 1958. Om foreldrenes omsorg for egg af unger hos svømmesnipe, *Phalaropus lobatus* (L.) og temmincksnipe, *Calidris temminckii* (Leisl.). *Kungl. Norske Vidsk. Selsk. Mus. Arbok* 1958: 12-14. Oslo. In Norwegian.
- HILDEN,O. & VUOLANTO,S. 1972. Breeding biology of the Red-necked Phalarope (*Phalaropus lobatus*) in Finland. *Ornis Fenn.* 49: 57-85.
- HOHN,E.O. 1965. *Die Wassertreter.* Neue Brehm-Bucherei Band 349. Ziems Verlag, Wittenberg-Lutherstadt, 60 pp.

- HOHN,E.O. 1971. Observations on the breeding behaviour of Grey and Red-necked Phalarope. *Ibis* 113: 335-348.
- RANER,L. 1972. Polyandry in the Red-necked Phalarope, *Phalaropus lobatus* and the Spotted Redshank, *Tringa erythropus*. *Fauna och flora* 67: 135-138. In Swedish with English summary.
- REYNOLDS,J.D. 1983. Philopatry in the Red-necked Phalarope. *Wader Study Group Bull.* 39:60.
- RUTHKE,P. 1977. (Food carrying and juvenile plumage of the Red-necked Phalarope *Phalaropus lobatus*.) *Vogelwelt* 98: 229-231. In German with English summary.
- SCHIEMANN,H. 1983. Bei Odinswassertretern (*Phalaropus lobatus*) in Island. *Orn. Mitt.* 131-132. SCHIEMANN,H. 1985. Nahrungsauaufnahme der Kuken des Odinswassertreter (*Phalaropus lobatus*). *Orn. Mitt.* 37: 77-78.
- TINBERGEN,N. 1935. Field observations of east Greenland birds. I. The behaviour of the Red-necked Phalarope (*Phalaropus lobatus* L.) in spring. *Ardea* 24: 1-42.

#### 6.45. GREY PHALAROPE *PHALAROPUS FULICARIUS*

compiled by Sven Blomqvist

- ANDREW,D.G. 1955. Notes on the display of the Grey Phalarope. *Brit. Birds* 48:546.
- BENGTONS,S.-A. 1968. Breeding behaviour of the Grey Phalarope in West Spitsbergen. *Var Fagelvarld* 27: 1-13.
- COLE,L.J. 1943. Behavior of Northern Phalaropes with young. *Condor* 45:139.
- GILLANDT,L. 1972. Beobachtungen an einer Brutpopulation des Thorshuhnchens in Sudwest-Island im sommer 1970. Diplomarbeit Fachbereich Biologie, Univ. Hamburg.
- GILLANDT,L. 1974. Beobachtungen an einer Thorshuhnchen-Population in Sudwest-Island (Aves; *Charadriiformes*; *Phalaropodidae*). Abh. Verh. Naturw. Ver. Hamburg (NF) 17: 55-83.
- HAVILAND,M.D. 1915. Notes on the breeding habits of the Grey Phalarope. *Brit. Birds* 9: 11-16.
- HOHN,E.O. 1968. Observations on the breeding behaviour of phalaropes. *Arctic* 21: 40-41.
- HOHN,E.O. 1968. Some observations on the breeding of Northern Phalaropes at Scammon Bay, Alaska. *Auk* 85: 316-317.
- HOHN,E.O. 1969. The Phalarope. *Sci. Am.* 220(6): 104-111.
- HOHN,E.O. 1970. Gonadal hormone concentration in Northern Phalaropes in relation to

- nuptial plumage. *Can. J. Zool.* 48: 400-401.
- HOHN,E.O. 1970. The endocrinology of Cowbirds and Phalaropes. *Indian J. Zool.* 11: 88-99.
- HOHN,E.O. 1971. Phalaropes and hormones. *Animals* 13: 942-946.
- JOURDAIN,F.C.R. 1936. On the Spitsbergen phalarope. *Ibis* 13:202.
- KISTCHINSKI,A.A. 1975. Breeding biology and behaviour of the Grey Phalarope in East Siberia. *Ibis* 117: 285-301.
- LOK,C.M. 1973. Some observations on the Grey Phalarope. *Sterna* 12: 284-285.
- MAYFIELD,H.F. 1978. Undependable breeding conditions in the Red Phalarope. *Auk* 95: 590-592.
- RIDLEY,M.W. 1980. The breeding behaviour and feeding ecology of Grey Phalarope *Phalaropus fulicarius* in Svalbard. *Ibis* 122: 210-226.
- SCHAMEL,D. & TRACY,D. 1977. Polyandry, replacement clutches, and site tenacity in the Red Phalarope (*Phalaropus fulicarius*) at Barrow, Alaska. *Bird-Banding* 48: 314-324.
- SCHAMEL,D. & TRACY,D. 1979. Seasonality of summer habitat and social system of Red Phalaropes. In Pitelka,F.A. (ed.) *Shorebirds in Marine Environments Stud. Avian Biol.* 2:187.

## 6.46. GREENLAND AND ELLESMORE ISLAND

compiled by Hans Meltofte

- ALERSTAM, T., HJORT, C., HOGSTEDT, G. & KARLSSON, J. 1984. Spring observations of some less common birds in the Angmagssalik district, southeast Greenland, 1982. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 78: 54-55.
- ANDERSEN, O.G.N. 1970. Ornithological observations on the 5th Pearyland Expedition in the summer of 1968. With a review. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 64: 104-112. In Danish with English summary.
- BAY, E. 1894. Hvirveldry. In Den ostgronlandske Expedition, udfort i Aarene 1891-92. *Meddr. Gronland* 19(1): 1-52.
- BERTRAM, G.C.L., LACK, D. & ROBERTS, B.B. 1934. Notes on East Greenland birds, with a discussion of the periodic non-breeding among Arctic birds. *Ibis* 13(4): 816-831.
- BIRD, C.G. 1939. On periodic non-breeding in the Arctic with special reference to North-east Greenland. *Bull. Brit. Ool. Ass.* 61: 2-9.
- BIRD, C.G. & BIRD, E.G. 1940. Some remarks on non-breeding in the Arctic, especially in North-east Greenland. *Ibis* 14(4): 671-678.
- BIRD, C.G. & BIRD, E.G. 1941. The birds of North-east Greenland. *Ibis* 14(5): 118-161.
- BOERTMANN, D., MADSEN, J. & MORTENSEN, C.E. 1985. (Rare birds in Jameson Land, East Greenland, 1982-84.) *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 79: 151-152. In Danish with English summary.
- BOSMAN, C.A.W. undated. Nederlandse Groenland Expeditie 1975. *Steltloperonderzoek - Scoresbysund*. Report Vrije Universiteit, Amsterdam, 45 pp. In Dutch.
- BOCHER, T.W. & BOCHER, J. 1975. *Det Grønne Gronland*. Copenhagen, 256 pp.
- CAMPBELL, K. undated. Trinity College East Greenland Expedition. 1963. Report, 30 pp.
- CHRISTIANSEN, A. 1947. [The Purple Sandpiper (*Calidris maritima* (Brunn.)) breeding in Harjedalen.] *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 41: 121-124. In Danish.
- DEICHMANN, H. 1909. Birds of East Greenland. In Carlsbergfondets Expedition til Ost-Gronland, udfort i Aarene 1898-1900. *Meddr. Gronland* 29(4): 141-156.
- CONRADSEN, F.R. 1957. Ornithologiske iagttagelser ved Daneborg, N.O. Gronland. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 51: 12-18.
- ELANDER, M. & BLOMQVIST, S. in press. Ornithological studies in central Northeast Greenland (73°15'N - 74°05'N), May-July 1979. *Meddr. Gronland, Biosci.*
- ERSKINE, A. undated a. Notes on birds observed in North Scoresby Land, Northeast Greenland, August 1978. Report, 3 pp.
- ERSKINE, A. undated b. Notes on birds observed in North Scoresby Land, Northeast Greenland, August 1979. Report, 6 pp.
- FERDINAND, L. undated. *Ornithologiske uncergørelser i Nordvest-Gronland i sommeren 1964*. Report, 15 pp. In Danish.
- FERNS, P.N. 1978. General ornithological notes. In Green, G.H. & Greenwood, J.J.D. (eds.) Joint biological expedition to North East Greenland 1974. Report Dundee University: 152-164.
- FERNS, P.N. & MUDGE, G.P. 1976. Abundance and breeding success of birds in Orsted Dal, East Greenland, 1974. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 70: 21-33.
- FINSCH, O. 1874. Vogel. In: *Die Zweite Deutsche Nordpolarfahrt in den Jahren 1869 und 1870*. 2: 178-239. Leipzig.
- FREEDMAN, B. & SVOBODA, J. 1982. Populations of breeding birds at Alexandra Fjord, Ellesmere Island, Northwest Territories, compared with other Arctic localities. *Can. Field-Nat.* 96: 56-60.
- FREUCHEN, P. 1915. Report of the First Thule Expedition. Scientific work. Zoology. *Meddr. Gronland* 51(12): 385-411.
- FREUCHEN, P. 1921. Fuglelivet i Nordvestgronland. Iagttagelser fra mit vindue. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 15: 101-108. In Danish.
- GIBSON, L. 1922. Bird notes from North Greenland. *Auk* 39: 350-363.
- GOODHART, J. & WRIGHT, T. 1958. North-east Greenland Expedition 1956. *Wildfowl Trust Ninth Ann. Report 1956-1957*: 180-192.
- GRANT, C.T. 1972. Ornithology Report. In: *Joint Services Expedition, North Peary Land 1969. Report*.
- GREEN, G.H. 1974. Joint Biological Expedition to NE Greenland, 1974. *Wader Study Group Bull.* 13: 5-7.
- GREEN, G.H. 1978. The census of waders. In: Green, G.H. & Greenwood, J.J.D. (eds.) *Joint biological expedition to North East Greenland 1974*. Report Dundee University: 84-109.
- GREEN, G.H. & WILLIAMS, A.E. 1972. University of Dundee N.E. Greenland Expedition 1972. *Wader Study Group Bull.* 7: 5-6.
- GREEN, G.H., GREENWOOD, J.J.D. & LLOYD, C.S. 1977. The influence of snow conditions on the date of breeding wading birds in north-east Greenland. *J. Zool., Lond.* 183: 311-328.
- GREEN, G.H., GREENWOOD, J.J.D. & LLOYD, C.S. 1978. The effect of snow conditions on the date of breeding in waders. In: Green, G.H. & Greenwood, J.J.D. (eds.) *Joint biological expedition to North East Greenland 1974*. Report Dundee University: 75-78.
- GREEN, G.H. & WILLIAMS, A.E. undated. Wading birds. In: O'Brien, R.M.G. & Greenwood, J.J.D. (eds.) *Report of the University of Dundee North East Greenland Expedition 1972*. Report Dundee University: 38-47.
- GREENWOOD, J. 1978. East Greenland waders 1977. *Wader Study Group Bull.* 22: 20-21.
- GREENWOOD, J.J.D., GREEN, G.H., SUMMERS, R., WILLIAMS, A.E. & O'BRIEN, R. undated. Ornithological notes. In: O'Brien, R.M.G. & Greenwood, J.J.D. (eds.) *Report of the University of Dundee North East Greenland Expedition 1972*. Report Dundee University: 79-84.
- HALL, A.B. 1966. The breeding birds of an East Greenland valley, 1962. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 60: 175-185.
- HALL, A.B. & WADDINGTON, R.N. 1966. The breeding birds of Orsteds Dal, East Greenland, 1963. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 60: 186-197.
- HANSEN, J.M. undated. *Hurry Fjord Ekspeditionen 1979. Avifaunistical survey*. Report Naturhistorisk Museum, Aarhus, 42 pp.
- HART, H.C. 1880. Notes on the ornithology of the British Polar Expedition, 1975-6. *Zoologist* 3,4: 121-129, 204-214.
- HELM, O. 1926. The birds of Angmagssalik. *Meddr. Gronland* 58,4: 205-274.
- HJORT, C. 1976. Notes on the bird fauna of Hudson Land and Hold With Hope, Northeast Greenland, 1973. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 70: 35-44.
- HJORT, C., HAKANSSON, E. & STEMMERIK, L. 1983. Bird observations around the Nordostvandet polynya, Northeast Greenland, 1980. *Dansk*

- Orn. Foren. Tidsskr.* 77: 107-114.
- HYLBOM,R. 1951. Fageliatktagelser vid en resa till Ostgrönland sommaren 1950. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 45: 116-117. In Danish.
- HAKANSSON,E., BENNIKE,O., MOLGAARD,P. & FRYKMAN,P. 1981. Bird observations from northern Greenland in the summers of 1976 and 1978. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 75: 51-67. In Danish with English summary.
- JOENSEN,A.H. & PREUSS,N.O. 1972. Report on the ornithological expedition to Northwest Greenland 1965. *Meddr. Gronland* 191(5): 1-58.
- JOHNSEN,P. 1953. Birds and mammals of Peary Land in North Greenland including notes from Northeast Greenland. *Meddr. Gronland* 128(6): 1-135.
- JUST,J. 1967. Ornithological observations on the 4th Pearyland Expedition in the summer of 1966. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 61: 133-137. In Danish with English summary.
- KEMPF,C. undated. Nouvelles donnees sur l'avifaune de la cote N.E. du Groenland (Traill O) - 1979. *Rapport Scientifique de l'Expedition 1979 au Groenland (Trail O, cote Nord-Est)*: 45-59.
- KOLTHOFF,G. 1903. Bidrag till Kannedom om Norra Polartrakternas Daggdjur och Faglar. *K. Sv. Vet.-Akad. Handl.* 36(9): 31-92. In Swedish.
- KORTE,J. DE. 1975. Golden Plover *Pluvialis apricaria* breeding in Jameson Land, East Greenland. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 69: 129-134.
- KORTE,J. de, BOSMAN,C.A.W. & MELTOFTE,H. 1981. Observations on waders (Charadriidae) at Scoresby Sund, East Greenland. *Meddr. Gronland, Biosci.* 7: 1-21.
- LONGSTAFF,T.G. 1932. An ecological reconnaissance in West Greenland. *J. Anim. Ecol.* 1: 119-142.
- LOPPENTHIN,B. 1932. Die vogel Nordostgrönlands zwischen 73° 00'N und 75° 30'Nbr. samt beobachtungsergebnissen von der Danischen Godthaab-Expedition 1930. *Meddr. Gronland* 91,6: 1-128.
- MADSEN,C. 1925. Ornithologiske Tagtagelser fra Ostgrönland. II. Selingen, *Calidris arenaria*. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 19: 33-41. In Danish.
- MADSEN,J. & BOERTMANN,D. 1982. Gaseundersogelser i Jameson Land 1982. *Gronlands Fiskeriundersogelser*: 1-36. In Danish.
- MADSEN,J., BOERTMANN,D. & MORTENSEN,C.E. 1984. Undersogelser af gaes i Jameson Land 1983. Report Zoologisk Museum & Gronlands Fiskeri- og Miljoundersogelser, 67 pp.
- MANNICHE,A.L.V. 1910. The terrestrial mammals and birds of North-east Greenland. Biological observations. *Meddr. Gronland* 45,1: 1-199.
- MARRIS,R. & OGILVIE,M.A. 1962. The ringing of Barnacle Geese in Greenland in 1961. *Wildfowl Trust 13th Ann. Rep.*: 53-64.
- MARRIS,R. & WEBBE,A.H.F. 1969. Observations of birds in East Greenland, 1966. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 63: 161-170.
- MELTOFTE,H. 1975. Ornithological observations in Northeast Greenland between 76° 00'N and 78° 00'N Lat. 1969-71. *Meddr. Gronland* 191,9: 1-72.
- MELTOFTE,H. 1976a. Ornithological observations in Southern Peary Land, North Greenland, 1973. *Meddr. Gronland* 205,1: 1-57.
- MELTOFTE,H. 1976b. Ornithological observations from the Scoresby Sund area, East Greenland, 1974. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 70: 107-122. In Danish with English summary.
- MELTOFTE,H. 1977. Ornithological observations in Germania Land, Northeast Greenland, 1975. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 71: 81-94. In Danish with English summary.
- MELTOFTE,H. 1979. The population of waders, Charadriidae, at Danmarks Havn, Northeast Greenland, 1975. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 73: 69-94.
- MELTOFTE,H. 1981. Studies of waders in high Arctic Greenland 1969-76. In: *Proc. Sec. Nordic Congr. Ornithol.* 1979:141.
- MELTOFTE,H. 1982. Populations and breeding schedule of waders in high Arctic Greenland. In: *Abstracts of Symposia and Poster Presentations XVIII Congr. Int. Orn.*, p. 33.
- MELTOFTE,H. 1984. Populations and breeding schedules of waders in high arctic Greenland. In: *Evans,P.R., Hafner,H. & L'Hermite,P. (eds.) Shorebirds and Large Waterbirds Conservation*. Commission of the European Communities: 10-11.
- MELTOFTE,H. 1985. Populations and breeding schedules of waders, Charadrii, in high arctic Greenland. *Meddr. Gronland, Biosci.* 16: 1-43.
- MELTOFTE,H., ELANDER,M. & HJORT,C. 1981. Ornithological observations in Northeast Greenland between 74° 30' and 76° 00'N Lat., 1976. *Meddr. Gronland, Biosci.* 3: 1-53.
- MOHL-HANSEN,U. 1949. The bird-life in Paeryland, North Greenland. Observations on "Dansk Pearyland Ekspedition" in the summer of 1947. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 43: 109-129. In Danish with English summary.
- NETTLESHIP,D.N. & MAHER,W.J. 1973. The avifauna of Hazen Camp, Ellesmere Island, N.W.T. *Polarforschung* 43: 66-74.
- NICHOLSON,E.M. 1930. Field-notes on Greenland birds. Part II. *Ibis* 12(6): 395-424.
- O'BRIEN,R.M.G. & GREENWOOD,J.J.D. (eds.) 1974. *Report of the University of Dundee North East Greenland Expedition 1972*. Report University of Dundee, 98 pp.
- PARMALEE,D.F. & MACDONALD,S.D. 1960. The birds of west-central Ellesmere Island and adjacent areas. *Natl. Mus. Can. Bull.* (Ottawa) 169: 1-303.
- PARMALEE,D.F., STEPHENS,H.A. & SCHMIDT,R.H. 1967. The birds of Southeastern Victoria Island and adjacent small islands. *Natl. Mus. Can. Bull.* (Ottawa) 222: 1-229.
- PEDERSEN,A. 1926. Beiträge zur Kenntnis der Saugtier- und Vogelfauna der Ostküste Grönlands. *Meddr. Gronland* 68(3): 149-249.
- PEDERSEN,A. 1930. Fortegesetzte beiträge der Saugtier- und Vogelfauna der Ostküste Grönlands. *Meddr. Gronlands* 77(5): 341-507.
- PEDERSEN,A. 1934. Die Ornis des Mittleren Teiles der Nordostküste Grönlands. *Meddr. Gronlands* 100,11: 1-35.
- PEDERSEN,A. 1942. Saugtiere und Vogel. *Dansk Nordostgrönlands Expedition 1938-39. Meddr. Gronlands* 128(2): 1-119.
- PETERSEN,J. 1908. Ornithologiske Tagtagelser fra Angmagssaliki i Aarene 1902-08. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 3: 1-26 In Danish.
- PETERSEN,J. 1941. Dagbogsopptegnelser om Fuglenes Forekomst ved Scoresbysund Station fra Efteraaret 1934 til Sommeren 1935. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 35: 123-125. In Danish.
- PLANTEMA,O. 1983. Observations of birds in N.E. Greenland 1983. In: van Bohemen,H.D. (ed.) *Report of the Dutch National History Expedition to N.E. Greenland 22nd July - 12th August 1983*. Report, 7 pp.
- ROSENBERG,N.T., CHRISTENSEN,N.H. & GENSBOL,B. 1970. Bird observations in Northeast Greenland. *Meddr. Gronland* 191,1: 1-87.
- ROEN,U. 1965. Ornithological observations on the 3rd Pearyland Expedition in the summer of 1964. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 59: 85-91. In Danish with English summary.

- SALOMONSEN,F. 1935. Vibe, *Vanellus vanellus*, og Smaaspove, *Numenius phaeopus islandicus*, fra Angmagssalik, forstnaevnte ny for Ostgronland. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 29: 112-113. In Danish.
- SALOMONSEN,F. 1948. The distribution of birds and the recent climatic change in the North Atlantic area. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 42: 85-99.
- SALOMONSEN,F. 1950. *The birds of Greenland*. Copenhagen, 609 pp.
- SALOMONSEN,F. 1967. *Fuglene pa Gronland*. Copenhagen, 341 pp. In Danish.
- SALOMONSEN,F. 1981. Fugle (Aves). In: Salomonsen,f. (ed.) *Gronlands Fauna. Fisk - Fugle - Pattedyr*. Copenhagen: 159-459. In Danish.
- SAVILE,D.B.O. & OLIVER,D.R. 1964. Bird and mammal observations at Hazen Camp, northern Ellesmere Island, in 1962. *Can. Field-Nat.* 78: 1-7.
- SCHAANNING,H.T.L. 1933. Zoological results of the Norwegian Scientific Expeditions to East Greenland. *Skrifter on Svalbard og Ishavet* 49: 2-39.
- SELLAR,P.J., HIGGS,W.J. & MUSTON,A.J. 1981. Ornithology. General report. *British North-East Greenland Expedition 1980 Report*. University of Lancaster: 28-35.
- SMART,I.H.M. (ed.) undated a. *University of Dundee Scoresbyland Expedition 1968. Report*.
- SMART,I.H.M. (ed.) undated b. *Report of the International Mount Mikkelsen Expedition 1969. Report*, 35 pp.
- SMART,I.H.M. & O'BRIEN,R. (eds.) undated. *Report of the Dundee University Scoresbyland Expedition 1970. Report*, 69 pp.
- TCHERNIAKOVSKY,P. 1939. Contribution a l'etude ornithologique du Scoresby-Sund. *Oiseau* 9: 321-363.
- THING,H. 1976. Field notes on birds in Thule district, Greenland, 1975. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 70: 141-143.
- VIBE,C. 1954. Gronlands zoogeografiske undersogelse 1953. *Beretninger vedr. Gronland* 1: 74-75. In Danish.
- VIBE,C. 1967. Arctic animals in relation to climatic fluctuations. *Meddr. Gronland* 170,5: 1-227.
- VIBE,C. 1984. Luna-noglen til klima og økologi. *Naturens Verden* 1984: 145-160. In Danish.
- WATSON,J., WATSON,K., DUCHART,B., DUCHART,P., STEWART,G. & STEWART,A. undated. *Report of Dundee and Milngavie North East Greenland Expedition 1980. Report*, 14 pp.
- WILLIAMS,S.R. et al. undated. *The report of the Joint Services Expedition to Princess Marie Bay, Ellesmere Island, 1980. Report*, c. 400 pp.
- WITTS,B.F. undated a. Waders. In: *Report Joint Serv. Exp. Princess Marie Bay, Ellesmere Island, 1980*. 27 pp.
- WITTS,B.F. undated b. Waders. In: *Joint Serv. Exp. Liverpool Land, East Greenland 1977 Report*: 20-21.
- WITTS,B. 1981. The Joint Services expedition to Princess Marie Bay, Ellesmere Island, 1980. *Sea Swallow* 30: 15-21.
- WITTS,B. 1984. Joint Services Expedition - Princess Marie Bay, Ellesmere Island. *Wader Study Group Bull.* 40:34. Abstract.
- WITTS,B. & MORRISON,R.I.G. 1980. Joint Services Expedition to Princess Marie Bay, Ellesmere Island, 1980: preliminary report. *Wader Study Group Bull.* 30: 34-35.

## 6.47. SVALBARD, BEAR ISLAND AND JAN MAYEN LAND

- ALENDAL,E., ERIKSTAD,K.E. & KALAS,J.A. 1982. (The bird fauna in the northeastern part of Northwest Spitsbergen National Park - a census of breeding birds on high arctic tundra.) *Fauna (Oslo)* 35: 106-113. In Norwegian with English summary.
- BATESON,P.P.G. & CUTBILL,J.L. 1960. Notes on birds observed in Wahlenbergfjord, Spitsbergen. *Sterna* 4: 141-152.
- BENGSTON,S.-A. 1975. (Density of breeding waders on tundra around Ny-Alesund, Svalbard.) *Norsk Polarinst. Arbok* 1973: 175-178. In Norwegian with English summary.
- BIRD,C.G. & BIRD,E.G. 1935. The birds of Jan Mayen Island. *Ibis* 13(5): 837-855.
- BURTON,P.J.K., BLURTON-JONES,N.G. & PENNYCUICK,C.J. 1960. Bird notes from Vest-Spitsbergen in the summer of 1957. *Sterna* 4: 113-140.
- DALGETY,C.T., MCNEILE,J.H. & INGRAM,M.J. 1931. Notes on birds in Spitsbergen during the spring of 1930. *Ibis* 13(1): 243-255.
- DHOND'T,A.A., RAMSAY,A.D.K. & BELTERMAN,T. 1969. Some observations on the avifauna of West-Spitsbergen, 1965. *Gerfaut* 59: 219-238.
- FRANEKER,J.A.VAN & CAMPFHUIJSEN,C.J. 1984. Report on *Fulmarus glacialis* expedition II, Jan Mayen, June-August 1983. Verslagen & Technische Gegevens ITZ, Amsterdam, No. 39. 34 pp.
- GULLESTAD,N. 1973. Noen observasjoner av pattedyr og fugl i Kongsfjordområdet, Spitsbergen, 1970-71. *Norsk Polarinst. Arbok* 1971: 59-65. In Norwegian.

- HAKALA,A.V.K. 1972. Observations on the bird fauna of Spitsbergen between Van Mijenfjorden and Agardhalen. *Sterna* 11: 46-50.
- HEINTZ,N. 1965. Iakttageber over dyrelivet pa Svalbard i 1963. *Norsk Polarinst. Arbok* 1963: 157-168. In Norwegian.
- HINZ,W. 1967. Notizen zur Vogelwelt Spitsbergen. *Vogelwelt* 88: 39-42.
- KALAS,J.A. & BYRKJEDAL,I. 1981. (The status of breeding waders Charadrii in Norway including Svalbard.) *Proc Second Nordic Congr. Ornithol.* 1979: 57-74. In Norwegian with English summary.
- KEITH,D.B. 1938. Observations on the Purple Sandpiper in Northeastland. *Proc. Zool. Soc. Lond.* 108: 185-194.
- KORTE,J. DE. 1972. Birds, observed and collected by "De Nederlandse Spitsbergen Expeditie" in West and East Spitsbergen, 1967 and 1968-69; first part. *Beaufortia* 19(253): 113-150.
- KRISTOFFERSEN,S.A.N. 1962. Fugleobservasjoner fra Biskayerhuk, Nord-Spitsbergen. *Sterna* 5: 65-79.
- LARSEN,T. 1974. Iakttagelser over dyrelivet pa Svalbard i 1972. *Norsk Polarinst. Arbok* 1972: 147-151. In Norwegian.
- LARSEN,T. 1975. Iakttagelser over dyrelivet pa Svalbard i 1973. *Norsk Polarinst. Arbok* 1973: 203-210. In Norwegian.
- LARSEN,T. 1976. Observations of animal life in Svalbard in 1974. *Norsk Polarinst. Arbok* 1974: 212-220.
- LARSEN,T. 1977. Observations in animal life in Svalbard in 1975. *Norsk Polarinst. Arbok* 1975: 179-186.

- LARSEN,T. 1978. Observations of animal life in Svalbard in 1976. *Norsk Polarinst. Arbok* 1976: 319-326.
- LARSEN,T. 1979. Observations of animal life in Svalbard in 1978. *Norsk Polarinst. Arbok* 1978: 69-79.
- LARSON,S. 1960. Ornithological observations in West Spitzbergen in the summer of 1958. *Var Fagelvärld* 19: 193-207. In Swedish with English summary.
- LONGSTAFF,T.G. 1924. Notes from Spitsbergen. *Ibis* 11(6): 480-495.
- LOVENSKIOLD,H.L. 1954. Studies of the avifauna of Spitsbergen. *Norsk Polarinst. Skrifter (Oslo)* 103: 1-131.
- LOVENSKIOLD,H.L. 1964. Avifauna Svalbardensis. *Norsk Polarinst. Skrifter (Oslo)* 129: 1-460.
- LUTKEN,E. 1969. Bird life on Bjornoya 1965. *Norsk Polarinst. Arbok* 1967: 151-165.
- MELTOFTE,H., MEHLUM,F. & FRIKKE,J. 1983. Observations on the wader populations at Ny-Alesund, Spitsbergen, 1982. *Polar Res.* 1: 211-213.
- NORDERHAUG,M. 1968. Iakttagelser over dyrelivet pa Svalbard i 1966. *Norsk Polarinst. Arbok* 1966: 125-131. In Norwegian.
- NORDERHAUG,M. 1969. Iakttagelser over dyrelivet pa Svalbard i 1967. *Norsk Polarinst. Arbok* 1967: 170-205. In Norwegian.
- NORDERHAUG,M. 1970. Iakttagelser over dyrelivet pa Svalbard i 1968. *Norsk Polarinst. Arbok* 1968: 101-106. In Norwegian.
- NORDERHAUG,M. 1972. Iakttagelser over dyreliver pa Svalbard i 1970. *Norsk Polarinst. Arbok* 1970: 264-270. In Norwegian.
- NORDERHAUG,M. 1973. Iakttagelser over dyrelivet pa Svalbard i 1971. *Norsk Polarinst. Arbok* 1971: 87-92. In Norwegian.
- NYHOLM,E.S. 1966. Observations on some birds and mammals of Spitsbergen. *Ann. Zool. Fenn.* 3: 173-175.
- NYHOLM,E.S. 1970. Ornithological observations on Bear Island 1967. *Astarte* 4: 37-39.
- OGILVIE,M.A. & TAYLOR,R.J.F. 1967. Summer records from West-Spitsbergen, 1964. *Ibis* 109: 299-309.
- SCHAANING,H.T.L. 1933. A contribution to the bird fauna of Jan Mayen. *Skrifter om Svalbard og Ishavet (Oslo)* 49: 25-39.
- SELIGMAN,O.R. & WILLCOX,J.M. 1940. Some observations on the birds of Jan Mayen. *Ibis* 14(4): 464-478.
- TOLLEN,E. 1960. Dagdgjur och faglar pa Nordostlandet, Spetsbergen. *Fauna och flora* 55: 79-96. In Swedish.
- VOISIN,J.-F. 1970. Some notes about birds and mammals in Svalbard, summer 1969. *Norsk Polarinst. Arbok* 1969: 107-115.
- WILLIAMS,A.J. 1971. Ornithological observations on Bear Island 1970. *Astarte* 4: 31-36.

## 6.48. ICELAND

- CONGREVE,W.M. & FREME,S.W.P. 1930. Seven weeks in eastern and northern Iceland. *Ibis* 12(6): 192-228. EMMS,S. & ELSTON,D. Undated. *Oxford Ornithological Expedition to Iceland 1982*. Report, Oxford. 39 pp.
- GALBRAITH,C.A. & THOMPSON,P.S. 1981. (The Wood Sandpiper (*Tringa glareola*) breeding in Iceland.) *Natturufr.* 51: 164-168. In Icelandic with English summary.
- GALBRAITH,C.A. & THOMPSON,P.S. 1982. The Wood Sandpiper *Tringa glareola* breeding in Iceland, 1981. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 76:72.
- GARDARSSON,A. 1969. Er Floastelkur (*Tringa glareola*) varpfugl a Islandi? *Natturufr.* 39: 10-16. In Icelandic.
- GARDARSSON,A. 1975. Islendir votlendisfuglar. *Rit Landverndar* 4: 100-134. In Icelandic.
- GARDARSSON,A., INGOLFSSON,A. & ELDON,J. 1976. Lokaskyrsla um rannsoknir a osholmasvaedi Eyjafjardarar 1974 og 1975. *Liffraedistofnun haskolans. Fjolrit* 7. In Icelandic.
- GARDARSSON,A., NIELSON,O.K. & INGOLFSSON,A. 1980. Rannsoknir i Onundarfirdi og vidar a Vestfjordum 1979: fuglar og fjarur. *Liffraedistofnun haskolans. Fjolrit* 12. In Icelandic.
- GILLANDT,L. 1974. Beobachtungen an einer Thorshunchen-Population (*Phalaropus fulicarius*) in Sudwest-Island (Aves: Charadriiformes: Phalaropodidae). *Abh. Verh. naturwiss Ver. Hamburg (NF)* 17: 55-83.
- GUDMUNDSSON,F. 1957. Izlenzkir fuglar XV. Spoil (*Numenius phaeopus*). *Natturufr.* 27: 113-125. In Icelandic.
- HANSEN,E.S. 1983. (Lapwing *Vanellus vanellus* nests in Medalland, S. Iceland, 1983.) *Bliki* 2: 42-43. In Icelandic with English summary.

- HJALMARSSON,A.W. 1982. Vadfuglar. [Waders.] *Fuglar, Rit Landverndar* 8: 117-148. In Icelandic.
- INGOLFSSON,A., KJARTANSOTTIR,A. & GARDARSSON,A. 1980. Athuganir a fuglum og smadyralifi i Skardsfirdi. *Liffraedistofnun haskolans. Fjolrit* 13.
- MULDER,T. & PHILIPPONA,J. 1986. Weidevogels op Ijsland. [Meadowbirds on Iceland.] *Vogeljaar* 34: 17-23. In Dutch.
- PETERSEN,A. 1970. Fuglalif i Skognum a osholmasvaedi Heradsvatna i Skagafirdi. *Natturufr.* 40: 1-25. In Icelandic.
- PETERSEN,A. 1979. (The breeding birds of Flatey and some adjoining islets, in Breidafjordur, N.W. Iceland.) *Natturufr.* 49: 229-256. In Icelandic with English summary.
- ROBERTS,B. 1934. Notes on the birds of central and south-east Iceland, with special reference to food-habits. *Ibis* 13(4): 239-264.
- SCHIOLER,E.L. 1918/1919. Om den islandske Rodben (*Totalanus calidris robustus*). *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 1918/1919: 207-211. In Danish.
- SCHIOLER,E.L. 1926. Om den islandske Kobbersneppa, *Limosa limosa islandica* Br. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 1926: 11-12. In Danish.
- SELOUS,E. 1915. A diary of ornithological observations made in Iceland during June and July, 1912. *Zoologist* 19: 54-56, 169-174 & 303-307; 20: 54-68, 139-152 & 267-272.
- SIGURDSSON,J.B. 1967. Nyr varpfugl a Islandi. Vepja (*Vanellus vanellus*). *Natturufr.* 37: 170-178.
- SUMMERS,R.W. & NICOLL,M. 1983. An uncertain future for breeding waders in Iceland. *Wader Study Group Bull.* 39: 32-33.

- TIMMERMANN, G. 1937. Ornithologiske Iagttagelser fra Rejse i Nordostisland. *Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 1937: 127-141. In Danish.  
TIMMERMANN, G. 1949. Die Vogel Islands. Leiftur Reykjavik, 524 pp.

- WINK, M. 1973. Siedlungsdichteuntersuchungen in Heidebiotopen und Lavafeldern Nord-Islands. *Vogelwelt* 94: 41-50.

## 6.49. FAROE ISLANDS

- BENGTSON, S-A. & BLOCH, D. 1983. Island land bird population densities in relation to island size and habitat quality on the Faroe Islands. *Oikos* 41: 507-522.  
BLOCH, D. 1981. (Bird census in the Faroe Islands, summer 1981. Preliminary report.)

- Dansk Orn. Foren. Tidsskr.* 75: 1-6. In Danish with English summary.  
BLOCH, D. & SORENSEN, S. 1984. Checklist of Faroese birds. *Foroya Skulabokagrunnur*, Thorshavn. 84 pp.

## 6.50. NORWAY

compiled by Ingvar Byrkjedal

- ANFINNSEN, M.T. 1954. Fuglelivet på Jaeren. *Jeger og Fisker* 83: 40-53. In Norwegian.  
ASHPJELL, J.A. 1979. Skogsnipte, *Tringa ochropus*, i Saltdal. Var Fuglefauna 2: 34-35. In Norwegian.  
BAKKEN, J. & EIKELAND, M. 1977. Fuglefaunaen i Odalen. *Kornkraka* 7: 2-5. In Norwegian.  
BENDIKSEN, F.S. 1973. Bjarkøy kommunes fuglefauna. *Fauna* 26: 7-23. In Norwegian.  
BERNHOFST-OSA, A. 1974. Svommesniper ved Haheller i Sirdal. *Falco* 3:13. In Norwegian.  
BOLLINGMO, T. & BREIEHAGEN, T. 1977. Fugleobservasjoner i Øvre Pasvik fra oktober 1972 til juli 1974 og litt om forandringer i enkelte arters status. *Sterna* 16: 99-107. In Norwegian.  
BREISTOL, L. 1977. Gronnstilkens utbredelse i fylket. *Larus marinus* 6: 29-32. In Norwegian.  
BYRKJEDAL, I. 1974. (The Golden Plover as a breeding bird in Co. Rogaland, SW-Norway.) *Sterna* 13: 1-14. In Norwegian with English summary.  
BYRKJEDAL, I. 1977. Tetthet av hekkende fugler i lyngheibiotop på Hog-Jaeren. *Sterna* 16: 211-216. In Norwegian.  
CARLSSON, O. 1978. Fjaereplytt *Calidris maritima*. *Falco* 7: 109-113. In Norwegian.  
CARLSSON, O. 1979. Tjeldens utbredelse i Rogaland. *Falco* 8: 112-116. In Norwegian.  
CEDERLOV, A.C. 1969. Reir av svarthalespove på Jaeren. *Sterna* 8: 337-338. In Norwegian.  
FOLLESTAD, A. 1979. Hekkende svarthalespove (*Limosa limosa*) på Romsdalskysten. *Rallus* 9: 106-107. In Norwegian.  
GJERDE, O. 1973. (Breeding of the Black-tailed Godwit in Vesterålen, N.Norway, 1972.) *Sterna* 12: 295-300. In Norwegian with English summary.  
GODO, G. & BJORDAL, H. 1975. Fuglefaunaen i Sogn og Sunnfjord. *Fauna* 28: 230-239. In Norwegian.  
GOTMARK, F., HILDEN, O., JARVINEN, O. & VAISANEN, R.A. 1978. Inland breeding of the Turnstone *Arenaria interpres* in northern Norway. *Cinclus* 1: 12-15.  
HAFTORN, S. 1971. Norges fugler. Universitetsforlaget, Oslo. In Norwegian.  
HAGA, A. 1974. Heravassdraget i Trogstad - et verneverdig område i Østfold. *Ostfoldornitologen* 1(4): 4-9. In Norwegian.  
HANSSEN, O.J. 1984. Habitat selection of

- shorebirds in an archipelago in SE Norway. *Ornis Scand.* 15: 253-260.  
HARDENG, G., HUNN, T., ROSETH, A. & RUD, T. 1975. Ornithologiske registreringer i Romskog-traktene i Østfold/Akershus. *Ostfoldornitologen* 2(1): 28-35. In Norwegian.  
HILDEN, O. 1978. (Occurrence and breeding biology of the Little Stint *Calidris minutus* in Norway.) *Proc. First Nordic Congr. Orn.* 1977, *Anser Suppl.* 3: 96-100. In Swedish with English summary.  
HOLGERSEN, H. & WILLGOHS, J.F. 1956. First breeding of the Black-tailed Godwit, *Limosa limosa* (L.) in Norway. *Astarte* 13: 1-8.  
INNES, J. 1978. The 1978 Cambridge Norwegian expedition. *Wader Study Group Bull.* 24:25.  
INNES, J.L. (ed.) 1979. *Cambridge Norwegian Expedition 1978. Report.* Report Cambridge.  
JARVINEN, O. & VAISANEN, R.A. 1978. Habitat distribution and conservation of land bird populations in northern Norway. *Hol. Ecol.* 1: 351-360.  
JOHANSEN, O. 1975. Faunistiske smanotiser. *Sterna* 14: 42-44. In Norwegian.  
KALAS, J.A. & BYRKJEDAL, J. 1981. (The status of breeding waders Charadrii in Norway including Svalbard.) *Proc. Second Nordic Congr. Ornithol.* 1979: 57-74. In Norwegian with English summary.  
KLEMETSEN, A., ANDERSEN, J., ERVIG, S. & KIRKEBY, J. 1974. Vatmarksfugl i Øvre Divald nasjonalpark. *Sterna* 13: 35-42. In Norwegian.  
KVAERNE, M. 1968. Fokstumyras fuglefauna 1964-1967. *Sterna* 8: 49-64. In Norwegian.  
KVAERNE, M. 1970. Observasjoner fra brushanens spillplasser på Fokstumyra 1969. *Sterna* 9: 22-27. In Norwegian.  
LRSK NORD-TRONDELAG. 1979. Faunistisk rapport fra Nord-Trondelag 1970-1977. Var Fuglefauna 2: 62-65. In Norwegian.  
LRSK VESTFOLD. 1977. Faunistisk rapport fra Vestfold til og med 1974. *Sterna* 16: 63-72. In Norwegian.  
MJELSTAD, H. & SAETERSDAL, M. 1986. Density, population size and breeding distribution of Spotted Redshank *Tringa erythropus*, Bar-tailed Godwit *Limosa lapponica* and Jack Snipe *Lymnocryptes minimus* in Norway. *Fauna norv. Ser. C, Cinclus* 9: 13-16.  
PAULSEN, B.-E. 1978. Noen sjeldnere hekkefugler i Sokndal i 1978. *Falco* 7: 79-81. In Norwegian.

- PEDERSEN,F.-H. 1977. Litt om fuglelivet på Gullfjellet. *Krompen* 6(3): 20-24. In Norwegian.
- RAPPORTKOMITEEN FOR FINNMARK. 1976. Faunistisk rapport fra Finnmark 1967-1974. *Sterna* 15: 19-22. In Norwegian.
- RAPPORTKOMITEEN I MORE OG ROMSDAL. 1975. Faunistisk rapport for More og Romsdal 1973-74. *Sterna* 14: 135-145. In Norwegian.
- RAPPORTKOMITEEN FOR TRONDALAG. 1976. Faunistisk rapport fra Trondelag 1970-74. *Sterna* 15: 114-126. In Norwegian.
- ROSTAD,O.W. 1980. [Breeding of Little Ringed Plover in Aust-Agder.] *Larus marinus* 9: 66-69. In Norwegian.
- SATVEDT,O. 1971. (Breeding Black-tailed Godwit in Lofoten, N.Norway, 1970.) *Sterna* 10: 90-96. In Norwegian with English summary.
- SCHANDY,T. 1984. Dobbeltbekkasinens *Gallinago media* ferekomst og habitatvalg på Hardangervidda. [Occurrence and habitat choice of Great Snipe on Hardangervidda.] *Var Fuglefauna* 7: 205-208. In Norwegian.
- SLAGSVOLD,T. 1976. Fuglebestanden i Mattisdalen, Alta, 1976. *Sterna* 15: 201-206. In Norwegian.
- SOLLIEN,A., FOSSEIDENGEN,J.E. & NESHOLEN,B. 1977. Avifaunistiske observasjoner fra Hedmark. *Fauna* 30: 168-175. In Norwegian.
- SPIKKELAND,I. 1975. Fuglelivet i Marnardal, Vest-Agder. *Fauna* 28: 35-39. In Norwegian.
- SPIKKELAND,I. 1976. Fuglelivet nord for Hovden. *Larus marinus* 5: 6-15. In Norwegian.
- STORKERSEN,O.R. 1982. [First breeding records of Little Ringed Plover in Sor-Trondelag.] *Trondersk Natur* 9: 4-7. In Norwegian.
- SUTHER,P.-O. 1977. Glommavassgradet i indre Østfold med flere verneverdige vatmarker. *Ostfoldornitologen* 4: 14-18. In Norwegian.
- THINGSTAD,P.G. 1983. (Distribution of waders in Nord-Trondelag, central Norway.) *Var Fuglefauna* 6: 244-251. In Norwegian with English summary.
- THINGSTAD,P.G. 1984. The status of breeding waders in Nord Trondelag county - in comparison with the existing estimates of Norwegian population sizes. *Ann. Zool. Fenn.* 21: 351-357.
- TOFT,G.O. 1975. Forste hekkefunn av avosett i Norge. *Sterna* 14:22. In Norwegian.
- TOFT,G.O. 1982. (Populations of Turnstone in the county of Rogaland during the summer.) *Fauna* 35: 169-170. In Norwegian with English summary.
- TOFT,G.O. & ROALKVAM,R. 1984. (Breeding Avocets at Jaeren, S.W. Norway.) *Var Fuglefauna* 7: 227-229. In Norwegian with English summary.
- VINK,J.A.J. & LOK,C.M. 1982. (Definite breeding records of Bar-tailed Godwit *Limosa lapponica* at Varangerhalvoya.) *Fauna* 35: 176-177. In Norwegian with English summary.
- WIKAN,S. 1972. Fuflefaunaen i Ovre Pasvik. *Fauna* 25: 163-180. In Norwegian.

## 6.51. SWEDEN

compiled by Sven Blomqvist

- AHLEN,I. 1977. *Faunavard*. Skogshögskolan - Naturvardsverket, Liber Forlag/Allmanna Forlaget, Stockholm. In Swedish.
- ALM,B., ENEMAR,A., MYHRBERG,H. & SVENSSON,S. 1965. The density of birds in two study areas of the alpine region in southern Lapland in 1964. *Acta Univ. Lund, Sweden II* (4): 1-14.
- ARHEIMER,O. & NYHOLM,E. 1966. (First Swedish breeding of Little Stint (*Calidris minuta*).) *Var Fagelvarld* 25: 143-147. In Swedish with English summary.
- BOSTROM,U. & NILSSON,S.G. 1983. Latitudinal gradients and local variations in species richness and structure of bird communities on raised peat-bogs in Sweden. *Ornis Scand.* 14: 213-226.
- CARLSSON,U.T. 1983. Värmlandsinventeringen 1982. *Värmlandsornitologen* 11: 21-27. In Swedish. Data on Golden Plover and Curlew.
- EMANUELSSON,U. 1975. Rautas - den bortglomda vildmarken. *Fauna och Flora* 70: 108-115. In Swedish.
- EMANUELSSON,U. & KJELLEN,N. 1981. (Breeding distribution of the Dunlin *Calidris alpina* in Skane, South Sweden 1930-1981.) *Anser* 20: 233-240. In Swedish with English summary.
- EMANUELSSON,U. & KJELLEN,N. 1985. (Breeding distribution of the Dunlin *Calidris alpina* in Skane, South Sweden 1930-1981.) In: Tjernberg,M. (ed.). (*The Southern Dunlin Calidris alpina schinzii in Sweden*.) Statens naturvardsverk, Solna. pp. 7-19. In Swedish with English summary.
- KARVIK,N.-G. 1964. The terrestrial vertebrates of Dalsland in southwestern Sweden. A zoogeographical study. *Acta Vertebratica* 3: 1-239.
- KOLMODIN,U. & NILSSON,S.G. 1982. (Density and species richness of breeding birds on mires in Dalarna, central Sweden.) *Var Fagelvarld* 41: 1-13. In Swedish with English summary.
- LARSSON,T. 1969. Land use and bird fauna on shores in southern Sweden. *Oikos* 20: 136-155.
- LARSSON,T. 1976. Composition and density of the bird fauna in Swedish shore meadows. *Ornis Scand.* 7: 1-12.
- northern Halland in 1970 and 1978/79.) *Var Fagelvarld* 39: 95-99. In Swedish with English summary.
- HEDENSTROM,A. & VUORINEN,J. 1982. (Little Ringed Plover, *Charadrius dubius*, breeding semi-colonially.) *Var Fagelvarld* 41:408. In Swedish with English summary.
- HJORT,C. & LARSSON,A. 1973. (Wader censuses at Ottenby 1965-1973.) *Var Fagelvarld* 32: 199-203. In Swedish with English summary.
- HOGSTEDT,G. & LARSSON,G. 1971. Vadartaxeringar pa sydväststansta kustangar. *Medd. Skanes Orn. Foren.* 10: 45-50. In Swedish.
- HOGSTROM,S. 1985. (Observations of Dunlins on Gotland during the 1980 breeding period.) In: Tjernberg,M. (ed.). (*The Southern Dunlin Calidris alpina schinzii in Sweden*.) Statens naturvardsverk, Solna. pp. 64-69. In Swedish with English summary.
- JONSSON,P.E. 1983. (The Kentish Plover in Sweden - its status and breeding ecology.) *Anser* 22: 209-230. In Swedish with English summary.
- KARVIK,N.-G. 1964. The terrestrial vertebrates of Dalsland in southwestern Sweden. A zoogeographical study. *Acta Vertebratica* 3: 1-239.
- KOLMODIN,U. & NILSSON,S.G. 1982. (Density and species richness of breeding birds on mires in Dalarna, central Sweden.) *Var Fagelvarld* 41: 1-13. In Swedish with English summary.
- LARSSON,T. 1969. Land use and bird fauna on shores in southern Sweden. *Oikos* 20: 136-155.
- LARSSON,T. 1976. Composition and density of the bird fauna in Swedish shore meadows. *Ornis Scand.* 7: 1-12.

- NILSSON,J. & NILSSON,S. 1973. Smaspov *Numenius phaeopus* hackande i Smaland. *Var Fagelvarld* 32: 45-46. In Swedish.
- NILSSON,S.G. & NILSSON,J.N. 1978. Population, habitat and display activity of the Jack Snipe *Lymnocryptes minimus* in southern Sweden. *Var Fagelvarld* 37: 1-8. In Swedish with English summary.
- NILSSON,L., LARS-ANDERS,H. & HOGSTROM,L. 1982. (Lake Karsjon as a bird lake - breeding and resting waterfowl in 1972-1980 - and on the restoration of its shore meadows.) *Var Fagelvarld* 41: 297-314. In Swedish with English summary.
- OLSSON,V. 1943. Skarflackan ater hackfagel pa Oland. *Fauna och Flora* 38: 248-251. In Swedish.
- PEHRSSON,O. 1983. (Lake Hornborgasjön as waterpower reservoir, fish culture, and arable land - will that be the next development stage of the 10 000 year old bird lake?) *Var Fagelvarld* 42: 161-180. In Swedish with English summary.
- RISBERG,L., ASPENBERG,P. & ERKSON,L. 1976. (On the bird fauna of the coast of Gustrikland, Gulf of Bothnia, with special reference to changes during recent decades.) *Var Fagelvarld* 35: 195-212. In Swedish with English summary.
- ROOS,G. 1965. (Contribution a connaissance de la présence barge à queue noire (*Limosa limosa*) en Oland.) *Fauna och Flora* 60: 181-187. In Swedish with French summary.
- SVENSSON,L. (ed.) 1978. *Sveriges faglar*. Sveriges Ornitolologiska Forening, Stockholm, 268 pp.
- SVENSSON,S. 1966. Observations on breeding Lapwings and Curlews in southern Swedish Lapland in 1964. *Fauna och Flora* 60: 53-62. In Swedish with English summary.
- THOLIN,C. 1981. (The occurrence of the southern race of the Dunlin *Calidris alpina schinzii* on land.) *Calidris* 10: 71-83. In Swedish with English summary.
- THOLIN,C. 1982. [The occurrence of the Black-tailed Godwit, *Limosa limosa*, in the breeding season on Oland.] *Calidris* 11: 231-256. In Swedish.
- THOLIN,C. 1985. (The occurrence of the southern race of Dunlin, *Calidris alpina schinzii*, on Oland.) In: Tjernberg,M. (ed.) (The Southern Dunlin *Calidris alpina schinzii* in Sweden.) Statens naturvårdsverk, Solna. pp. 54-63. In Swedish with English summary.
- TJERNBERG,M. 1985. (The situation for the Dunlin in the remaining parts of southern Sweden.) In Tjernberg,M. (ed.) (The Southern Dunlin *Calidris alpina schinzii* in Sweden.) Statens naturvårdsverk, Solna. pp. 70-75. In Swedish with English summary.
- TJERNBERG,M. (ed.) 1985. (The Southern Dunlin *Calidris alpina schinzii* in Sweden.) Statens naturvårdsverk, Solna. 90 pp. In Swedish with English summary.
- JLFSTRAND,S. & HOGSTEDT,G. 1976. (How many birds breed in Sweden?) *Anser* 15: 1-32. In Swedish with English summary.
- WAHLSTEDT,J. 1984. Skyddsvard natur in Norrbottens lan. Del II. Lapplandsdelen. *Var Fagelvarld* 43: 143-160. In Swedish.
- WALDENSTROM,A. 1982. (Ringed Plover *Charadrius hiaticula* breeding in a sand-pit on Oland.) *Calidris* 11:161. In Swedish with English summary.
- WINK,M. 1970. Zur Avifauna von Torne Lapmark (Schwedisch-Lappland). *Orn. Mitt.* 22: 113-120.

## 6.52. FINLAND

compiled by Olavi Hilden & Theunis Piersma

- AHOLA,J. & LIESMA,J. 1978. (Inland nesting of the Oystercatcher in Finland in 1974-1977.) *Lintumies* 13:25. In Finnish with English summary.
- BERGMAN,G. 1946. Der Steinwalzer, *Arenaria interpres* (L.) in seiner Beziehung zur Umwelt. *Acta Zool. Fenn.* 47: 1-151.
- BERGMAN,G. 1976. Vogelstudien und Migrationsprobleme in Finland. *Ornis Fenn.* 53: 107-114.
- CASEN,R. 1960. Vadar faglarna pa Rummelon. *Osterb. Arsbok* 1960: 1-35. GRANIT,O. 1938. Versuch zur quantitativen Untersuchung der Vogelfauna einer Feldgegend in Nordfinnland. *Ornis Fenn.* 15: 53-65.
- HAAPANEN,A. & RASSI,P. 1983. National inventory of wetlands in Finland. In: Boyd,H. (ed.). *First western hemisphere waterfowl and waterbird symposium IWRB*, pp. 38-44.
- HAARTMAN,L.VON. 1973. Changes in the breeding bird fauna of North Europe. In: Farner,D.S. (ed.). *Breeding biology of birds*, Washington, pp. 448-481.
- HAARTMAN,L.VON. 1975. Changes in the breeding bird fauna of coastal bays in southwestern Finland. *Ornis Fenn.* 52: 57-67.
- HAARTMAN,L.VON. 1978. Changes in the bird fauna in Finland and their causes. *Fennia* 150: 25-32.
- HAARTMAN,L.VON, HILDEN,O. LINKOLA,P., SUOMALAINEN,P. & TENUOVO,R. 1963-1972. Pohjolan linnut varikuvin. Helsinki. In Finnish.
- HAGGBLOM,R. & LIESMA,J. 1974. (The Oystercatcher breeding inland.) *Lintumies* 9:64. In Finnish with English summary.
- HAKALA,A. 1971. A quantitative study of the bird fauna of some open peatlands in Finland. *Ornis Fenn.* 48: 1-12.
- HELO,P. 1972. Kainuun linnusto vuosteen 1970 mennessä kertyneiden tietojen perusteella. *Kainuun linnut* 2: 27-75. In Finnish.
- HELO,P. 1975. Kainuun linnusto vuoden 1974 kertyneen havaintomateraalin perusteella. *Kainuun linnut* 3: 9-16, 90-99.
- HIETANEN,E. & HYYTIA,K. 1973. Pikkutyllin (*Charadrius dubius*) pesimisesta Payat-Hameessa 1969-1972. *Payat-Hameen linnut* 4: 4-22. In Finnish.
- HILDEN,O. 1958a. (Seltene Brutvogel an der Küste des Bottenvieks.) *Ornis Fenn.* 35: 28-38. In Finnish with German summary.
- HILDEN,O. 1958b. Fagellivet pa Valsorarna. *Osterbottnisk arsbok* 1958: 100-148. In Swedish.
- HILDEN,O. 1966. Changes in the bird fauna of Valassaaret, Gulf of Bothnia, during recent decades. *Ann. Zool. Fenn.* 3: 245-269.
- HILDEN,O. 1967. (Investigations on the breeding birds of Lapland.) *Luonnon Tutkiija* 71: 152-162. In Finnish with English summary.

- HILDEN,O. 1978. Population dynamics in Temminck's Stint *Calidris temminckii*. *Oikos* 30: 17-28.
- HILDEN,O. 1979. (Effects of the advances in field ornithology on bird censuses.) *Lintumies* 14: 9-14. In Finnish with English summary.
- HILDEN,O. 1983. Recent population changes of waders in Finland and their causes. In: Evans,P.R., Hafner,H. & L'Hermitte,P. (eds.) *Shorebirds and Large Waterbirds Conservation*. EC Proceedings 1983, pp. 13-16.
- HILDEN,O. & VUOLANTO,S. 1972. Breeding biology of the Red-necked Phalarope *Phalaropus lobatus* in Finland. *Ornis Fenn.* 49: 57-85.
- HILDEN,O., HURME,T. & TAXELL,C.G. 1979. Hackfagelstudier och strackobsvervationer pa Valsorarna. *Ostbotten* 1978: 5-119.
- HILDEN,O. & HYYTIA,K. 1981. (The population changes and present status of waders in Finland.) *Proc. Second Nordic Congr. Ornithol.* 1979: 19-37. In Swedish with English summary.
- HILDEN,O. & SHARROCK,J.T.R. 1982. (Recent changes in the status of European birds.) *Lintumies* 17: 150-160. In Finnish with English summary.
- HUHTALA,K. 1979. Keskipohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys. *Jasentiedote* 1979(1): 2-6. In Finnish.
- HYYTIA,K. 1979. Tilane lintutlaksessa viiden laskentakauden jalkeen. *Lintumies* 14: 54-58. In Finnish.
- HYYTIA,K., KELLOMAKI,E. & KOISTINEN,J. (eds.) 1983. *Suomen lintuatlas*. [Atlas of breeding birds in Finland.] SLY: n Lintutieto Oy, Helsinki. 520 pp. In
- JARVINEN,O. & VAISANEN,R.A. 1976. Species diversity of Finnish birds, II. Biotopes at the transition between taiga and tundra. *Acta Zool. Fenn.* 145: 1-35.
- JARVINEN,O. & SAMMALISTO,L. 1976. Regional trends in the avifauna of Finnish peatland bogs. *Ann. Zool. Fenn.* 13: 31-43.
- JARVINEN,O. & VAISANEN,R.A. 1977. Long-term changes of the North European land bird fauna. *Oikos* 29: 225-228.
- JARVINEN,O. & VAISANEN,R.A. 1978. Long-term population changes of the most abundant south Finnish forest birds during the past 50 years. *J. Orn.* 119: 441-449.
- JARVINEN,O. & VAISANEN,R.A. 1978. Ecological zoogeography of North European waders, or, Why do so many waders breed in the North? *Oikos* 30: 496-507.
- KALELA,O. 1955. Die neuzeitliche Ausbreitung des Kiebitzes *Vanellus vanellus* (L.) in Finnland. *Ann. Zool. Soc. 'Vanamo'* 16(11): 1-80.
- KAUKOLA,A. & SOIKKELI,M. 1967. Tyllitutkimus Leveakarilla 1962-67. *Porin Lintutiet. Yhd:n Vuosikirja* 1967: 26-30. In Finnish.
- KILPI,M. 1985. Archipelago bird populations in Finland: monitoring and recent changes. *Ornis Fenn.* 62: 42-46.
- LAHDESMAKI,P. 1980. (Seasonal variation in the peatland bird fauna in Ylikiiminki (Northern Ostrobothnia). *Aureola* 5: 72-78. In Finnish with English summary.
- LAINE,H. 1962. (Zur Verbreitung der Pfuhschepfe in Finnland.) *Ornis Fenn.* 39: Finnish with German summary.
- LAMPIO,T. 1950. (On the occurrence of the Great Snipe in Finland.) *Ornis Fenn.* 27: 31-38. In Finnish with English summary.
- LEINONEN,A. & NISKASAARI,M. 1979. (An inland nesting record of the Turnstone.) *Lintumies* 14:183. In Finnish with English summary.
- LESKELA,P. 1982. Ypparin Harmi, Perameren rantaa. *Aureola* 7: 55-58. In Finnish.
- MARJAKANGAS,A. 1980. (A southern nesting record of the Broad-billed Sandpiper.) *Lintumies* 15:88. In Finnish with English summary.
- MERIKALLIO,E. 1958. Finnish birds, their distribution and numbers. *Fauna Fenn.* 5: 1-181.
- MIKKOLA,K. 1978a. Linnustoko runsastunut? *Lintumies* 13: 101-103. In Finnish.
- MIKKOLA,K. 1978b. Linja-arvointien vertailemisesta. *Lintumies* 13: 148-150. In Finnish.
- MIKKOLA,K. 1979. Linja-arvointimenetelma ja lintutieteenemme. *Lintumies* 14: 41-42. In Finnish.
- NORDBERG,S. 1950. Researches on the bird fauna of the marine zone in the Aland Archipelago. *Acta Zool. Fenn.* 63: 1-62.
- NORDLING,E. 1898. Fagelfaunani Enare socken. Ett bidrag till kannedomen om Lappmarkens fagelfauna. *Acta Soc. Fauna Flora Fenn.* 15(3): 1-98. In Swedish.
- OHTONEN,A. & TYNJALA,M. 1979. Faunistisia tietoja Pohjois-Pohjanmaalta 1970 - luvulta. *Aureola* 4: 21-28. In Finnish.
- PALMGREN,J. 1983. (Field identification of Great Snipe *Gallinago media* and the occurrence in Finland in the years 1970-1981.) *Lintumies* 18: 58-66. In Finnish with English summary.
- PALMGREN,J. & VALSTE,J. 1983. Changes in the bird fauna of woodless rocky islets in the Tvarminne archipelago during the last 40 years. *Ornis Fenn.*, Suppl. 3: 94-95.
- POUTANEN,T. 1979. Pesimalinnuston linja - arvioinnista. *Lintumies* 14: 42-44. In Finnish.
- RAUHALA,P. 1980. Kemin - Tornion seudun linnusto. Kemi.
- SAARNISUO,N. 1977. (Breeding record of the Great Snipe in central Finland.) *Lintumies* 12:26. In Finnish with English summary.
- SAVOLAINEN,E. 1980. (The Turnstone breeding in the interior of Finland.) *Ornis Fenn.* 57:176. In Finnish with English summary.
- SEISKARI,P. 1956. The nesting of Lapwings on raised bogs (Hochmoore). *Ornis Fenn.* 33: 28-33.
- SOIKKELI,M. 1964. The distribution of the Southern Dunlin (*Calidris alpina schinzii*) in Finland. *Ornis Fenn.* 41: 13-21.
- SOIKKELI,M. 1965. On the structure of the bird fauna on some coastal meadows in western Finland. *Ornis Fenn.* 42: 101-111.
- SOIKKELI,M. 1967. Kuusi pesimäkautta suosirritutkumusta Porissa. *Porin Lintutiet. Yhd:n Vuosikirja* 1967: 12-21. In Finnish.
- SOIKKELI,M. 1974. Population dynamics of Dunlin in Finland. *Proc. IWRB Wader Symp. Warzawa 1973*: 61-62.
- SOIKKELI,M. & SALO,J. 1979. The bird fauna of abandoned shore pastures. *Ornis Fenn.* 56: 124-132.
- TORMALA,T. 1984. The bird community of an abandoned field. *Ornis Fenn.* 61: 93-95.
- VAISANEN,R.A. & JARVINEN,O. 1977. Dynamics of protected bird communities in a Finnish archipelago. *J. Anim. Ecol.* 46: 891-908.
- VAISANEN,R.A. & JARVINEN,O. 1977. Structure and fluctuation of the breeding bird fauna of a north Finnish peatland area. *Ornis Fenn.* 54: 143-153.
- VAISANEN,R.A. & JARVINEN,O. 1977. Quantitative structure and primary succession of bird communities in a Finnish archipelago. *Ornis Scand.* 8: 47-60.
- VAISANEN,R.A. & RAUHALA,P. 1983. Succession of land bird communities on large scale drainings of peatlands for forestry. *Ann. Zool. Fenn.* 20: 115-127.

VALSTE,J. & PALMGREN,J. 1984. Changes in the numbers and distribution of waders in an archipelago off the southern coast of Finland in 1914-1981. *Ann. Zool. Fenn.* 21: 359-369.

VIKLIND,V.-P. 1981. Katsaus vuoden 1980 kesaaikaisiin havaintoihin. (A faunistic review.) *Aureola* 6: 85-89. In Finnish.  
VIKLUND,V.-P. 1982. Katsaus vuoden 1981 kesaaikaisiin havaintoihin. (A faunistic review.) *Aureola* 7: 34-38. In Finnish.



## 6.53. DENMARK

- BRANDT,C. 1953. Skovsneppen (*Scolopax rusticola* L.) ynglende pa Sydfyn. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 47:142. In Danish.  
CLAUSAGER,I. 1972. Skovsneppen (*Scolopax rusticola*) som ynglefugl i Danmark. *Danske Vildtundersogelse*, heftet 19. In Danish.  
DYBBRO,T. 1970. Hvidbrysted Praestekrave (*Charadrius alexandrinus*) som ynglefugl i Danmark. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 64: 205-222. In Danish.  
DYBBRO,T. 1976. *De Danske ynglefugles udbredelse.* [Breeding birds of Denmark.] Dansk Orn. Forening, Kobenhavn, 293 pp. In Danish.  
DYBBRO,T. & JORGENSEN,O.H. 1971. (The distribution of Black-tailed Godwit (*Limosa limosa*), Dunlin (*Calidris alpina*), Ruff (*Philomachus pugnax*) and Avocet (*Recurvirostra avosetta*) in Denmark 1970.) *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 65: 116-128. In Danish with English summary.  
DYBBRO,T. 1981. (A survey of wader populations in Denmark.) *Proc. Second Nordic Congr. Ornithol.* 1979: 109-110. In Danish with English summary.  
ELWES,H.J. 1880. Field notes on the birds of Denmark. *Ibis* 4(4): 385-399.  
FABRICIUS,O. & HALD-MORTENSEN,P. 1969. Hjejlen (*Pluvialis apricaria*) som ynglefugl i Danmark 1963-1966, med bemaerkninger om artens race-forhold, udbredelse og antal. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 63: 137-160. In Danish.  
FERDINAND,L. 1980. *Fuglene og landskabet.* Dansk Orn. Forening, Kobenhavn. In Danish.  
GERNA,I. 1940. Yngler Storspoven, *Numenius arquata*, i egnen syd for Grinsted? *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 34: 197-198. In Danish.

- GLUD KONRADSEN,O. 1917. Danmark som yngleplads for Skovsneppen (*Scolopax rusticola*). *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 11: 38-43.  
HALD-MORTENSEN,P. 1970. Forekomster af Triel (*Burhinus oedicnemus*) i Sydvestjylland, og betragtninger om artens udbredelse. *Flora og Fauna* 76: 109-113. In Danish.  
HANSEN,M. 1979. Yngleudbredelse af Stor Kobbersneppa 1977-78. *Feldornithologen* 21:199. In Danish.  
HANSEN,M. 1985. (The breeding population of Black-tailed Godwit *Limosa limosa*, Dunlin *Calidris alpina*, Ruff *Philomachus pugnax* and Avocet *Recurvirostra avosetta* in Denmark, 1980.) *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 79: 11-18. In Danish with English summary.  
HEDIN,N. 1904. Nogle iagttagelser over Tippernes Fuglefauna. *Flora og Fauna* 6: 49-55. In Danish.  
HELM'S,O. 1915. Ynglende Skovsnaepper. *Dansk. Jagttidende* 6:57. In Danish, on Woodcock.  
HOLSTEIN,V. 1952. Sandsynlig ynglen af Svaleklire (*Tringa ochropus* L.) i Jaegerspris Nordskov i 1952. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 46: 77-81. In Danish.  
HOLSTEIN,V. 1957. Svaleklire (*Tringa ochropus* L.) som dansk ynglefugl. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 51: 191-197. In Danish.  
HOJER JENSEN,B. 1959. Svaleklire (*Tringa ochropus* (L.)) konstateret som ynglende i Midtsjaelland. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 53:241. In Danish.  
IVERSEN,M. 1977. Optællinger af ynglefuglene i Tondermarsken. Report. In Danish.  
JACOBSEN,L. 1949. Ny koloni af Klyder (*Recurvirostra a. avosetta* L.). *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 42:258. In Danish.

- JENSEN,N.H. 1938. Ynglende Storspover (*Numenius arquata* (L.)) pa Fano. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 32: 88-96.
- JEPSEN,P.U. 1983. (The game reserves as a part of nature management in Denmark.) *Proc. Third Nordic Congr. Ornithol.* 1981: 133-142. In Danish with English summary.
- JESPERSEN,P. 1942. Skovsneppen, *Scolopax rusticola* L., som ynglefugl i Danmark. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 36: 115-134. In Danish.
- JESSEN,T. 1929. Tredaecker (*Gallinago major*) som dansk ynglefugl. *Danske Fugle* II: 274-277. In Danish.
- JESSEN,T. 1931. Svalekliren (*Tringa ochropus*) som ny dansk ynglefugl. *Danske Fugle* III: 104-107. In Danish.
- JOHANSEN,A.C. 1913. Om forandringer i Ringkobing Fjords Fauna. Kommisionen for Havundersogelser, København.
- JORGENSEN,J. 1963. Svaleklire (*Tringa ochropus* L.) som ynglefugl i Nordslesvig. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 57:73. In Danish.
- JORGENSEN,O.H. 1971. En undersogelse af ynglefugletaetheden i dansk agerland i 1969, og 1970. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 65: 98-108.
- KJAER,T. 1932. Hjejle, *Charadrius apricaria oreophilus*, som ynglefugl i Jylland. *Flora og Fauna* 38: 77-83. In Danish.
- KJAER,T. 1935. Storspoven som ynglefugl i Danmark. *Dansk Jagttidende* 52: 199-201. In Danish, on Curlew.
- KJAER,T. 1943. Sent fund of ynglende Skovsneppe, *Scolopax rusticola*, i Rold Skov. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 37:239. In Danish.
- KJAER,T. 1949. Ynglende Stor Regnspove (*Numenius a. arquata* (L.)) i Lille Vildmose. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 43: 179-181. In Danish.
- KJAERBOLLING,N. 1852. *Danmarks Fugle*. København.
- KLINGE,M. 1910. Fuglelivet på Tipperne i Maj 1910. *Dansk. Orn. For. Tidsskr.* 4: 75-89. In Danish.
- KLINGE,M. 1915. Stormfloden på Tipperne i Juni 1913. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 9: 225-226. In Danish.
- KOEFOED,A. 1906. Skovsneppens, *Scolopax rusticola*, yngle forhold i Danmark. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 1: 58-61. In Danish.
- KOEFOED,A. 1924. Fuglelivet på Tipperne, ved Stadil Fjord og ved Husby So. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 18: 148-160. In Danish.
- KOEFOED,A. 1926. *Danmarks ynglefugle*. Gyldendal, København, 112 pp. In Danish.
- KOEFOED,A. 1934. Almindelig Praestkrave, *Charadrius hiaticula*, ynglende i grusgrav langt fra kysten. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 28:123. In Danish.
- LARSEN,L.G. & MOLLER,H.S. 1978. The structure of some Central European bird communities in habitats of different moisture and degree of human utilization. *Proc. First Nordic Congr. Ornithol.*, Anser, Suppl. 3: 129-135.
- LARSEN,V. 1954. Syngende Svaleklire (*Tringa ochropus* (L.)) ved Mollea. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 48:128. In Danish.
- LOPPENTHIN,B. 1947. Skovsneppe (*Scolopax rusticola* L.) ynglefugl på Samso. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 41:77.
- LUTZEN,J. 1953. Klyden (*Recurvirostra avosetta* L.) som ynglefugl ved Limfjorden. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 47: 260-262. In Danish.
- MADSEN,E. 1949. Rodben (*Tringa totanus* (L.)) ynglende på Bornholm. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 43:92.
- MEINHARDT,H. 1934. Storspove og Stor Tornskade ynglende på Randbol Hede. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 28: 71-74. In Danish, on Curlew.
- MOLLER,A.P. 1975. (A census of breeding Charadrii in some coastal areas on Laeso, North Jutland, during the years 1971-74.) *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 69: 31-39. In Danish with English summary.
- MOLLER,A.P. 1978. (Breeding schedule, colony size, clutch size and nestling production in some Charadriiformes species on Laeso, North Jutland.) *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 72: 41-50. In Danish with English summary.
- MOLLER,A.P.(ed.) 1978. *Nordjyllands Fugle - deres yngleudbredelse og traeforhold*. Scandinavian Science Press, Klampenborg.
- MOLLER,H.S. 1978. *Redehabitatvalget hos Vibe (Vanellus vanellus* (L.)), Stor Kobbersneppe (*Limosa limosa* (L.)), Rodben (*Tringa totanus* (L.)) og Brushone (*Philomachus pugnax* (L.)) på reservatet Tipperne, Vestjylland. Unpublished thesis, Zoological Museum, University of Copenhagen, 134 pp. In Danish.
- NIELSEN,V. 1938. Sorthalet Kobbersneppe, *Limosa limosa*, ynglende i Agno Enge. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 32:165. In Danish.
- NORREVANG,A. 1950. Stor Praestkrave (*Charadrius hiaticula* L.) ynglende ved Skanderborg So. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 44:108. In Danish.
- NORUP,S. 1957. Svalekliren (*Tringa ochropus* L.) ynglende ved Jaegerspris. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 51: 204-205. In Danish.
- NOVRUP,L. 1940. Iagttagelser over Stor Tornskade og Storspove på Randbol Hede. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 34: 69-70. In Danish, on Curlew.
- OLAUSSEN,O. 1957. Svaleklire (*Tringa ochropus* L.) ynglende ved Ganlose. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 51:206. In Danish.
- PEDERSEN,H. 1924. Mudderklire, *Actitis hypoleucos*, som dansk ynglefugl. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 18: 107-112. In Danish.
- PEDERSEN,L.P. 1954. Stor Kobbersneppe (*Limosa limosa* (L.)) som ynglefugl på Ulfshale og Nyord Enge. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 48:51. In Danish.
- POULSEN,C.M. 1953. Stor Praestekrave (*Charadrius h. hiaticula* (L.)) som ynglefugl inde i landet. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 47: 16-35. In Danish.
- POULSEN,C.M. 1959. Den store regnspove nu ynglefugl i Midtjylland. *Jagt og Fiskeri* 30:325. In Danish, on Curlew.
- POULSEN,H. 1938. Lille Praestekrave, *Charadrius dubius curonicus*, ynglende i Utterslev Mose. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 32:165. In Danish.
- POULSEN,H. 1957. Svaleklire (*Tringa ochropus* L.) ynglende på Bornholm. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 51:205. In Danish.
- RASMUSSEN,C.L. 1948. Klyde (*Recurvirostra avosetta* L.) ynglende ved Randers Fjord. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 43:259. In Danish.
- RATTENBORG,N. 1983. (Waders on Mando in the Danish Wadden Sea 1975-1980.) *Proc. Third Nordic Congr. Ornithol.* 1981: 119-129. In Danish with English summary.
- SCHLANDER,F. 1940. Klyder, *Recurvirostra avosetta*, ynglende på Aero. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 34:198. In Danish.
- SORENSEN,C. 1940. Storspove, *Numenius arquata*, ynglende i Bylderup Bov. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 34:197. In Danish.
- THAMDRUP,H.M. 1939. Den nuværende bestand af ynglende Hjejler i Danmark. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 33: 134-139. In Danish, on Golden Plovers.

- TORP PEDERSEN, E. 1959. Tinksmeden (*Tringa glareola* L.) som ynglefugl i Danmark. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 53: 53-83. In Danish.
- TORP PEDERSEN, E. 1966. Stor Regnspove (*Numenius a. arquata* (L.)) som ynglefugl i Danmark. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 59: 235-258. In Danish.
- WESTERSKOV, K. 1942. Nyt ynglested for Storspoven, *Numenius arquata* (L.), i Danmark. *Dansk. Orn. Foren. Tidsskr.* 36: 222-223. In Danish.



## 6.54. POLAND

compiled by Jadwiga Gromadzka

- BEDNORZ, J. 1972. W sprawie ochrony ptakow na polwyspie Row wyspie Wolin. [Notes on the protection of birds on the Row peninsula of the Wolin Island.] *Chronmy przyr. ojcz.* 28(4): 12-20. In Polish.
- BEDNORZ, J. 1976. Ptaki wodne i blotne zagospodarowanych lak zalewowych w dolinie Warty kolo Poznania. [Water- and wading-birds of former flooded meadows in a valley of the Warta River near Poznan.] *Pr. Univ. A.M. Poznan, ser. zool.* 5: 1-77. In Polish.
- BEDNORZ, J. 1983. Awifauna Slowinskiego Parku Narodowego z uwzglednieniem stosunkow ilosciowych. (Avifauna of Slowinski National Park with the consideration of quantitative relations.) *Prace Kom. Biol. PTPN* 65: 1-101. In Polish with English summary.
- DOMASZEWICZ, A. & LEWARTOWSKI, Z. 1973. Obserwacje awifauny rzeki Narwi i jej doliny. [Observations on the avifauna of Narew River and its valley.] *Not. przyr.* 7(10): 3-36. In Polish.
- DRYCZ, A. 1973. Ptaki polskiej czesi Karkonoszy. [Birds of the Polish part of the Krkonose mountains.] *Ochrona przyrody* 38: 213-284. In Czechoslovakian.
- DYRCZ, A., OKULEWICZ, J., TOMIALOJC, L. & WITKOWSKI, J. 1972. Ptaki Bagien Biebrzańskich i okolic w okresie legowym. [Breeding avifauna of the Biebrza Marshes and adjacent territories.] *Acta orn.* 13: 343-422. In Polish.
- DYRCZ, A., OKULEWICZ, J. & WIATR, B. 1973. Ptaki Pojezierza Leczycko-Włodawskiego w okresie legowym. [Birds breeding in the Lecznia-Włodawa Lake Districts.] *Acta Zool. Cracov.* 18: 399-473. In Polish.
- DYRCZ, A., OKULEWICZ, J., WITKOWSKI, J., JESIONOWSKI, J., NAWROCKI, P. & WINIECKI, A. 1984. (Birds of fens in Biebrza Marshes. Faunistic approach.) *Acta orn.* 20: 1-108. In Polish with English summary.
- GORSKI, W. 1976. Ptaki legowe pobrzeza Bałtyku miedzy Mielnem a Ustka w latach 1965-1975. [Breeding birds of Baltic coast between Mielno and Ustka in years 1965-1975.] *Not. orn.* 17(1-2): 1-34. In Polish.
- GROMADZKA, J. 1981. Results of twenty years of wader ringing at the mouth of the Vistula in Poland. *Wader Study Group Bull.* 32: 23-24.
- GROMADZKA, J. 1982. Distribution of breeding sites and the number of southern Dunlin (*Calidris alpina schinzii*) on the southern Baltic coast. *Abstracts of Symposia and Poster Presentations XVIII Congr. Int. Orn. Moscow 1982*:203.

- GROMADZKA, J. 1983. (Distribution of breeding sites and number of southern Dunlin (*Calidris alpina schinzii*) on southern Baltic coast.) *Not. orn.* 24: 31-36. In Polish with English summary.
- GROMADZKA, J., STAWARCZYK, T. & TOMIALOJC, L. 1985. Breeding waders in Poland. *Wader Study Group Bull.* 43: 29-33.
- GROMADZKI, M. in press. Some problems of wetland protection in northern Poland. *Var Fagelwärld*.
- JAKUCZUN, B. 1980. Stanowiska legowe ostrygojada *Haematopus ostralegus* w delcie Starej Swiny. [Breeding localities of the Oystercatcher *Haematopus ostralegus* in the Old Swina delta.] *Chronmy przyr. ojcz.* 36(4): 71-73.
- KROL, E. 1982. Population study of Dunlin *Calidris alpina schinzii* near Gdańsk, Poland - preliminary results. *Abstract XVII Int. Congr. Ornithol. Moskow*, pp. 229-230.
- KROL, E. in press a. Coastal meadows in Poland - the vanishing breeding wader habitat. General characteristic. *Var Fagelwärld*.
- KROL, E. in press b. Numbers, reproduction and breeding behaviour of Dunlin *Calidris alpina schinzii* at the Reda mouth, Poland. *Acta orn.* 21. KRYSIAK, I. & KRYSIAK, P. 1984. (Breeding of Oystercatcher in middle course of the Vistula.) *Not. orn.* 25: 64-65. In Polish with English summary.
- LEWARTOWSKI, Z. 1983. Ostatnie stanowisko legowe kulona *Burhinus oedicnemus* w wielkopolsce. [The last breeding locality of the Stone Curlew in major Poland.] *Chronmy Przyr. Ojczysta* 39: 68-71.
- MAJEWSKI, P. 1983. Evaluation of the role of the Slonsk Reserve (Poland) for waterfowl. *Acta orn.* 19: 227-235.
- MARKOWSKI, J. & WOJCIECHOWSKI, Z. 1984. Rzadkie gatunki ptakow stwierdzone w środkowej Polsce. [Rare bird species observed in the middle part of Poland.] *Not. orn.* 25(1-4): 15-24. In Polish.
- NAWROCKI, P., JERMACZEK, A., JESIONOWSKI, J., NAWROOKA, B. & WINIECKI, A. 1983. (Birds of the Kramskie marshes during breeding period in the years 1976-1979.) *Prace Kom. Biol. PTPN* 67: 19-41. In Polish with English summary.
- NOWYSZ, W. & WESOŁOWSKI, T. 1972. Ptaki Kostrzynskiego zbiornika retencyjnego i okolic w sezonie legowym. [The birds of Koszyn retention reservoir and its environs in the breeding season.] *Not. przyr.* 6(8): 4-31. In Polish.
- NOWYSZ, W. & WESOŁOWSKI, T. 1973. Materiały do awifauny doliny Noteci. [Contribution to the avifauna of Noteć river valley.] *Not. przyr.* 7(10): 37-48. In Polish.

- SZCEPANIK,A. 1983. (Nesting of *Vanellus vanellus* on water-pasture in Warta Valley.) *Pozn. Tow. Przyj. Nawk., Wydz. Mat.-Przyr., Pr. Kom. Biol.* 67: 43-55. In Polish with English summary.
- TOMIAŁOJC,L. 1972. *Ptaki Polski. Wykaz gatunkow i rozmieszczenia. [Birds of Poland. A list of species and their distribution.]* Warszawa.
- TOMIAŁOJC,L. in press. *Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebnosc. [Birds of Poland. Their distribution and abundance.]* 2nd edition.
- WESOŁOWSKI,T., GLAZEWSKA,E., GLAZEWSKI,L., NAWROCKA,B., NAWROCKI,P. & OKONSKA,K. 1984. Rozmieszczenie i liczebnosc ptakow siewkowatych, mew i rybitw gniazdujacych na wyspach Wisly srodkowej. [Distribution and numbers of waders, gulls and terns nesting in the middle course of Vistula.] *Acta orn.* 20: 159-185. In Polish.
- WINIECKI,A. 1983. (Ecology and phenology of water- and wading-birds of water-pastures in the valley of Middle Warta River.) *Prace Korn. Biol. PTPN.* 67: 57-96. In Polish with English summary.

## 6.55. CZECHOSLOVAKIA

compiled by Vera Hromadkova-Lnenickova

**Titles of papers in Czech are translated in English.**

- BALAT,F. 1963. Ptaci fauna Zitneho ostrova. [Birds of Zitny island.] *Biologicke prace* 9(7): 1-84.
- BALAT,F. 1965. Z ornitologickych exkurzi na Zitny ostrov v roce 1964. [On the ornithological excursions to Zitny island in 1964.] *Zpravy MOS* 1965: 24-27.
- BALAT,F. 1968. Rybniky u Jakubova - vyznamne hnidiste vodniho ptactva na zapadnim Slovensku. [Ponds near Jakubov - important breeding ground of waterfowl in West Slovakia.] *Zbornik Slovenskeho narodneho muzea - prir. vedy* 14(1): 141-148.
- BALAT,F. 1977. Predbezny prehled zmen v avifaune dolniho Pomoravi v dusledku vodohospodarskych uprav. [Changes in avifauna of Pomoravi owing to water treatments.] *Zpravy Csl. zool. spol.* 10-12: 34-35.
- BARCAK,C. & CYPRICH,D. 1971. Prispevok k ornitofaune povodia Moravy (oblasti Devinske jazero). [Contribution to ornitofauna of the river Morava (area Devinske lake).] *Zpravy Csl. zool. spol.* 1-3: 37-39.
- BARTA,Z. 1973. Soucasny stav zvireny obratlovcu. [Present state of vertebrates.] *Priroda Mostecka. Severoc.* nakl. 1973: 106-119.
- BARTA,Z. 1974. Avifauna Flajské udloni prehrady a blizkeho okoli. [Avifauna of Flajská valley dam and nearby surroundings.] *Sbornik Okres. muzea v Moste* 1: 37-64.
- BARTA,Z. 1976. Lenesicky rybnik, pozoruhodna ornitologicka lokalita severozapadnych Cech. [Lenesicky pond, remarkable ornithological locality in North-West Bohemia.] *Sbornik severoces. muzea Liberec - prir. vedy* 8: 51-66.
- BARTA,Z. & EMINGER,J. 1967. Ptaci devastovanych ploch Mostecka. [Birds of devastated areas of Most region.] *Zpravy-studie RM Teplice* 3: 25-29.
- BEJCEK,V. & VASAK,P. 1979. Ornithologicky vyzkum velkolomu Chabarovice-Jih. [Ornithological research of the open-cast mine Chabarovice-South.] *Sbornik Prirodoved. vyzkumu tezebniho pole Chabarovice-Jih, Teplice* 1979: 431-458.
- BENES,L. 1981. Ptactvo Lasskeho Pobeskydi (okr. Frydek-Mistek). [Birds of Lasske Pobeskydi - district Frydek-Mistek.] *Zpravy MOS* 1981: 31-62.
- BENES,L., VIKTORA,L. & FOLTYN,F. 1982. Ptaci Kolinska. [Birds of Kolin region.] Kolin, 1982.
- BENIS,L. 1962. Hnidzeni cejky chocholate (*Vanellus vanellus* L.) v Lasske Pobeskydi. [The nesting of Lapwing in Lasske Pobeskydi.] *Zpravy MOS* 1962:45.
- BENIS,L. 1967. Z Frydecka - Mistecka. [Frydek-Mistek region.] *Myslivost* 1967:233.
- BINDER,P. 1980. Fauna okresu Komarno. [Fauna of Komarno district.] *Sprievodca XVI. TOP* 1980: 45-53.
- BOHAC,D. 1962. Ptactvo Choteborska. [Birds of Chotebor region.] *Acta Musei Reginaehradecensis* 4: 97-108.
- BOHAC,D. & BOHACOVA,A. 1966. Ptactvo statni prirodni reservace Novy rybnik u Sobeslavi. [Birds of state nature reserve of Novy pond near Sobeslav.] *Sbornik Jihoces. muzea v Ceskych Budejovicich - prir. vedy* 6: 18-31.
- BOHACIK,L. 1976. Hniezdenie kaluziaka cervenonoheho (*Tringa totanus* L.) v Turci. [The nesting of Redshank in Turiec.] *Kmetianum* 4: 263-269.
- BREJCHA,L. 1961. Hnidzeni kulika ricniho a prutah moudivlacku na uzemi Prahy. [The nesting of Little Ringed Plover and the passage of Penduline Tit in Prague region.] *Zpravy CSOS* 7: 35-36.
- BROZ,J. 1970. Prispevek k poznani avifauny Kozcinskeho rybnika u Pacejova. [A contribution to the knowledge of avifauna of Kozcin pond near Pacejov.] *Zpravy muzei zapadoceskeho kraje, Plzen* 10-11: 53-65.
- BRTEK,V., FERIANCOVA-MASAROVA,Z. & RUZICKA,M. 1969. Vtactvo juznej casti Malych Karpat. [Birds of south part of Male Karpaty.] *Biologicke prace* 15: 1-76.
- CEJCHAN,A. & LOHNISKY,K. 1961. Ornithologicke poznamky z Tresickeho rybnika. [Ornithological remarks from Tresicky pond.] *Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A* 2: 253-256.
- CERNY,J. & VONDRAČEK,J. 1982. Ptaci. [Birds.] *Priroda Ustecka* 1/81: 179-211.
- CHVAPIL,S. 1965. Hnidzeni pisily caponohe (*Himantopus himantopus*) v Polabi na Podripsku. [The nesting of Black-winged Stilt in Polabi near Podripsko.] *Sylvia* 17: 89-94.
- CHVAPIL,S. 1965. Hnidzeni pisily caponohe. [The nesting of Black-winged Stilt.] *Ziva* 13: 232-233.
- DANKO,S. 1975. Doplnok ku kvalitativenej charakteristike avifauny Chymianskych rybnikov (vodne a pri vode zijuace

- vtactvo). [Qualitative characterization of avifauna of Chymianske ponds (waterfowl).] *Zpravy CSOS* 16: 2-5.
- DAROLA,J. 1979. Nacrt avifauny Turcianskej kotliny. [Avifauna of Turcianska hollow.] *Kmetianum* 5: 199-258.
- DOLANSKY,L. 1979. Ornitologicky zajimave misto v Hradci Kralove a jeho osud. [Ornithologically interesting site in Hradec Kralove town and its fate,] *Prace a studie-priro., Pardubice* 11: 191-193.
- DUFFEK,K. & MRNA,L. 1963. Piestanska Slnava - novy azyl vodneho vtactva. [Water basin of Slnava near Piestany - the new asylum of waterfowl.] *Ochrana prirody* 18: 38-39.
- FABERA,V. 1968. Cejka chocholata (*Vanellus vanellus L.*) v okoli Broumovskych sten. [Lapwing in the surroundings of Broumovske steny.] *Zpravy MOS* 1968: 44-45.
- FERIANC,O. 1966. Rozbor doterajsih vyskumov a charakteristik faunu Zitneho ostrova (Podunajskej niziny) so zretelom na avifaunu. [Research and characterization of fauna of Zitny island (Podunajska lowlands).] *Biologia* 21: 438-452.
- FERIANC,O. 1967. Vtacie synuzie biotopov Blatskej niziny. [Avian synusia in biotopes of Blatska lowlands.] *Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae - zool.* 12: 193-249.
- FERIANC,O. 1968. Vtactvo Liptovskej kotliny. [Birds of Liptovska hollow.] *Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae - zool.* 14: 137-194.
- FERIANC,O. 1970. Vtactvo Liptovskej kotliny (medzi Liptovskym Mikulasom a Liptovskou Marou). [Birds of Liptovska hollow (between Liptovsky Mikulas and Liptovska Mara).] *Zbornik Liptov* 1970: 35-93.
- FERIANC,O. 1970. Migrujuce vtactvo na Podvihorlatskej vodnej nadrzi. Cast III. Ekologicke skupiny vtakov zijucych na brehoch a zarastoch vodnych rastlin. [Migratory birds on Podvihorlatska water basin. Part III.] *Zbornik Slovens. narodneho muzea - prir. vedy* 16: 169-178.
- FERIANC,O. 1977. Vtaky Slovenska, I. [Birds of Slovakia. I.] SAV, Bratislava, 684 pp.
- FERIANC,O. 1977. Vtacie synuzie biotopov oblasti Zemplinskej siravy. [Avian synusia in biotopes of the Zemplinska Sirava region.] *Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae - zool.* 22: 141-176.
- FERIANC,O. & FERIANCOVA-MASAROVA,Z. 1972. Vplyv vystavby priehrady pri Liptovskej Mare na vtactvo v Liptovskej kotlini. [The effect of the dam construction near Liptovska Mara on birds in Liptovska hollow.] *Pamiatky-pritra* 1972(2): 34-35.
- FERIANCOVA-MASAROVA,Z. 1962. Vyznam Oravskej priehrady pre tah a hniezdenie vodneho vtactva. [The importance of the Orava dam for migration and breeding of waterfowl.] *Biologia* 17: 340-354.
- FERIANCOVA-MASAROVA,Z. 1962. Doplinky k vyskumu vodnych vtakov Oravskej priehrady. [Supplement to research of waterfowl on Orava dam.] *Biologia* 17: 509-516.
- FERIANCOVA-MASAROVA,Z. 1968. Vtacie spolenstva zapadnej casti Liptova (transekt Choc - Chabenec). [Bird communities of the west part of Liptov (transect Choc - Chabenec).] *Biologickie prace* 14: 105-154.
- FERIANCOVA-MASAROVA,Z. 1978. Vtacie spolenstva Liptova (transekt Haj - Chopok). [Bird communities of Liptov (transect Haj - Chopok).] *Quaestiones Geobiologicae* 22: 5-58.
- FERIANCOVA-MASAROVA,Z. & FERIANC,O. 1972. Vplyv technickych zasahov pri vystavbe priehrady Liptovska Mara na ornitocenozy. [The effect of technical interference by construction of dam Liptovska Mara on birds.] *Biol. Bratislava* 27: 141-146.
- FERIANCOVA-MASAROVA,Z. & FERIANC,O. 1978. Vplyv vystavby priehrady Liptovska Mara na povodne ornitocenozy Liptovskej kotliny. [Influence of construction of dam Liptovska Mara on primary ornithocoenoses of Liptovska hollow.] *Quaestiones Geobiologicae* 22: 89-119.
- FERIANCOVA-MASAROVA,Z. & FERIANC,O. 1979. Dalsie poznatky zo sukcesie cisdlovania vtakov na novovybudovanej vodnej nadrzi Liptovska Mara r. 1978. [Further contributions to distribution of birds on the new dam Liptovska Mara in 1978.] *Biol. Bratislava* 34: 655-662.
- FERIANCOVA-MASAROVA,Z. & FERIANC,O. 1979. Postupne osidlovanie priehrady Liptovska Mara vodnym vtactvom a potreba ochrany zivocichov na priehrade. [Gradual habitation of the dam Liptovska Mara by waterfowl.] *Zbornik Liptov* 1979: 73-89.
- FIALA,V. 1960. Ptactvo Namestskej rybniku drive a nyni. [Past and present birds of Namest ponds.] *Vlastivedny sb. Vysociny* 4: 91-103.
- FIALA,V. 1961. Ornitologicky rok na Namestskej rybnicich. [Ornithological year on Namest ponds.] *Vlastivedny sb. Vysociny* 5: 165-194.
- FIALA,V. 1963. Hnidzeni ptactva na Namestskej rybnicich v roce 1962. [The nesting of birds on the Namest ponds in 1962.] *Zpravy MOS* 1963: 1-5.
- FIALA,V. 1963. Hnidzeni ptactva na Namestskej rybnicich v roce 1963. [The nesting of birds on the Namest ponds in 1963.] *Zpravy MOS* 1963: 75-80.
- FIALA,V. 1965. Hnidzeni ptactva na Namestskej rybnicich v roce 1964. [The nesting of birds on the Namest ponds in 1964.] *Zpravy MOS* 1965: 33-39.
- FIALA,V. 1965. Hnidzeni ptactva na Namestskej rybnicich v roce 1965. [The nesting of birds on the Namest ponds in 1965.] *Zpravy MOS* 1965: 68-74.
- FIALA,V. 1966. Rozsireni vodniho ptactva na Ceskomoravske vrchovine. [Distribution of waterfowl in Ceskomoravska highlands.] *Muzeum Vysociny Jihlava* 1966: 1-51.
- FIALA,V. 1966-1967. Hnidzeni ptactva na Namestskej rybnicich v roce 1966. [The nesting of birds on the Namest ponds in 1966.] *Zpravy MOS* 1966-67: 49-57.
- FIALA,V. 1970. Hnidzeni ptactva na Namestskej rybnicich v roce 1970. [The nesting of birds on the Namest ponds in 1970.] *Zpravy MOS* 1970: 60-66.
- FIALA,V. 1982. Die Bestande der Wasservogel in der CSR. *Acta Scient. Brno* 16(7): 1-49.
- GAHURA,V. 1979. K hnidzeni kolih velkych (*Numenius arquata L.*) v nive dolni Moravy. [On the nesting of Curlews near the river Morava.] *Zpravy MOS* 1979: 55-64.
- GAHURA,V. 1981. Pisik obecny. [Common Sandpiper.] *Ziva* 29:195.
- GAZDA,F. 1976. Hnidzeni sluky lesni na Vitkovsku. [The nesting of *Scolopax rusticola* near Vitkov.] *Myslivost* 1976:41.
- GINTER,F. 1964. Ptactvo statni prirodni rezervace Zebracky. [Birds of the state nature reserve Zebracky.] *Zpravy MOS* 1964: 50-80.
- GINTER,F. 1968. Prirodni rezervace Padelky. [Nature reserve of Padelky.] *Zpravy MOS* 1968: 1-15.
- HACHLER,E.M. 1961. Pisily caponohe (*Himantopus himantopus L.*) u nas a jejich vyskyt ve stredni Evrope. [Black-winged Stilts in our country and their occurrence in Central Europe.] *Zpravy MOS* 1961: 61-64.

- HAJEK,V. 1970. Jedenact let pozorovani bahnaku (Limicola) v rezervaci Lednické rybníky. [Eleven years of wader watching in the reserve Lednické ponds.] *Sylvia* 18: 55-61.
- HAJEK,V. 1979. Ornitologicky průvodce. *Lednické rybníky, naučná stezka.* [Ornithological guide. *Lednické ponds, instructive path.*] Brno.
- HAJEK,V. 1980. Ten years of Czechoslovak Wader Study Group. *Ring* 9: 104-105.
- HANZAK,J. 1961. Z rezervace Velký a Malý Tisy. [Reserve areas Velký and Malý Tisy.] *Myslivost* 1961: 8-9.
- HARANT,K. 1980. Ptaci Skutecská. (Doplnek a srovnani s prací RNDr. Milese). [Birds of Skutec region. Supplement and comparison with the work of dr. Miles.] *Sbornik Vychodoc. pobočky Cs. ornitol. spol. pri ZK ROH Tesla Pardubice* 1980: 18-30.
- HARVANCIK,S. 1980. Vodne a pri vode zijuje vtactvo v okoli Gbelov v rokoch 1973-1977. [Waterfowl near Gbely in 1973-1977.] *Spravy Slovenske zoologicke spolecnosti* 6: 51-57.
- HAVLIN,J. 1962. Hnízdení ptactva na rybnici Dubovec. [Birds nesting on the Dubovec pond.] *Zpravy MOS* 1962: 80-83.
- HAVLIN,J. 1967. Birds breeding on the Namestske rybníky ponds (Czechoslovakia). *Acta Sc. Nat., Brno* 1(11): 429-471.
- HEJL-MRACOVSKY,F. 1963. Z exkurze do Lednice. [Excursion to Lednice.] *Zpravy MOS* 1963: 55-56.
- HEYDER,R. 1961. Zur Permanenz des Brutens des Mornellregenpfeifers, *Eudromias morinellus* (L.) auf dem Riesengebirge. *Abhandlungen und Berichte Ntkdemus, Gorlitz* 37: 101-108.
- HLADÍK,B. 1972. Kvalitativní změny v ptactvu Polenska v posledních třiceti letech. [Qualitative changes in birds of Polna region during last thirty years.] *Vlastived. sb. Vysociny, odd. ved prir.* 7: 111-125.
- HLASEK,J. 1981. Ubyvání brehouse cernoočasého na Trebonsku. [The Black-tailed Godwit - a disappearing species in the area of Trebonsko - South Bohemian region.] *Pamatky a priroda* 6: 373-374.
- HLASEK,J. 1981. Koliha velká. [The Curlew.] *Pamatky a priroda* 6: 183-184.
- HOFMAN,K. 1965. Nekolik príspevkov k avifaune stredni Sumavy. [Contributions to avifauna of central Sumava.] *Zpravy muzei zapadoc. kraje, Plzen* 3: 32-47.
- HOFMAN,K. 1967. Poznamky o ptactvu tremsínskych Brd. [Remarks on birds of Brdy mountains.] *Zpravy muzei zapadoc. kraje, Plzen* 5: 8-17.
- HOFMAN,K. 1970. Dodatek k článku J. Broze o avifaune Kozcinskeho rybníka u Pacejova. [Supplement to the study of J. Broz about the avifauna of Kozcin pond near Pacejov.] *Zpravy muzei zapadoc. kraje, Plzen* 10-11: 69-71.
- HOFMAN,K. 1976. Avifauna sirsieho Plzenska. [Avifauna of Plzen region.] *Sbornik zapadoc. muzea v Plzni, prir.* 19: 1-154.
- HOLINEK,B. & STASTNY,K. 1969. Ptactvo Zabrezska. [Birds of the Zabreh region.] *Nakl. Severni Morava, Sumperk* 1969: 1-27.
- HOLUBEC,F. 1977. Ornitologické zajímavosti ze Semilská. [Ornithological remarks from Semily region.] *Prunella* 1977(1): 5-6.
- HOLUSA,J. 1978. Vodus rudonohy (*Tringa totanus* L.) na okrese Frydek-Mistek. [Redshank in Frydek-Mistek district.] *Zpravy MOS* 1978: 104-106.
- HORAK,V. 1981. Vyzkum ptactva na rybníku Venuse. (Príspevek k avifaune Mostecka.) [Investigation of birds at Venuse fishpond - district of Most.] *Fauna Bohemiae septentrionalis* 5-6: 57-62.
- HOUDÉK,J. 1966. Ptactvo chocenských vod. [Waterfowl of Chocen region.] *Listy Orlického Muzea* 3: 165-174.
- HUDEC,K. 1959. Stelzenlaufer-Invasion in der Tschechoslowakei. *Falke* 6: 54-56.
- HUDEC,K. 1972. Hnízdení slukovitých ptáků v Československu. [Nesting of waders in Czechoslovakia.] *TIS* 1972: 132-135.
- HUDEC,K. 1975. O dýticích *Burhinus oedicnemus* u nas. [Stone Curlew in Czechoslovakia.] *Ziva* 23: 193-194.
- HUDEC,K. & CERNÝ,W. (a spol.) 1977. Fauna CSSR. Ptaci II. [Fauna of Czechoslovakia. Birds II.] Academia Praha, Prague, 896 pp.
- HUDEC,K., KONDELKA,D. & NOVOTNÝ,I. 1966. Ptactvo Slezska. [Birds of Slezsko region.] *Opava* 1966: 1-364.
- HURKA,L. 1971. Koliha velká (*Numenius arquata* L.) na rybnících u Postrekova. [Curlew on the ponds near Postrekov.] *Zpravy muzei zapadoc. kraje, Plzen* 12: 21-22.
- HURKA,L. 1975. Faunistická pozorování v zapadních Čechách v roce 1975. [Faunistic observations in West Bohemia in 1975.] *Sborník zapadoc. muzea v Plzni, prir.* 12: 1-27.
- HURKA,L. 1976. Faunistická pozorování v zapadních Čechách. Aves. [Faunistic observations in West Bohemia. Aves.] *Sborník zapadoc. muzea v Plzni, prir.* 18: 6-35.
- HURKA,L. 1977. Faunistická pozorování v zapadních Čechách v roce 1976. [Faunistic observations in West Bohemia in 1976.] *Sborník zapadoc. muzea v Plzni, prir.* 20: 5-30.
- JANALIK,F. 1961. Avifauna Tresického rybníka. [Avifauna of Tresicky pond.] *Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A* 3(1-2): 171-206.
- JANALIK,F. 1962. Ptactvo Libianske baziny. [Birds of Libianska swamp.] *Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A* 4: 109-160.
- JINDRA,M. 1981. Príspevek k rozšíreniu a hnízdnej biologii kulika ríčného (*Charadrius dubius Scop.*) na Litomyslsku. [Contribution to the distribution and the nesting biology of Little Ringed Plover in Litomysl region.] *Sb. Vychodoc. Pobocky CSOS Pardubice* 3: 56-60.
- KALIVODOVÁ,E. & BRTEK,V. 1971. Vtactvo retencnej nadrze pri rezervácii Jurský Sur. [Birds of retention reservoir near reserve Jurský Sur.] *Ceskosl. ochrana prírody* 12: 179-191.
- KALIVODOVÁ,E. & BRTEK,V. 1977. Vtactvo severnej casti Malych Karpat. [Birds in north part of Male Karpaty.] *Biologicke prace* 23(2): 7-107.
- KALIVODOVÁ,E. & MACHAL,O. 1978. Vtaky Devinskéj Kobyle. [Birds of Devinska Kobyla.] *Acta ecologica* 7(17): 8-40.
- KANUSCAK,P. 1975. Avifauna sirsieho okolia Piestan. [Avifauna of Piestany surroundings.] *Biologicke prace* 21(4): 1-132.
- KINSKY,B.K. & HROBAR,F. 1970. Ptactvo na Kostelecku, Rychnovsku a Zambercecku. [Birds of Kostelec, Rychnov and Zamberk region.] *Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A* 11: 113-129.
- KLEJDUS,J. 1975. Vyskyt vzácných druhů ptactva na Znojemsku. [The occurrence of rare birds in Znojmo region.] *Ochrana prírody 28-pOp* 4: 14-15.
- KLEJDUS,J. 1980. Ptactvo Znojemska. [Birds of Znojmo region.] *Zpravy MOS* 1980: 7-83.
- KLOKNER,L. 1981. Statna prirodna rezervacia Cicovske mrtve rameno. [State nature reserve of Blind arm of Cicov.] *Komarno* 1981: 1-29.

- KOKES,O. 1963. Cejky na Podebradskych blatech. [Lapwings on marshes near Podebrady.] *Ziva* 11:71.
- KONDEKLA,D. 1968. Ptactvo vodnich nadrii Tesinska. [Birds of water basins of Tesin region.] *Tesinsko* 1968(2-3): 34-37.
- KONDELKA,D. 1979. Dytik uhorni (*Burhinus oedicnemus*) zjisten v hnidznim obdobii v Podbeskydske pahorkatine. [Stone Curlew discovered at Podbeskydska hilly country in breeding season.] *Casopis Slezskeho muzea Opava - A* 28(1):87.
- KONDELKA,D. 1980. Ornitologicka pozorovani v severomoravskem kraji v roce 1979. [Ornithological observations in North Moravia in 1979.] *Acrocephalus* 1980: 13-35.
- KONOPKA,J., POJKAR,M. & MEDEK,M. 1974. Ornitologickie poznamky z Turnovska. [Ornithological notes from the Turnov region.] *Zpravy CSOS* 13: 11-13.
- KOSTKAN,J. 1965. Hnidzeni dytika uhorniho (*Burhinus oedicnemus*) na Podripsku. [The nesting of Stone Curlew in Podrisko region.] *Sylvia* 17: 213-215.
- KOZA,V. & PLESNIK,V. 1980. Poznamky k vyskytu a hnidzeni kulika rincniho (*Charadrius dubius*) na Smiricku a Chrudimsku. [The remarks on the occurrence and nesting of Little Ringed Plover in Smirice and Chrudim region.] *Sbornik Vychodoc. poboicky Cs. ornitol. spol. pri ZKROH Tesla Pardubice, II* 1980: 14-16.
- KOZAK,V. 1960. Exkuse clenu MOS do rezervace "Chrbov" u Lobodice. [Excursion of the members of MOS in reserve "Chrbov" near Lobodice.] *Zpravy MOS* 1960: 35-36.
- KOZAK,V. 1962. Vyskyt ptactva v "Rybnicich" u Prerova od r. 1951 do r. 1959. [The occurrence of birds at "Rybniky" near Prerov in 1951-1959.] *Zpravy MOS* 1962: 17-30.
- KOZAK,V. 1963. Vyskyt nekterych druhu ptactva na Muranske vysocine. [The occurrence of some bird species in Muranska highlands.] *Zpravy MOS* 1963: 18-22.
- KOZAK,V. 1963. Exkurze na rybniky u Zahlinic. [Excursion to ponds near Zahlinice.] *Zpravy MOS* 1963: 30-31.
- KOZAK,V. 1971. Prirodni pomery a ptactvo statni prirodni rezervace "Zastudanci" u Tovacova. [Birds of state nature reserve Zastudanci near Tovacov.] *Ochrana fauny* 5(2-3): 103-105.
- KRATOCHVIL,V. 1972. Ptactvo statni prirodni rezervace Na hradech 1960-1970. [Birds of state nature reserve "Na hradech" in 1960-1970. Prace a studie-prir., Pardubice 4: 89-100.
- KROUTIL,K. 1968. Vysledky pozorovani sluk. [Results of Woodcock observations.] *Myslivost* 1968: 152-153.
- KUBAN,V. & DUFFEK,K. 1972. Vtactvo Slnavy. [Birds of the water basin of Slnava.] *Pamiatky-priroda* 1972(5): 41-44.
- KUCERA,L. 1970. Die Vogel des mittleren Bohmerwaldes (Sumava). *Orn. Mitt* 22: 223-242.
- KUCERA,L. 1972. Ptaci sumavskych Plani. [Birds of Plane in Sumava mountains.] *Zpravodaj CHKO Sumava* 1972(14): 19-29.
- KUCERA,L. 1973. Hnidzeni kolihy velke *Numenius arquata* na Klatovsku. [The nesting of Curlew in the Klatovy region.] *Ziva* 21:35.
- KUCERA,L. 1971. Ptaci stredni Sumavy. [Birds of the central Sumava.] *Sbornik zapadoc. muzea v Plzni, prir.* 5: 1-39.
- KUPCOVA,A. 1979. Avifauna akumulacnych nadrii a rybnikov lucenskej a rimavskej kotliny. [Avifauna of the storage reservoirs and ponds in Lucenska and Rimavska hollow.] *Stredne Slovensko, vlastived.* zv. 1: 198-222.
- KUPCOVA,A. 1980. Avifauna Jurskeho Suru. [Avifauna of Jursky Sur.] *Ochrana prirody* 1: 71-104.
- KUX,Z. 1963. Ptactvo zaplavovych oblasti a rybniku na jizni Morave. [Birds of inundate areas and ponds in South Moravia.] *Ochrana prirody* 18: 61-62.
- KUX,Z. & RANDIK,A. 1961. Prispevek k poznani ornitofauny jihoslovenskych bazin u Gbelcu, Calova a Gabcikova. [Contribution to the knowledge of ornitofauna of South Slovakia swamps.] *Casopis Moravskeho muzea Brno* 46: 203-234.
- LUSK,S. 1964. Ptaci hnizdici na Bosileckem rybniku. [Birds breeding on the Bosilecky pond.] *Sbornik Jihoces. muzea v Ceskych Budejovicich-prir.* vedy 4: 149-161.
- MACHACEK,P. 1982. Ptaci inundacni louky a baziny u Musova. [Birds of inundated meadow and wetland near Lusov.] *Pamatky a priroda* 7: 312-315.
- MAKATSCH,W. 1966. Ornithologische Beobachtungen in der Slowakei. *Zool. Abh. Dresden* 28: 239-271.
- MILES,P. 1975. Ptactvo Krkonos I, II. [Birds of the Krkonose mountains.] *Kandid. dis. prace, UVU CSAV Brno*, 340 pp.
- MALY,R. 1968. Pozorovani ptactva na Zabrezsku a Unicovsku od roku 1959 az do roku 1967. [Bird observations in Zabreh and Unicov region in 1959-1967.] *Zpravy MOS* 1968: 61-69.
- MARES,J. 1971. Avifauna rybnika "Utopeny" u Dnesic a jeho okoli. [Avifauna of the Utopeny pond near Dnesice.] *Sbornik Zapadoc. muzea v Plzni* 5: 18-39.
- MATOUSEK,B. 1961. Faunisticky prehled slovenskeho vtactva. Cast 1. [Faunistic summary of birds of Slovakia. Part 1.] *Sbornik Slovenskeho narodneho muzea, prir.* vedy 7: 3-109.
- MATOUSEK,B. 1968. Vplyv vybudovania rybnikov na zlozenie faunu okolia Trnavy. [The effect of the building of ponds on fauna structure of Trnava region.] *Zbornik Slovenskeho narodneho muzea, prir.* vedy 14(2): 119-150.
- MATOUSEK,F. 1968. Niekolko novsich poznatkov o avifaune Zitneho ostrova. [Some new knowledge about avifauna of Zitny island.] *Zbornik Slovenskeho narodneho muzea, prir.* vedy 14(2): 151-156.
- MATTAS,M. 1977. Avifauna arboreta Sofronka a jeho okoli. [The avifauna of the Sofronka Arboretum and its proximate environment.] *Zpravy muzei zapadoc. kraje, Plzen* 20: 53-65.
- MATTAS,M. 1981. Ptactvo udloni nadrzi v Klabave. [Birds of the damlake at Klabava.] *Zpravy Muz. Zapadoc. kraje - prir.*, Plzen 24: 75-84.
- MIHAL,I. 1976. Avifaunistickie poznatky z Tatranskeho narodneho parku. [Avifauna of Tatra national park.] *Zbornik prac o TANAP* 18: 80-118.
- MILES,P. 1967. Ptaci Skutecska. [Birds of the Skutec region.] *Acta Musei Reginae Hradecensis, ser. A* 8: 123-139.
- MILES,P. 1971. Fauna Krkonos 3. Ptaci vod a vlhkych stanovist. [Fauna of Krkonose mountains 3. Birds of water and damp sites.] *Krkonose* 4(3): 14-15.
- MILES,P. 1972. Fauna Krkonos 5. Ptaci montaniho stupne - cast II. [Fauna of Krkonose mountains 5. Birds of the mountainous area - part II.] *Krkonose* 5(1): 14-15.
- MILES,P. 1973. Z vysledku zoologickeho pruzkumu. [Results of zoological research.] *Krkonose* 6(5):17
- MILES,P. 1973. Sluka lesni v Krkonosich. [Woodcock in the Krkonose mountains.] *Myslivost* 1973: 114, 161.

- MILES,P. 1979. Ptaci Krkonoskeho narodniho parku. [Birds of the Krkonose national park.] Sprava KRNAP Vrchlabi, 1979.
- MOSANSKY,A. 1965. Brehar obycajny, *Limosa limosa* (L.), na vychodnom Slovensku. [Black-tailed Godwit in East Slovakia.] Zbornik Vychodosl. muzea v Kosiciach, ser. B 1965: 89-94.
- MOSANSKY,A. 1977. (First nesting of a Black-winged Stilt (*Himantopus himantopus* L. 1758) in Slovakia and notes on distributional changes of its population in Europe.) Biol. Bratislava 32: 881-892. In Czech with English summary.
- MOSANSKY,A. 1977. Avifauna vychodneho Slovenska a katalog ornitologickych zbierok Vychodoslovenskeho muzea, I. cast (Non - Passeriformes 1). [Avifauna of East Slovakia and the catalogue of ornithological collections of East Slovakia museum, I part.] Zbornik Vychodosl. muzea v Kosiciach, ser. AB 18: 63-142.
- MUSIL,O. 1972. K perspektive vodniho ptactva na jizni Morave. [On the perspective of the waterfowl in South Moravia.] Ochrana prirody 27: 30-34.
- MUTKOVIC,A. 1980. Prispevok k poznaniu hniezdicov bagrovisk medzi Hlohovcom a Piestanmi. [Contribution to the knowledge of the breeding birds of the excavated land between Hlohovec and Piestany.] Vlastived. a metodicky spravodaj okresu Trnava 1: 50-58.
- PALASTHY,J. 1963. Dalsie poznamky k avifaune mociarov v okoli Presova. [Further observations on the avifauna of swamps in the surroundings of Presov.] Zbornik Vychodoslovenskeho muzea v Kosiciach, ser. A 4: 93-97.
- PECINA,P. 1976. Prispevek k faune obratlovcu statni prirodni rezervace Kopec. [Contribution to the fauna of vertebrates of state nature reserve of Kopec.] Bohemia centralis 1976(5): 178-187.
- PECINA,P. & SEDLACEK,K. 1978. Poznamky k vertebratofaune Statni prirodni rezervace Zehunsky rybnik. [The remarks on fauna of vertebrates of state nature reserve of Zehunsky rybnik.] Ceskosl. ochrana prirody 18: 39-58.
- PECL,K. 1978. Vysledky inventarizacniho ornitologickeho pruzkumu Statni prirodni rezervace Rezabinec u Razic. [Results of the ornithological research of state nature reserve Rezabinec near Razice.] Sbornik ornit. praci z jiznick Cech 1978: 101-136.
- PECINKA,L. 1972. Letosni pozorovani (*Scolopax rusticola*). [This year's observations: *Scolopax rusticola*.] Myslivost 1972:211.
- PIKULA,J. & BEKLOVA,M. 1977. Ecological distribution of forest avifauna in the region of constructed energetic system Dukovany-Dalesice. Acta Sc. Nat. Brno 11(12): 1-52.
- PODHORSKY,V. & VANA,F. 1967. Ptaci rezervace Podhradzsky rybnik. [Birds of the reserve Podhradzsky pond.] Sbornik vlastivednych praci z Podblanicke 8: 28-31.
- PODHORSKY,V. & VANA,F. 1968. Poznamky k vyzkumu ptactva Podblanicke v letech 1963-1967. [Remarks to the research of birds of Podblanicke in 1963-1967.] Sbornik vlastivednych praci z Podblanicke 9: 46-50.
- PODIVINSKY,E. & HAVLIN,J. 1969. Hnidzeni brehouse cernoocaseho (*Limosa limosa*) v katastru obce Studenec. [The nesting of Black-tailed Godwit near Studenec.] Sbornik prirodoved. klubu pri Zapadomor. muzeu, Trebic 7: 33-34. POHLE,E. 1981. Ptactvo Slavkova. [Birds of Slavkov.] Zpravy MOS 1981: 7-29.
- POJKAR,M. 1972. Hnidzeni kulika ricniho na Turnovsku v r. 1971. [The nesting of Little Ringed Plover in the Turnov region in 1971.] Prace a studie-prir., Pardubice 4: 189-190.
- POJKAR,M. 1973. Prehled ornitofauny na Turnovsku. [Summary of birds of Turnov region.] Prace a studie-prir., Pardubice 5: 177-197.
- PROCHAZKA,F. & SKLENAR,J. 1970. Priroda Pardubicka. [Nature of Pardubice region.] Pardubice, 106 pp.
- PRIKRYL,V. 1961. Hnidzeni tenkozobce opacneho (*Recurvirostra avosetta* L.) na Nesytu u Lednice. [The nesting of Avocet on the Nesyt pond near Lednice.] Zpravy MOS 1961: 37-39.
- PRIKRYL,V. 1963. Tenkozobec opacny - vzacny hnizdivec v CSSR. [Avocet - rare breeding bird in Czechoslovakia.] Ochrana prirody 18:8.
- PRIKRYL,V. 1964. Hnidzeni tenkozobce opacneho (*Recurvirostra avosetta* L.) na rybnice Nesytu. [The nesting of Avocet on the Nesyt pond.] Ziva 12:78.
- PTACEK,M. 1979. Avifauna rybnika Labska (okres Pardubice) v letech 1971-1976. [Avifauna of the Labska pond in 1971-1976.] Prace a studie-prir., Pardubice 11: 133-148.
- PTACEK,M. 1981. Zajimavejsi ornitologicka pozorovani z okoli Rychor v roce 1980. [Interesting ornithological observations in the Rychory area - East Bohemia.] Prunella 7(1): 21-23.
- RANDIK,A. 1965. Ochrana fauny v Podunajskej nizine. [Fauna preservation in Podunajska lowlands.] Ochrana prirody 20: 151-154.
- RANDIK,A. 1966. Vzacne a chranene zivocichy Slovenska. Leziak obycajny - *Burhinus oedicnemus*. [Rare and preserve animals of Slovakia. Stone Curlew - *Burhinus oedicnemus*.] Krasa Slovenska 43:409.
- REJMAN,B., RYBAR,P. & URBANEK,L. 1982. Obratlovci statni prirodni rezervace Nedosinsky haj. [The vertebrates of the state nature reserve of Nedosinsky haj - East Bohemia.] Prace a studie - prir., Pardubice 13-14: 155-176.
- ROZINEK,K. & ROZINEK,R. 1979. Ornitologicka a herpetologicka pozorovani na sedimentacnich nadrzich Opatovicke elektrarny. [Ornithological and herpetological observations on the sedimentation basins of Opatovice power station.] Ziva 27: 29-30.
- RUMLER,Z. 1978. Informativni prehled o soucasnem vyskytu obratlovcu na Olomoucku (Vertebrata). [Summary of the present occurrence of vertebrates of the Olomouc region.] Zpravy Krajs. vlastived. ustavu Olomouc 191: 18-29.
- REPA,P. 1970. Poznamky k vyskytu bahnaku (Charadriiformes) na rybnicich Tachovska. [Remarks on the occurrence of waders (Charadriiformes) on the ponds of the Tachov region.] Zpravy muzei zapadoc. kraje Plzen 10-11: 33-42.
- REPA,P. 1979. Qualitative und quantitative Zusammensetzung der Wasservogelgesellschaften im staatlichen Naturschutzgebiet Anenske rybniky bei Marianske Lazne (Sudwestbohmen). Casopis Zapadoceskeho muzea v Plzni, - zool. 12: 1-30.
- REPA,P. 1979. Die Nistgesellschaften der Vogel im zerstreuten Grun in der Schutzone des Naturschutzgebiet "Anenske rybniky" bei Marianske Lazne (Marienbad). Vestnik CSZ 43: 208-219.
- SALAJ,J. 1974. Ekologicke rozsirenje vtakov v juznej casti Krupinskej vrchoviny. [Ecological distribution of birds in the south part of Krupinska highlands. Bratislava.

- SALAJ,J. 1979. Vtactvo Lucenskej kotliny. [Birds of Lucenska hollow.] Osveta Martin, 113 pp.
- SALAJ,J. 1980. Vtactvo Banskej Bystrice a jej okolia. [Birds of Banska Bystrica town and its surroundings.] Osveta Martin, 97 pp.
- SALASEK,V. 1960. K avifaune Duchcovska. [Fauna of birds from Duchcov.] Zpravy CSOS 5: 32-35.
- SEMRAJD,B. 1961. Ornithologicke zajimavosti z Dlouhe Vsi u Sachotina. [Ornithological remarks from Dlouha Ves near Sachotin.] Zpravy MOS 1961: 14-16.
- SEMRAJD,B. 1965. Ptactvo nove zalozenych rybniku v obci Termesivech u Havlickova Brodu. [Birds of the new ponds in Termosivy near Havlickuv Brod.] Zpravy MOS 1965: 44-47.
- SERVIT,V. 1978. Cervencovy tok sluk. [July flow of Woodcock.] Myslivost 1978:233.
- SKLENAR,J. 1977. Ptaci. [Birds.] Priroda Orlickych hor a Podorlicka 1977: 615-633.
- SKLENAR,J. 1982. Obratlovci Statni prirodni rezervace Bohdanecsky rybnik a rybnik Matka. [The vertebrates of the state nature reserve of Bohdanecsky and Matka ponds.] Acta Mus. Reginaehradecensis, ser. A 17: 217-260.
- SKRASEK,F. 1960. Prispevek k poznani ptactva na Uhereskobrodsku. [Contribution to the knowledge of birds in Uherky Brod region.] Sbornik Priroda jihovychodni Moravy 1: 237-244.
- SKRASEK,F. 1964. Ptactvo Frystatske prehrady. [Birds of Frystatska dam.] Zpravy MOS 1964: 29-30.
- SLAVIK,B. 1974. Z pruzkumu hnidzeni sluky lesni v oblasti Ceskomoravske vrchoviny. [Some thoughts on the nesting of *Scolopax rusticola* in the area of Ceskomoravska vrchovina.] Ochrana prirody 29-p0p 2: 7-8.
- STANCL,F. 1981. Ptactvo Lanskrounska. [Birds of Lanskroun region.] Acta Mus. Reginaehradecensis, ser. A 16: 223-268.
- STEJSKALOVA,Z. 1974. Obratlovci statni prirodni rezervace Roztocky haj - Tiche udoli. [Vertebrates of the state nature reserve Roztocky haj - Tiche udoli.] Ochrana prirody 29-p0p 5: 17-19.
- SUCHANEK,O. 1972. Prispevok k poznaniu avifauny Klinskej rezervacie. [Contribution to the knowledge of avifauna of Klinska reserve.] Pamiatky-priroda 1972(3):12.
- SUCHANEK,O. & SUCHANEK,Jr.O. 1971. Vodne vtactvo na rieke Orave. [Waterfowl on the river Orava.] Sbornik Oravskeho muzea 2: 208-218.
- SVOBODA,J. 1965. Problemy rezervace "Bohdanecky rybnik" a rybnik "Matka". [Problems of reserve Bohdanecky pond and pond Matka.] Ochrana prirody 20: 95-98.
- SVOBODA,J. 1970. Ptaci fauna rybnika Lodorant. [Avifauna of the Lodorant pond.] Prace a studie-prir., Pardubice 2: 216-217.
- SVOBODA,S. 1960. Prispevek k poznani ptactva Beskyd. [Contribution to the knowledge of birds in Beskydy mountains.] Sbornik Priroda jihovychodni Moravy 1: 211-236.
- SVOBODA,Z. 1974. Koliha velka - *Numenius arquata* L. na Domazlicku. [Curlew - *Numenius arquata* L. in the Domazlice region.] Ziva 22:74.
- SOR,F. 1964. Prispevok k poznani nekterych druhu ptactva, vyskytujicich se v prostoru Starho Mesta pod Snez. a Hanusovic. [Contribution to the knowledge of some bird species occurring in Staro Mesto p.s. and Hanusovice.] Zpravy MOS 1964: 27-29.
- STANCL,L. 1968. Ptactvo rybnika Soprec. [Birds of the Soprec pond.] Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A 9: 157-193.
- STANCL,L. 1973. Ptactvo statni prirodni rezervace "Bohdanecky rybnik a rybnik Matka". [Birds of the state nature reserve of the ponds Bohdanecky and Matka.] Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A 14: 129-164.
- STANCL,L. 1975. Poznamky k hnidzeni a pozorovani bahnu na Pardubicku v letech 1946-1974. [Remarks on the nesting and watching of waders in the Pardubice region in 1946-1974.] Zpravy MOS 1975: 63-69.
- STANCL,L. & STANCLOVA,H. 1974. Ptactvo rybniku v okoli Bukovky u Lazni Bohdanc. [Birds of ponds in the surrounding of Bukovka near health resort Bohdanc.] Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A 15: 127-168.
- STANCL,L. & STANCLOVA,H. 1977. Ptactvo rybnika Cerny Nadymac u Habriny Vlci a v jeho okoli (okres Pardubice). [Birds of Cerny Nadymac pond near Habrina Vlci.] Zpravy MOS 1977: 21-26.
- STANCL,L. & STANCLOVA,H. 1978. Strucny prehled ptactva zastizeneho na rybnicich u Bukovky (okr. Pardubice) a v nejblizsim okoli. [Summary of birds on ponds near Bukovka.] Zpravy MOS 1978: 39-47.
- STASTNY,K. 1974. Pravdepodobne hnidzeni vodouse kropenateho (*Tringa ochropus* L.) na Trebonsku. [Probable nesting of Green Sandpiper in the Trebon region.] Sbornik Jihoces. muzea v Ceskych Budejovicich - prir. vedy 14, suppl. 2: 89-90.
- STASTNY,K. & SOLC,J. 1974. Koliha velka - rozsiruje sva hnidiste v Cechach. [Curlew - increases its breeding grounds in Bohemia.] Ziva 22:75.
- STASTNY,K., SOLE,J. & ZEMAN,J. 1974. Hnidzeni kolihy velke (*Numenius arquata* L.) v jiznich Cechach. [The nesting of Curlew in the South Bohemia.] Sbornik Jihoces. muzea v Ceskych Budejovicich - prir. vedy 14, suppl. 2: 25-32.
- STOLLMANN,A. 1970. Faunisticky prehled vtactva (aves) okresu Zilina. [Faunistic summary of birds of Zilina region.] Vlastivedny zbornik Povazia 10: 179-200.
- STOLLMANN,A. 1972. Vtactvo prirodnej rezervacie "Cicovske mrtve rameno". [Birds of state nature reserve "blind arm of Cicov".] Ceskosl. ochrana prirody 13: 281-296.
- STOLLMANN,A. 1979. Ivachnovsky luh - navrhnutá Statna prirodna rezervacia. [Ivachnov meadow - projected state nature reserve.] Pamiatky-priroda 1979(1): 28-29.
- SUTERA,V. 1982. Poznamky k ptactvu Chabarovicka. [Remarks on birds of Charovice region.] Fauna Bohemiae septentrionalis 7: 57-62.
- TESAR,J. 1967. Ptactvo Tachovska. [Birds of the Tachov region.] Sbornik Priroda - zapadoc. muzeum v Plzni 1: 53-86.
- TICHY,H. 1978. Avifauna jihovychodni casti okoli Loun. [Avifauna of south-east part of Louny surroundings.] Zpravy MOS 1978: 49-67.
- TICHY,H. 1979. Avifauna jihovychodni casti okoli Loun. [Avifauna of the south-east part of Louny.] Sbornik severoces. muzea Liberec - prir. vedy 11: 165-184.
- TICHY,H. & PLETICHA,P. 1982. Ptactvo Lounska. [Birds of Louny region.] Zpravy MOS 1982: 65-125.
- TURCEK,F.J. 1964. Uber die Vogelwelt der Tschechoslowakei. Orn. Mitt. 16: 233-235.
- URBANEK,B. 1962. Poznamky k ptactvu Ceskolipska. [Remarks about birds in Ceska Lipa region.] Sbornik severoces. muzea Liberec - prir. vedy 2: 175-187.
- URBANEK,B. & KONOPKA,J. 1961. Ptaci statni prirodni rezervace "Anenske rybniky" u Marianskych Lazni. [Birds of the state nature reserve Anenske rybniky near Marianske Lazne.] Ochrana prirody 16: 132-139.
- URBANEK,L. & BARTL,J. 1980. Bahnaci (Charadriiformes) ve strednim Polabi.

- [Waders (Charadriiformes) in central Polabi.] *Prace a studie-prir.*, Pardubice 12: 123-132.
- VACKAR,J. 1963. Ptactvo v udoli ricky Bobravy u Strelic. [Birds in valley of river Bobrava near Strelice.] *Zpravy MOS* 1963: 5-13.
- VANA,F. 1962. Ornitologické poznamky o nekterých vzácnějších ptacích na Podblanicku. [Ornithological remarks on some rare birds of Podblanicko region.] *Sbornik vlastivednych prací z Podblanicka* 4: 46-48.
- VARGA,J. 1980. Zanik melcicko-ivanovské bariny. [Extinction of Melcicko-ivanovská swamp.] *Pamiatky-priroda* 1980(6):36.
- VASAK,P. & VANA,R. 1979. Tricet let statni prirodni rezervace Podhradzsky rybnik. [Thirty years of state nature reserve of Podhradzsky pond.] *Sbornik vlastivednych prací z Podblanicka* 20: 109-120.
- VESELY,J. 1982. Ptactvo oblasti klidu Valcha u Straze (okres Tachov). [Birds of the protected area of Valcha near Straz - district Tachov.] *Zpravy muz. Zapadočes. kraje, prir.*, Plzen 25: 93-97.
- VLCEK,M. 1977. Pruzkum obratlovci statni prirodni rezervace Slanisko na Mostecku. [Research of vertebrates of state nature reserve Slanisko near Most.] *Sbornik severoces. muzea Liberec - prir. vedy* 9: 46-66.
- VLCEK,M. 1980. Suchozemstvi obratlovci rezervace Tobiasuv vrch v Ceskem stredohori. [Overland vertebrates of reserve Tobias hill in Ceske stredohori.] *Ochrana prirody* 1: 247-261.
- VOLF,Z. 1978. Ornitologické zajimavosti z Orlickych hor. [Ornithological remarks from Orlické mountains.] *Prunella* 1978(1): 24-25.
- VONDRAČEK,J. 1975. Von der Vogelwelt des nordbohmischen Bezirkes. *Falke* 22: 227-229.
- VONDRAČEK,J. 1975. Vyskyt nekterych chráněných ptacích druhů na Ústecku. [Occurrence of some protected birds in Ústí region.] *Stipa, vlastivedne sesity* 2: 79-108.
- VONDRAČEK,J. 1978. Veränderungen in der Vogelwelt des Nordbohmischen Bezirkes. *Falke* 25: 386-389.
- VOSKAR,J. 1972. Statna prirodna rezervacia Senne v novych podmienkach. [State nature reserve of Senne under new conditions.] *Ochrana prirody* 27: 8-9.
- VOSKAR,J. 1978. Avifauna chránenej studijnej plochy Podvihorlatska nadrz - Zemplinska Sirava. [Fauna of birds of preservation area Podvihorlatska water basin - Zemplinska Sirava.] *Ceskoslovenska ochrana prirody. Vyskumne prace z ochrany prirody* 1: 177-248.
- VRANY,J. 1976. Ptactvo Kutnohorska. [Birds of Kutna Hora region.] *Zpravy MOS* 1976: 7-114.
- ZAJIC,J. 1980. Nektere ornitologické postrehy z okoli Jilemnice. [Some ornithological remarks from the surrounding of Jilemnice.] *Prunella* 1980(1):13.
- ZEMAN,J. 1965. Ornitologické zajimavosti z Benesovska. [Ornithological peculiarity from Benesov region.] *Sbornik vlastivednych prací z Podblanicka* 6: 61-63.
- ZEMAN,J. 1974. O nalezu hnizda kolihy velke - *Numenius arquata* L. v jiznich Cechach. [Nest finding of Curlew - in South Bohemia.] *Ziva* 22:74.
- ZEMAN,J. 1978. Vyber z jihoceskych ornitologickych poznamek za leta 1971-1975. [Some ornithological notes from South Bohemia in 1971-1975.] *Sbornik ornit. prací z jiznich Cech* 1978: 153-165.
- ZIMA,J. 1972. Avifaunistické pomery okoli Plane nad Luznicí. [Fauna of birds of the surroundings of Plana upon Luznice.] *Ochrana prirody* 27-p0p 1: 1-3.
- ZDAREK,P. 1970. Ornitologické poznamky z prehrady Rozkos u Ceske Skalice. [Ornithological notes from the dam Rozkos near Ceska Skalice.] *Acta Musei Reginaeae Radecensis*, ser. A11: 131-137.
- ZDAREK,P. 1979. Ornitologické expedice za vodním ptactvem na východním Slovensku. [Ornithological expeditions after water birds of East Slovakia.] *Pannonicum-I.*, Bratislava 1979: 100-106.

## 6.56. HUNGARY

compiled by Laszlo Molnar

**Titles of papers in Hungarian are translated in German or English, often according to the language of the summary.**

- ANNOK-SZABO,J. 1934. Kozepso sarszalonka. [Bekassina - Mohr-schnepfe.] *Aquila* 38/41: 356, 419.
- BAKY,M. 1910. A kozep sarszalonka ujabb feszkelese Magyarorszagban. [Ein neuer Brutplatz der Moorschneepfe in Ungarn.] *Aquila* 17:271.
- BANKOVICS,A. 1976. Ugartyuk (*Burhinus oedicnemus*) koltese Kistelek hataraban. [Stone Curlew breeding near Kistelek.] *Aquila* 83: 286-302, 302.
- BARBACSY,Z. 1976. [Common Sandpiper (*Tringa hypoleucos*) and Little Ringed Plover (*Charadrius dubius*) nesting at the Raba river.] *Aquila* 83:300.
- BARTHOS,G. 1959. Ugartyuk feszkelese Del-Zalaban. [Nesting of the Stone Curlew

- in the South-Zala.] *Aquila* 66: 275, 309.
- BERETZ,P. 1948. A szekicser hazai feszkelese. [Nisten der Brachschwalbe in Ungarn.] *Term tud. Kozl.* 3: 151-154.
- BERETZK,P. 1953. Über das Vorkommen der Brachschwalbe *Glareola pratincola* in Ungarn und einigen Nachbarländern. *Larus* 6-7: 192-205.
- BREUER,G. 1955. Gulipan a Balaton videken. [Avocet in the Balaton-territory.] *Aquila* 59-62: 383, 440.
- CSIBA,L. 1957. A billegeto canko magyarorszagi Feszkelese. [On the nesting of the Common Sandpiper in Hungary.] *Aquila* 63-64: 278-279, 338-339.
- ENDES,M. 1975. A gulipan: *Recurvirostra avosetta* megtelopedese a Tiszantulon. [Ansiedlung des Sabenschnablers senseits der Theiss.] *Puszta* 6:11.
- ERTL,G. 1907. *Totanus hypoleucus* L. feszkek a vasuti toltesen. [Nester von Flussuferlaufer auf dem Eisenbahndamme.]

- Aquila* 14: 323-324.
- FESTETICS,A. 1957. A kislime feszkelese Csepelen. [Nesting of the Little Ringed Plover on the Island of Csepel.] *Aquila* 63-64: 277, 337.
- FINTHA,I. 1977. A gulipan a Hortobagy. [Der Sabelschnabler auf dem Hortobagy.] *Term. Vil.* 109: 25-26.
- GRESCHIK,J. 1931. A nagy poling: *Numenius arquata* L. feszkelelo madar a Hansagban. [Der Grosse Brachvogel Brutvogel in der Hansag.] *Kocsag* 4: 100-104.
- GRESCHIK,J. 1934. Adat a tavi canko: *Tringa stagnatalis* Bechst feszkeleserol a Ferto. [Ein Gelege des Teichwasserlaufers vom Ferto-See.] *Kocsag* 7: 75, 80.
- GRUNACK,A. 1898. Der Teichwasserlaufer: *Totanus stagnatilis* Bechst, als Brutvogel der ungarischen Puszten. *Orn. Mber.* 6: 97-99.
- KEVE,A. 1981. (Common Sandpiper (*Tringa hypoleucus*) first clutches from the Danube valley.) *Aquila* 88:134.
- KOVACS,G. 1981. (Little Ringed Plover (*Charadrius dubius*) nesting on the Hortobagy.) *Aquila* 88:134.
- MATE,L. 1938. Gyurgyalag es Ugartyuk feszkelese Cson videken. [Nisten von Bienenfressern und des Triels in der Gegend von Cson.] *Aquila* 42-45: 675.
- MATE,L. 1938. A gulipan feszkelese Sarszentagotan. [Nisten von Sabelschnabla in Sarszentagota.] *Aquila* 42-45: 678, 700.
- MATE,L. 1951. A golyatocs feszkelese Szekesfehervar videken. [Black-winged Stilt (*Himantopus himantopus*) breeding near Szekesfehervar.] *Aquila* 55-58: 271-272.
- MATE,L. 1955. Adatok a nagypoling feszkeleshez. [Contributions to the nesting of the Curlew in Hungary.] *Aquila* 59-62: 381-382, 439.
- MODLINGER,P. 1978. [Occurrence and ecology of *Burhinus oedicnemus* in Hungary.] *Aquila* 85: 59-75.
- NAGY,L. 1934. Adalekok ritkabb madarsink ujabb elofordulasahoz. [Beitrage zum Vorkommen einiger seltener Vogelarten.] *Aquila* 38-41: 354-365, 427-428.
- OCSAI,A. 1981. [Stone Curlew *Burhinus oedicnemus*) nesting at Pely.] *Aquila* 88:134.
- PATKSI,I. 1934. A kislime feszkelese Budapesten Lagymanyoson. [Flussregenpfeifer Brut in Budapest, Lagymanyos.] *Aquila* 38-41: 351, 412.
- RADETZKY,D. 1922. A golyatocs es a gulipan feszkelelo tanyadin. [An den Nistplatten des Stelzenlaufers und des Sabelschnablers.] *A Termeszet* 17-18: 80-82.
- RADETZKY,D. 1922. *Gallinago gallinago* L. feszkelese Tarnokon. [Das Bruten von Bekassinen in Tarnok.] *Aquila* 29: 173, 194.
- RADETZKY,D. 1924. Tavicanko feszkelese Tarnokon. [Das Nisten von Teichwasserlaufer in Tarnok.] *Aquila* 30-31: 296, 319.
- RADETZKY,D. 1928. A nagy poling: *Numenius arquatus* L. feszkelese Magyarorszagon. [Das Bruten des Grossen Brachvogels in Ungarn.] *Kocsag* 1: 28-32.
- RADETZKY,D. 1929. A nagypoling: *Numenius arquatus* L. ujabb feszkelese Magyarorszagon. [Abermaliges Bruten des Grossen-Brachvogels in Ungarn.] *Kocsag* 2: 163-164.
- RADETZKY,D. 1931. A nagypoling: *Numenius arquatus* L. feszkelese Magyarorszagon. [Das Nisten des Grossen-Brachvogels in Ungarn.] *A termeszet* 27:40.
- RADETZKY,J. 1963. Adatok a Dunantul madarvilagahoz. [Ornithological data from Pannonia, West-Hungary.] *Aquila* 69-70:261.
- RADETZKY,J. 1975. Uj gulipan feszkelohely a Sarret mellett. [Ein neuer Brutplatz der Sabelschnabler bei Sarret.] *Buvar* 30: 275-276.
- RADETZKY,J. 1977. Gulipan: *Recurvirostra avosetta* L. feszkelese a Feher megyei Sarreten. [Avocet breeding on the Sarret in Co. Feher.] *Aquila* 83: 285-301.
- ROBILLER,F., BORRMANN,K. & MOLNAR,L. 1978. Zur Bestandsentwicklung einiger Limikolen am Natronsee "Budoszek-to" in der ungarischen Pussta. *Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierde Dresden* 7: 285-290.
- SCHENK,J. 1934. A tavi canko: *Tringa stagnatalis* Bechst. feszkelese a Ferto mellett. [Das Bruten der Teichwasserlaufer am Fertosee.] *Aquila* 38-41: 350-351, 411-412.
- SIKO,S. 1930. A nagy poling: *Numenius arquatus* L. feszkelese a Hansagban. [Das Nisten des Grossen Brachvogels in der Hansag.] *Aquila* 36-37: 305-306, 336.
- SOMFAI,E. & SZIJJ,J. 1955. Nehany erdekesebb feszkelesi adat az Ocsai-turjanbol. [Some interesting notes on breeding birds in the marshland near Ocsa.] *Aquila* 51-52: 412-413, 461.
- SOVAGO,M. 1943. *Glareola pratincola* L.: szekicser. [Brachschwalben in Hajduboszormeny.] *Aquila* 50: 407, 416.
- SOVAGO,M. 1963. Elofordulasi es feszkelesi adatok a Tiszantulrol. [Ornithological data from East-Hungary.] *Aquila* 69-70: 268; 71-72: 179-186.
- STERBETZ,I. 1959. Mornellregenpfeifer in Ungarn. *Allattani Kozlemenek* 47: 143-147.
- STERBETZ,I. 1965. Das Vorkommen der Teichwasserlaufer *Tringa stagnatalis* Bechst. im Karpathenbecken. *J. Orn.* 106: 324-332.
- STERBETZ,I. 1974. Die Brachschwalbe, *Glareola pratincola* L. Neue Brehm Bucherei Band 462, Ziemsen Verlag, Wittenberg-Lutherstadt. 111 pp.
- STERBETZ,I. 1982. The status of Woodcock in Hungary. *IWRB Woodcock & Snipe Res. Group Newslet.* 8: 10-12.
- STUDINKA,L. 1933. A nagypoling: *Numenius arquatus* L. a Hansagban. [Der grosser Brachvogel im Hansag.] *A Termeszet* 29: 33-35.
- STUDINKA,L. 1957. Faunisztikai megfigyelesek a Hansagbol. [Faunistical information from the Hansag.] *Aquila* 63-64: 312-313, 359-360.
- SZABO,L. 1972. A pajzsoscanko: *Philomachus pugnax* L. feszkelese a Csakvari-reten. [Das Bruten des Kampflaufers auf der Wiese von Csakvar.] *Allatt. Kozl.* 58: 174-175.
- SZABO,L.V. 1974/1975. Nesting of the Black-winged Pratincole (*Glareola nordmanni*) in Hortobagy. *Aquila* 80-81: 55-72.
- SZOMBATH,L. 1943. Fattyu szerko es tavi canko feszkelese. [Bruten der Weißbartigen-Seeschwalbe und des Teichwasserlaufers.] *Aquila* 50: 409, 418.
- SZOMBATH,L. 1943. Nagypoling feszkelese Pest megyeben. [Das Bruten des Grossen-Brachvogels im Komitate Pest.] *Aquila* 50: 409-410, 417-418.
- TARJAN,T. 1934. Szekicser: *Glareola pratincola* L. [Die Brachschwalbe.] *Aquila* 38-41: 358, 421.
- TERNYAK,J. 1957. A gulipan koltese a kiskunhalasi Feherton. [Breeding of the Avocet on the Feherto-lake near Kiskunhalas.] *Aquila* 63-64: 278, 338.
- VASVARI,M. 1932. A nagy poling hazai feszkelese. [Das Nisten des grossen Brachvogels in Ungarn.] *Az Erdö* 6: 97-98.

## 6.57. AUSTRIA

compiled by Bernhard Kohler and Georg Rauer

- ARNOLD,C. 1980. Die Vogelwelt des Wallerseegebietes mit besonderer Berücksichtigung der Naturschutzgebiete. Hausarbeit aus Biologie und Erdwissenschaften an der Paris Lodron Universität Salzburg.
- ARNOLD,C. 1985. Die Vogelwelt des Hochwasserrückhaltebeckens im Gebiet der ehemaligen Enzersberger Riedwiesen, Gemeinde Thalgau. *Vogelk. Ber. Inf. Salzburg* 101: 2-10.
- ARNOLD,C. 1985. Erst-Brutnachweis der Uferschnepfe (*Limosa limosa*) am Wallersee, Salzburger Flachgau (505 m NN, N 47° 53' / E 13° 08'). *Vogelk. Ber. Inf. Salzburg* 102: 2-4.
- BAUER,K. 1955. Die Brutvorkommen des Grossen Brachvogels in Österreich. *Vogelk. Nachr. Osterr.* 5: 1-5.
- BAUER,K. 1955. Zur Ornis der Parndorfer Heide (Burgenland). *Vogelring* 24: 1-16.
- BAUER,K., FREUNDL,H. & LUGITSCH,R. 1955. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt des Neusiedlerseegebietes. *Wiss. Arb. Burgenland* 7.
- BLUM,V. 1977. Die Vogel des Vorarlberger Rheindeltas. *Orn. Arbeitag. Konstanz.*
- DVORAK,M. & GRULL,A. 1983. Avifaunistischer Bericht für das Neusiedlersee-Gebiet - Brutzeit 1982. Bericht des Biol. Forschungsinstitutes für Burgenland No. 48.
- DVORAK,M. & GRULL,A. 1984. Brutbestände gefährdeter oder ökologisch wichtiger Vogelarten im Neusiedlerseegebiet 1983. Bericht des Biol. Ferschungsinstitutes für Bergenland No. 50.
- DVORAK,M. & KOHLER,B. 1986. Brutbestände gefährdeter oder ökologisch wichtiger Vogelarten im Neusiedlerseegebiet 1984. Bericht des Biol. Forschungsinstitutes für Burgenland.
- ERLINGER,G. 1982. Erstbrut-Nachweise von Rohrweihe, Uferschnepfe und Kolbenente für Oberösterreich im Bereich des unteren Inns. *Oko. L.* 4(4): 14-18.
- FESTETICS,A. & LEISLER,B. 1970. Ökologische Probleme der Vogel des Neusiedlerseegebietes, besonders des World-Wildlife-Fund-Rserves Seewinkel. III. Teil. *Wiss. Arb. Burgenland* 44: 301-386.
- GAUCKLER,A. 1955. Ein neuer Brutnachweis des Kampflaufers (*Philomachus pugnax*) im Seewinkel. *Vogelk. Nachr. Osterr.* 6:11.
- GRULL,A. 1982. Avifaunistischer Bericht - Brutzeit 1981. Bericht des Biol. Forschungsinstitutes für Burgenland.
- GRULL,A. 1982. Ein neuer Brutnachweis und die früheren Vorkommen des Stelzenläufers (*Himantopus himantopus*) im Neusiedlerseegebiet. *Egretta* 25(1): 13-16.
- HABLE,E. 1973. Der Mornellregenpfeifer (*Eudromias morinellus*) in Kärnten. *Carinthia II* 163(8): 603-608.
- HABLE,E. 1978. Der Mornellregenpfeifer in den Niederen Tauern. *Alpenvereinsjahrbuch* 1978: 15-18.
- HABLE,E. 1980. Beringungsergebnisse an der alpinen Population des Mornellregenpfeifers, *Eudromias morinellus* (L.). *Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum* 9(2): 81-85.
- JAKOBY,H., KNOTSCH,G. & SCHUSTER,S. 1970. Die Vogel des Bodenseegebietes. *Orn. Beob. (Beiband)* 67: 1-260.
- LANDMANN,A. 1978. Die Brutvorkommen von Limikolen (Chardrii) in Nordtirol. *Egretta* 21(2): 33-60.
- LANDMANN,A., CZIKELI,H. & SCHWAIGER,M. 1978. Bemerkenswerte Brutzeitfeststellungen im Hochfilzener Moor, Salzburg. *Vogelk. Ber. Inf. Salzburg* 75.
- LANDMANN,A. & NEUNER,W. 1981. Ein weiterer Brutplatz des Keibitz (*Vanellus vanellus*) in Nordtirol (Österreich) (Aves, Charadriidae). *Ber. Naturweiss.-med. Ver. Innsbruck* 68: 169-172.
- MAYER,G. & WOTZEL,F. 1967. Vorkommen und Bestand des Grossen Brachvogels (*Numenius arquata*) in Oberösterreich und Salzburg im Jahr 1966. *Monticola* 1: 49-60.
- ORN. ARBEITSGEM. BODENSEE 1983. Die Vogel des Bodenseegebietes. DBV - LV Baden-Württemberg.
- REICHHOLF,J. 1972. Die Bedeutung der Stauseen am unteren Inn für den Wasservogelbestands Österreichs. *Egretta* 15: 21-27.
- TRIEBL,R. 1983. Über den Seeregenpfeifer (*Charadrius alexandrinus*) im Seewinkel, Burgenland/Osterreich. *Seevogel* 4: 39-41.
- WOTZEL,F. 1961. Die Bestände des Grossen Brachvogels und des Kiebitz im Salzburger Flachgau und seinen oberösterreichischen Grenzgebieten. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 42-54.
- WOTZEL,F. 1963. Neue Mitteilungen über das Auftreten des Grossen Brachvogels und des Kiebitz im Lande Salzburg und im westlichen Oberösterreich. *Mitt. Naturwiss. Arbeitsgem. am Haus der Natur Salzburg, Untergruppe Ornithologie* 1: 1-10.
- WOTZEL,F. 1966. Ergebnisse der Begehung sämtlicher Limikolen-brutbiotope bekannter Moor- und Verlandungsgebiete des Salzburger Flachgaues vom 02.04. - 24.04.1966. *Vogelk. Ber. Inf. Salzburg* 24.
- WOTZEL,F. 1966. Schlussbericht über die in der Brutperiode 1966 im Salzburger Flachgau durchgeföhrten Limicolenzählungen. *Vogelk. Ber. Inf. Salzburg* 25.
- WOTZEL,F. 1968. Über die Verbreitung und Bestände der Bekassine und des Rotschenkels im Lande Salzburg. *Vogelk. Ber. Inf. Salzburg* 30: 1-26.
- WOTZEL,F. 1968. Kurzbericht über die Begehung der Limicolenbrutbiotope des Salzburger Flachgaues in der Zeit zwischen 24.03. und 08.06.1968 (mit Einschluss des oberösterreichischen Grenzgebietes am Grabensee). *Vogelk. Ber. Inf. Salzburg* 32.
- WOTZEL,F. 1970. Beobachtungsdaten aus den Limicolenbrutgebieten des Salzburger Flachgaues vom Frühjahrszug und den Brutperioden der Jahre 1969 und 1970. *Vogelk. Ber. Inf. Salzburg* 39.
- WOTZEL,F. 1973. Einige Befunde aus Limicolenbrutgebieten des Salzburger Flachgaues aus der ersten Jahreshälfte 1973. *Ber. aus dem Haus der Natur Salzburg* 5.
- WOTZEL,F. 1974. Beobachtungsdaten und Befunde aus Limicolen-Brutbiotopen des Salzburger Flachgaues in der ersten Hälfte des Jahres 1974. *Ber. aus dem Haus der Natur Salzburg* 6.
- WOTZEL,F. 1984. Der Kiebitz (*Vanellus vanellus*) im Lande Salzburg. *Vogelk. Ber. Inf. Salzburg* 95: 1-19.

- WOTZEL,F. 1984. Der Grosse Brachvogel (*Numenius arquata*) im Lande Salzburg. *Vogelk. Ber. Inf. Salzburg* 98: 1-17.
- WOTZEL,F. 1986. Die Bekassine (*Gallinago gallinago*) im Lande Salzburg. *Vogelk. Ber. Inf. Salzburg* 103: 1-14.

- WRUSS,W. 1969. Der Kiebitz im Karnten. *Carinthia II* 79(159): 150-153.

## 6.58. SWITZERLAND

- BEAUD,P. & BEAUD,E. 1979. (Common Sandpiper *Actitis hypoleucos*, regular nester in the Sarine (Switzerland).) *Nos Oiseau* 35: 64-70. In French with English summary.
- BURNIER,J. 1965. Le Pluvier guignard *Eudromias morinellus* a niche en Suisse. *Nos Oiseau* 28: 110-112.
- FOKKEMA,J. 1978. Kieviten in Zwitzerland. [Lapwings in Switzerland.] *Vanellus* 31: 16-20. In Dutch.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM,U.N. 1959. Verbreitung und Häufigkeit des Kiebitz *Vanellus vanellus* (L.) in der Schweiz von den Zeit der Meliorationen nach 1848 bis heute. *Orn. Beob.* 56: 178-205.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM,U.N. 1962. Die Brutvogel der Schweiz. Aarau.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM,U.N. 1963. Der limikolzug durch die Schweiz. *Orn. Beob.* 60: 81-106.
- GRUNDBACHER,B. & BIBER,O. 1976. Beobachtungsorte des Monellregenpfeifers in der Schweiz (1927-1974) mit besonderer Erwähnung der Raststation Chasseral (Berner Jura). *Orn. Beob.* 73: 93-96.
- IMBODEN,C. 1971. Bestand, Verbreitung und Biotop des Kiebitz *Vanellus vanellus* in der Schweiz. *Orn. Beob.* 68: 37-53.
- JUON,M. 1968. Kiebitzbrut im Domleschg. *Orn. Beob.* 65: 188-189.
- KEMPF,C. 1976. *Oiseaux d'Alsace*. Strasbourg.
- KLOPFENSTEIN,A. & REISS,T. 1979. Brutverbreitung des Flussregenpfeifers im Raum Basel. *Orn. Beob.* 76: 45-46.
- LEUZINGER,H. 1976. Inventar der Schweizer Wasservogelgetiebe von internationaler und nationaler Bedeutung. *Orn. Beob.* 73-147-194.
- MULLER,W. 1975. Brutbestandsaufnahme des Flussregenpfeifers *Tringa hypoleucus* am unteren Hinterheim. *Orn. Beob.* 72: 44-52.
- MULLER,W., ROTH,P., SCHEISS,H. & WEBER,A. 1976/77. *Ornithologisches Inventar des Kantons Zurich 1975 (mit Nachtrag 1976)*. Report Zuricher Kantonalverb Vogelschutz.
- NIEDERFRINIGER,O. 1980. Neuer Brutplatz des Mornellregenpfeifers *Eudromias morinellus* in den Alpen. *Monticola* 4: 116-119.
- SCHIFFERLI,A. GEROUDET,P. & WINKLER,R. (eds.) 1980. *Verbreitungsatlas der Brutvogel der Schweiz*. Schweizerische Vogelwarte, Gempach.
- SCHINZ,J., MULLER,W. & BUHLMANN,J. 1977. Die Vogelwelt des Neeracher Rieds und seiner Umgebung. *Vjsdr. Natf. Ges. Zurich* 122: 413-419.
- WINKLER,R. 1982. Zur Bestandesentwicklung des Grossen Brachvogels in der Schweiz. *Beih. Veroff. Naturschutz Landschaftspfl. Bad.-Wurtt.* 25(1982): 83-86.
- ZINNENLAUF,B. 1966. Flussregenpfeifer-Brut in einer Kiesgrube im zürcherischen Limmattal. *Orn. Beob.* 63: 227.

## 6.59. WEST GERMANY

compiled by Hermann Hotker

- ANONYMOUS. 1976. Die in Rheinland-Pfalz gefährdeten Vogelarten ("Rote liste", Stand 31.12.1975). *Beitr. Landespfl. Rhld. Pfalz* 4: 123-128.
- ARNOLD,R. 1976. *Die Vogelwelt des Sussenlohes Weihegebietes*. Vogelbiotope Bayerns - Dokumentation No. 13.
- BAIRLEIN,F. 1976. Zur Vogelwelt des unteren Lechtales. *Ber. Naturw. Ver. Schwaben* 80: 2-31.
- BARZEMEYER,W. & TAUX,K. 1978. Siedlungsdicht untersuchung des Vogel des Rothenmooses bei Oldenburg i.O., Brutperioden 1976 und 1977. *Beitr. Natur. Niedersachs.* 31: 44-50.
- BARNICKEL,W., BECK,P., FRANZ,D., KORTNER,W., LEICHT,V., THEISS,N., TROMMER,G. & AUMANN,G. 1976-1978. Die Vogelwelt des Coburger Landes. *Jb. Coburger Landsstiftung* 21: 169-218, 22: 281-340, 23: 165-230.
- BAUER,W. & KEIL,W. 1966. Das Brutvorkommen 1966 von Kiebitz, Grossen Brachvogel, Bekassine und Uferschnepfe in Hessen. *Luscinia* 39: 75-84.
- BAUER,W. & KEIL,W. 1968. "Nachlese" zur Brutverbreitung des Kiebitz in Hessen. *Luscinia* 40:115.
- BAUER,W. & KEIL,W. 1969. 2. Nachtrag zur Brutverbreitung des Kiebitz in Hessen. *Luscinia* 40: 250-252.
- BAUER,W. & KEIL,W. 1971. Schutz der letzten Brutplätze des Grossen Brachvogels (*Numenius arquata*) in Hessen. *Luscinia* 41: 143-147.
- BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ. 1976. *Rote liste bedrohter Tiere in Bayern*. Schriftenreihe Naturschutz und Landschaftspflege 7, 39 pp.
- BAUER,J., FISCHER,A., MUHLBAUER,H. & ZACH,P. 1976. *Das Rotelseeweihsgebiet und Regenwiesen zwischen Micheldorf und Posing*. Vogelbiotope Bayerns, Dokumentation No. 10.
- BAUER,W. & FIEDLER,K. 1980. Bericht über die hessischen Naturschutzgebiete mit ornithologischern Schwerpunkt für das Jahr 1977. *Vogel und Umwelt* 1: 15-27.
- BECKER,P. & GALLAND,B. 1973. Schwarzfluglige Brachschwalbe (*Glareola nordmanni*) in Sudniedersachsen. *Vogelk. Niedersachs.* 5:27.
- BECKER,P. & KOLIBAY,F.J. 1976. Erster Brutnachweis der Schwarzflugel - Brachschwalbe (*Glareola nordmanni Fischer*) für Deutschland. *Beitr. Natur. Niedersachs.* 29: 13-18.
- BECKER,P.H. & ERDELEN,M. 1980. Brutbestand von Küsten- und Seevögeln in Gebieten des deutschen Nordseeraums 1979 und Bestandsveränderungen in den 70er Jahren. *Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz* 20: 63-69.

- BECKER, P.H., et al. 1981. Bevorzugte Nahrungs-, Rast- und Brutgebiete von Watvögeln (*Limicolae*) und Graureihern (*Ardea cinerea*) im Raum Wilhelmshaven. *Vogelk. Ber. Niedersachs.* 13: 1-9.
- BECKMANN, K.O. 1964. *Die Vogelwelt Schleswig-Holsteins.* Wachholzverlag, Neumünster.
- BEDNAREK-GOSSLING, A. 1972. Untersuchungen zur Siedlungsdichte der Brutvogel im Versmolder Buier, Kr. Halle/Westfalen. *Abh. Landesmus. Natur. Münster* 34(4): 61-70.
- BEHMANN, H. 1975. Die Brutsaison 1974 im NSG Botsland. *DBV - Mitt. Landesverb. Schleswig-Holstein* 1/75: 10-13.
- BEHRENS, H. 1975. Zur Brutverbreitung der Limikolen in Hessen 1974 und 1975. *Luscinia* 42: 191-198.
- BEHRENS, H. 1980. Die Brutvorkommen der Limikolen in Hessen 1977 und 1978. *Vogel und Umwelt* 1: 78-84.
- BENTZIEN, D. 1979. Bemerkungen zum Vorkommen des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius*) auf Kulturlandflächen nordwestlich von Hamburg. *Hamb. avifaun. Beitr.* 16: 166-168.
- BERG-SCHLOSSER, G. 1968. *Die Vogel Hessens. Ergänzungsband.* Frankfurt am Main.
- BERG-SCHLOSSER, G. 1975. "Okologie und Siedlungsdichte der Brutvogel des Schwarzen Moores in der Rhön (Brutperiode 1971-1973). *Anz. orn. Ges. Bayern* 14: 273-295.
- BERG-SCHLOSSER, G. & HEIDER, E. 1972. Quantitative Bestandsaufnahme der Brutvogel des Roten Moores in des Rhon (Brutperiode 1970 und 1971). *Luscinia* 41: 233-241.
- BERNDT, R. 1973. Status und Situation der mitteleuropäischen Population des Südlichen Goldregenpfeifers, *Pluvialis apricaria apricaria*. *Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz* 13: 91-92.
- BERNDT, R., FRANTZEN, M. & RINGLEBEN, H. 1974. Die in Niedersachsen gefährdeten Vogelarten ("Rote Liste", Stand 1.1.1974). *Vogelk. Ber. Niedersachsen* 6: 1-8.
- BERNDT, R.K. 1970. Zum Verkommen des Waldwasserläufers, *Tringa ochropus*, in Schleswig-Holstein und Hamburg. *Corax* 3: 81-96.
- BERNDT, R.K. 1970. Zum Limikolen - Brutbestand im Bereich der Ostküste Schleswig-Holstein. *Corax* 3: 137-149.
- BERTHOLD, P., ERTEL, R. & HOLZINGER, J. 1974. Die in Baden-Württemberg gefährdeten Vogelarten ("Rote Liste"). *Anz. orn. Ges. Bayern* 13: 87-94.
- BESER, H.J. 1967/68. Das für Brandgans und Austernfischer südlichste Brutvorkommen Deutschlands am Rhein zwischen Krefeld und Düsseldorf. *Niederheinisches Jahrb.* 10: 104-108.
- BESER, H.J. 1970. Aus der Vogelwelt des Lanker Raumes. *Heimatbuch d. Kreises Kempen - Krefeld* 1971: 39-52.
- BETTELS, M. & BETTELS, M. 1974. Luhesand 1973. *Vogel und Heimat.*, Sonderheft 2/74: 23-29.
- BETTMANN, H. 1959. Zum Rückgang der Waldschnepfe. *Z. Jagdwiss* 4: 41-43.
- BETTMANN, H. 1975. *Die Waldschnepfe.* München.
- BEYER, H. 1971. Schutzgebiet Luhesand 1970. *Vogel und Heimat.* 20: 1-4.
- BEZZEL, E. 1970. Sammelbericht zur Brutverbreitung einiger Vogelarten in Südbayern. *Anz. Orn. ges. Bayern* 9: 226-234.
- BEZZEL, E. 1971. Grabe Analyse der Verbreitung einiger Brutvogel in den Bayerischen Alpen und ihrem Vorland. *Anz. orn. Ges. Bayern* 10: 7-37.
- BEZZEL, E. 1976. Die Brutvogel des Erdinger Moores. *Garmischer Vogelkdl. Ber.* 1: 1-21.
- BEZZEL, E., KRAUSS, W. & VIDAL, A. 1970. Der Kiebitz (*Vanellus vanellus*) als Brutvogel in Bayern. *Auz. orn. Ges. Bayern* 9: 27-46.
- BEZZEL, E. & LECHNER, F. 1976. *Die Vogelwelt des Murnauer Moores. Vogelbiotope Bayerns.* Dokumentation No. 7.
- BEZZEL, E. & LECHNER, F. 1978. *Die Vogel des Werdenfelser Landes.* Kilda, Greven.
- BEZZEL, E., LECHNER, F. & RAMFTL, H. 1980. *Arbeitsatlas der Brutvogel Bayerns.* Kilda, Greven.
- BEZZEL, E. & RAMFTL, H. 1973. Die bayerischen Alpen und ihr Vorland als Ruchzugsgebiet bedrohter Vogelarten. *Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz* 13.
- BICK, U. 1977. Die Brutvogel des Gebietes Roetgen - Monschau - Nideggen 1971-1975. *Decheniana* 130: 61-76.
- BIOLOGISCHE STATION RIESENFELDER MÜNSTER. 1978. Erfolge des Biotopt-Managements im Europareservat "Rieselfelder Munster". *Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz* 18: 59-68.
- BIOLOGISCHE STATION RIESENFELDER MÜNSTER. 1980. Neuere Entwicklungen im Europareservat "Rieselfelder Munster". *Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz* 20: 71-78.
- BIOLOGISCHE STATION RIESENFELDER MÜNSTER. 1981. Rapider Bestandsrückgang des Kiebitzes (*Vanellus vanellus*). *Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz* 21: 31-34.
- BLANA, H. 1974. Avifauna des südlichen Bergischen Landes. Staals examens arbeit, Unpublished thesis.
- BLASZYK, P. 1953. Zum Bruten des Austernfischers im Binnenland. *Vogelwelt* 74: 41-45.
- BLASZYK, P. 1975. *Naturschutzgebiete im Oldenburgerland.* Oldenburg.
- BOCKER, H.U. 1955. Kampfläufer (*Philomachus pugnax* L.) wider Brutvogel im Zwillbrocher Venn. *Natur und Heimat* 15: 61-62.
- BONESS, M. 1953. Die Faune der Wiesen, inter besonderer Berücksichtigung der Mahd. *Z. Morph. Okol.* 42: 225-277.
- BOSSELmann, J. 1970. Der Ulmener Weiher, Brut- und Rastplatz für Limikolen. *Charadrius* 6: 26-30, 66-70.
- BOSSELmann, J. 1970. Zunahme von Kiebitzbruten (*Vanellus vanellus*) in den nördlichen Gebieten von Rheinland-Pfalz. *Emberiza* 2: 66-68.
- BOSSELmann, J., BRAUN, M. & KNOLLINGE, W. 1976. *Jahresbericht 1976 der OAG Koblenz und Umgebung, Westerwald, Mayen und Umgebung.* Selbstverlag.
- BOSSELmann, J. & CHRISTMANN, K.H. 1974. *Die Vogelwelt im Raum Andernach-Mayen-Cochem.* Beitr. Avifauna Rheinland, H.3. Düsseldorf.
- BRAUN, M. & MULLER, K. 1978. Rote Liste der bestandsgefährdeten Vogelarten in Rheinland-Pfalz (3. Fassung, Stand 1.3.1978). *Dendrocopos* 5: 60-63.
- BRAUN, M. & SIMON, L. 1981. Rote Liste der bestandsgefährdeten Vogelarten in Rheinland-Pfalz. *Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz* 2(1): 61-70.
- BREHM, K. 1971. *Seevogel-Schutzgebiet Hanke-Haien-Koog.* Tier und Umwelt NF 6/7, 52 pp.

- BRIEGER,K. 1953. Beitrage zur Avifauna Paderborus und Umgebung I. Natur und Heimat 13: 82-89.
- BRINKMANN,M. 1933. Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands. Hildesheim.
- BROMBACH,H. & GRIESER,H. 1977. Die Vogelwelt von Leverkusen. Avifauna einer Industriegrossstadt am Rhein. Beitr. Avif. Rheinland H. 10., Dusseldorf.
- BROOKS,C. 1971. Brutnachweis des Waldwasserlaufers (*Tringa ochropus*) im Kreis Soltau. Vogelk. Ber. Nieders. 3: 25-26.
- BRUCH,A. & LOSCHAU,M. 1970. Zum Vorkommen der Limikolen im Berliner Raum. On. Mitt. 22: 157-163.
- BRUCH,A., ELVERS,H., POHL,C., WESTPHAL,D. & WITT,K. 1978. Die Vogel in Berlin (West). Eine Ubersicht. Ornithologisches Bericht fur Berlin (West) 3, Sonderheft.
- BRUCH,A. & LOSCHAU,M. 1973. Zum Vorkommen der Limikolen im Berliner Raum (III). Orn. Mitt. 25: 39-54.
- BRUNS,H. 1939. Die schwarzschwanzige Uferschnepfe erstmalig Brutvogel auf den ostfriesischen Inseln (Wangerooge). Orn. Mber. 47:147.
- BRUNS,H. 1951. Zum Brut- und Gastvorkommen des Goldregenpfeifers, *Pluvialis apricaria* (L.) in Norddeutschland. Orn. Mitt. 3:235.
- BRUNS,H. 1952. Aus der Vogelwelt der ostfriesischen Insel Spiekeroog. Orn. Mitt. 4: 83-92.
- BRUSTER,K.H. 1971. Der Seeregenpfeifer (*Charadrius alexandrinus* L.) - Brutvogel auf Pagensand. Vogel und Heimat 20: 32-33.
- BRUSTER,K.H. 1972. Brutzeitbeobachtungen des Uferlaufers (*Tringa hypoleucus*) 1971 und 1972 im Hamburger Raum. Vogel und Heimat 21:15. BULOW,M., GALL,T. & GLOE,P. 1983. Die Brutvogel der ehemaligen Hallig Helmsand in der Meldorfser Bucht 1978 bis 1983. Corax 9: 302-319.
- BURKLI,W. 1983. Erster Brutnachweis des Flussuferlaufers *Actitis hypoleucus* im Oberengadin. Orn. Beob. 80:298.
- BUSCH,F.-D. 1972. Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*). Brutvogel auf der Nordseeinsel Spiekeroog. Vogelk. Ber. Niedersachs 4: 85-86.
- BUSCH,F.-D. 1976. Schwedischer Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*) brutet auf Spiekeroog. Vogelk. Ber. Niedersachs 8: 84-85.
- BUSCHE,G. 1974. Neue Untersuchungen zur Vogelwelt Dithmarschens. Heimat 81: 228-236.
- BUSCHE,G. 1975. Zur Siedlungsdichte und Ökologie von Sommervögeln in der Marsch Schleswig-Holsteins. Corax 5: 51-101.
- BUSCHE,G. 1980. Vogelbestände des Wattenmeeres von Schleswig-Holstein. Kilda, Greven.
- BUSCHE,G. & BERNDT,R.K. 1975. Ornithologischer Jahresbericht der OAG für 1974. Corax, Beih. 2: 120-167.
- BUSCHMANN,J. & MULLER,W. 1974. Ergebnis einer Bestandsaufnahme des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) im Landkreis Dinslaken 1973. Charadrius 10: 3-7.
- CONRAD,U., HOLZ,R. & SELLIN,D. 1979. Die Entwicklung des Limikolenbrutbestandes am südlichen Greifswalder Bodden von 1967 bis 1978. Orn. Rundbr. Mecklenburgs N.F. 21: 56-72.
- DAHMS,G. 1977. Untersuchungen zur Siedlungsdichte der Limikolen auf dem Asseler Sand (Niederelbe) und zum Einfluss der Wind- und Sturmfluten auf die Brutvogel. Hamb. avifaun. Beitr. 15: 1-12.
- DENKER,W. 1979. Gelegefund der Waldschneepfe (*Scolopax rusticola*) 1966 in Dithmarschen. Corax 7: 68-69.
- DEPPE,H.-J. 1975. Angaben zum Durchzug, Brutvorkommen und Brutbeginn des Waldschneepfe (*Scolopax rusticola*) in Norddeutschland. Vogelwelt 96: 201-213.
- DIESING,P. 1981. Vogelbeobachtungen im Westniedersächsischen Naturschutzgebiet Grosses Tatemeer und seiner naheren Umgebung. Beitr. Naturk. Niedersachs. 34: 156-160.
- DILLING,A., SCHLAFFER,W. & SCHLOSSER,W. 1970. Das Brutvorkommen des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius*) 1969 in Hessen. Luscinia 41: 9-15.
- DIRCKSEN,R. 1963. Die grüne Insel Spiekeroog. Herford.
- DIRCKSEN,J. 1968. Die Brutvogel der Vogelfreistätte Trischen im Jahr 1966. Natur und Heimat 28: 101-111.
- DIRCKSEN,J. 1973. Wattenmeer und Inselwelt. Der Biologieunterricht 9: 28-43.
- DISTER,E. 1978. Zur Situation des Grossen Brachvogels in Rheinland-Pfalz. Rhein. Heimatpflege 15: 194-195.
- DORNBERGER,W. 1979. Die Vogelwelt des Ottmaringer Tales zwischen Dietfurt a.d.A. und Beilugries. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 23.
- DORNBERGER,W. & ZIEGLER,T. 1979. Die Vogelwelt des Walt- und Gaisweihers. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 22.
- DRENCKHAHN,D., HELDT,R. & HELDT,R. 1971. Die Bedeutung der Nordseeküste Schleswig-Holsteins für einige eurasische Watt- und Wasservogel mit besonderer Berücksichtigung des Nordfriesischen Wattenmeeres. Natur und Landschaft 46: 338-346.
- EBER,G., GEESINK,B. & WILLERS,T. 1972. Der Brutbestand einiger Limikolenarten in der Gemeinde Vreden, Kreis Ahaus, Westfalen. Natur und Heimat 32: 39-45.
- EBERHARDT,D. 1977. Gefährdete Vogelarten im Rheinland. 13. Austernfischer (*Haematopus ostralegus*). Rhein. Heimatpflege NF 14:260.
- EBERHARDT,D. 1977. Gefährdete Vogelarten im Rheinland. 15. Kampfläufer (*Philomachus pugnax*). Rhein. Heimatpflege NF 14:262.
- EBERHARDT,D. 1977. Gefährdete Vogelarten im Rheinland. 16. Sabelschnabler (*Recurvirostra avosetta*). Rhein. Heimatpflege NF 14:263.
- EBERHARDT,D., KOTTER,F. & MILDENBERGER,H. 1977. Die Vogelfauna der Rheinaue Duisburg-Walsum. Duisburg.
- EBERHARDT,D. & MILDENBERGER,H. 1971. Bestandschwankungen einiger Brutvogel am unteren Niederrhein. Charadrius 7: 105-113.
- EGGERS,J. 1975. Zur Siedlungsdichte der Hamburger Vogelwelt. Hamb. avifaun. Beitr. 13: 13-72.
- EICHSTEDT,M. & FRANKEN,W. 1972. Siedlungsdichte-untersuchungen im Kiebitzmoor 1968-1970 nach Bestandsaufnahmen der DJN-Gruppe (Hamburg-) Waldorfer. Hamb. avifaun. Beitr. 10: 89-93.
- EKELOF,O. 1970. Der Brutbestand des Sabelschnablers, *Recurvirostra avosetta*, an der Westküste Schleswig-Holsteins im Jahre 1969. Corax 3: 97-100.
- ELVERS,H. & WITT,K. 1973. "Rote Liste" der gefährdeten Brutbiotope und "Rote Liste" der Brutvogel in Berlin (West). Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 13: 41-43.
- EMDE,F. 1983. Brutvorkommen und Durchzug der Limikolen im nord-westlichen Nordhessen - Teil 2. Vogelk. Hefte Edertal 9: 69-80.
- ENGLANDER,H. & MILDENBERGER,H. 1975. Kampfläufer (*Philomachus pugnax*), neuer

- Brutvogel am unteren Niederrhein.  
*Charadrius* 11: 51-52.
- ERNST, F. 1975. Brutnachweis der Bekassine (*Gallinago gallinago*) bei Bad Sachsa. *Vogelk. Ber. Niedersachs.* 7:59.
- ERZ, W. 1967. Besonders gefährdete Vogelarten in Nordrhein-Westfalen. *Orn. Mitt.* 19: 133-138.
- ERZ, W. 1972. Allgemeine Gesichtspunkte zum Schutz von Watvogel (Limikolen). *Charadrius* 8: 151-177.
- ERZ, W. 1979. Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Vogelarten (Aves). In: LOLF (ed.) *Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Pflanzen und Tiere. Schriftenreihe der LOLF*, Band 4, Recklinghausen.
- FELLENBERG, W.O. 1967. Zur Brutverbrütung und Brutbiologie des Kiebitzes im Sauerland. *Anthus* 4: 41-50.
- FELLENBERG, W.O. 1971. Die Brutverbreitung der Bekassine im süd-westfälischen Bergland. *Anthus* 8: 80-83.
- FELLENBERG, W.O. & PFENNIG. 1970. Ergänzende Mitteilungen zur Brutverbrütung des Kiebitzes im Südwestfälischen Bergland. *Anthus* 7: 23-28.
- FIEDLER, K. 1974. Kurze faunistische Mitteilungen aus Hessen (8). *Luscinia* 42: 143-150.
- FISCHER, H. & RINGE, F. 1978. *Elbstaustrafe Giesthacht* 1977. Sonderheft 6. Mitteilungsblatt DBV Landesverband Hamburg e.V. 7-9.
- FLADE, M. 1981. Die Bedeutung der Dussen- und Barnbruchswiesen Wolfsburg für die Vogelwelt. *Vogelk. Ber. Niedersachs.* 13: 34-52.
- FOCKE, E. & KNOCKE, M. 1966. Stelzenlaufer (*Himantopus himantopus*) brüten bei Brauen. *J. Orn.* 107: 232-233.
- FRANZ, D. 1981. Brutnachweis des Flussuferläufers *Actitis hypoleucos* im Oberen Maintal. *Orn. Ges. Bayern* 20:176.
- FRANZISKET, L. 1954. Die Vogelwelt des Zwillbrocher Venns. *Natur und Heimat* 14: 70-80.
- FREY, H. 1970. Tiergeographische Untersuchungen über sakulare quantitative und qualitative Veränderungen im Brutvogelbestand der Oberrheinischen Tiefebene und der Wetterau. *Decheniana*, Beih. 16: I-VIII, 1-177.
- GARVE, E. 1977. Die Vogel der Sudheide und der Aller-Niederung. 1. Teil Non-Passeriformes. *Celler Ber. Vogelk.* 3.
- GASOW, H. 1941. Vom Grossen Brachvogel und seinen Brutplätzen im nordlichen Münsterland. *Dt. Vogelwelt* 66: 33-36.
- GASSLING, K.-H., KUINKE, H. & POLLMANN, H. 1980. Avifaunistische Beobachtungen im Binshanser Feld. *Charadrius* 16: 49-59.
- GATTER, W. 1970. Die Vogelwelt der Kreise Nurtingen und Esslinger. *Jb. Ges. Naturk. Wurttemberg* 125: 158-164.
- GAUCKLER, A. & KRAUS, M. 1963. Die Brutplätze des Brachvogels (*Numenius arquata*), Rotschenkels (*Tringa totanus*) und der Uferschnepfe (*Limosa limosa*) im Nordbayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 424-443.
- GAUCKLER, A., KRAUS, M. & KRAUSS, W. 1970. Verbreitung und Brutbestände von Brachvogel (*Numenius arquata*), Rotschenkel (*Tringa totanus*) und Uferschnepfe (*Limosa limosa*) in Nordbayern im Jahre 1969. *Anz. orn. Ges. Bayern* 9: 13-26.
- GEBHARDT, L. 1954. Der Große Brachvogel in Hessen. *Orn. Mitt.* 6: 24-25.
- GEBHARDT, L. 1965. Grosser Brachvogel - *Numenius arquata* - und Uferschnepfe - *Limosa limosa* - als neue Brutvogel Oberhessens. *Luscinia* 38:31. GEBHARDT, L. & SUNKEL, W. 1954. *Die Vogel Hessens*. Frankfurt am Main.
- GERDES, K. 1953. Aus dem Vogelleben von Wangerooge Ost 1952. *Vogelwelt* 74: 171-176.
- GILLER, F. 1976. *Die Avifauna des Rheinischen Braunkohlesgebiet*. Beitr. Avif. Rheinland H. 7/8, Düsseldorf.
- GLOE, P. 1970. Zum Vorkommen der Uferschnepfe (*Limosa limosa*) im südlichen Dithmarschen. *Orn. Mitt.* 22: 213-215.
- GLOE, P. 1971. Beitrag zum Brutbiotop des Sabelschnablers (*Recurvirostra avosetta*) in Schleswig-Holstein. *Orn. Mitt.* 23: 1-9.
- GLOE, P. 1971. Der Brutvogelbestand im Osteil des Busumer Hafenkooges 1971. *Corax* 4, Beiheft 1: 83-91.
- GLOE, P. 1971. Brutplätze des Sandregenpfeifers - *Charadrius hiaticula* - in Dithmarschen (Schleswig-Holstein). *Corax* 4, Beiheft 1: 92-93.
- 
- GLOE, P. 1972. Zur Vogelwelt der Insel Tertius (Dithmarschen). *Orn. Mitt.* 24: 210-213.
- GLOE, P. 1973. Zur Siedlungsdichte des Seeregenpfeifers (*Charadrius alexandrinus*) an der Westküste von Schleswig-Holstein. *Orn. Mitt.* 25:194.
- GLOE, P. 1973. Zur Vogelwelt der Insel Tertius 1973. *Corax* 4: 153-154.
- GLOE, P. 1974. Die Brutvogel der "Ziegeninsel" vor dem Meldorf Hafen. *DBV - Mitt. Landesverband Schleswig-Holstein* 1: 7-10.
- GLOE, P. 1977. Die Brutvogel Helmsands 1971-1976. *Dithmarschen o.A.* 1:1721.
- GLOE, P. 1979. Siedlungsdichte und Brutplatz-Wahe der Brutvogel des Alten Meldorf Sommerkooges. *Corax* 7: 1-36.
- GLOE, P. & BUSCHE, G. 1974. Zum Brutvorkommen des Austernfischers (*Haematopus ostralegus*) in Dithmarschen. *Orn. Mitt.* 26: 147-151.
- GOETHE, F. 1939. Die Vogelinself Mellum. Beiträge zur Monographie eines deutschen Seevogelschutzgebietes. *Abh. Vogelk.* 4, Berlin.
- GOETHE, F. 1975. 6. Arbeitsbericht der Zentralstelle für den Seevogelschutz beim Institut für Vogelforschung. *Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz* 15: 21-34.
- GRAUMANN, G., JAUEL, D., MULLER, S. & ZOLICK, H. 1980. Die Vogel des NSG Bock und Hohe Dune von Pramort. *Natur und Naturschutz in Mecklenburg* 14: 5-79.
- GREVE, K. 1955. Der Tiel (*Burhinus oedicnemus*) als Brutvogel in der südlichen Lüneburger Heide. *Beitr. Naturk. Nieders.* 8:61.
- GREVE, K. 1958. Rotschenkel (*Tringa totanus*) Brutvogel in Sudostniedersachsen. *Orn. Mitt.* 10:112.
- GREVE, K. 1958. Der Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*) als Brutvogel auf Neuwerk. *Vogelwelt* 79: 158-159.
- GREVE, K. 1962. Kleiner Alpenstrandläufer (*Calidris alpina schinzii*) 1962 Brutvogel auf der Nordseeinsel Neuwerk. *Beitr. Naturk. Niedersachs.* 15:66.
- GREVE, K. 1969. Zur Siedlungsdichte einiger Brutvogel auf der Nordseeinsel Neuwerk. *Orn. Mitt.* 21:169.

- GROH,G. & SISCHKA,N. 1970. Berichtigungen zu: "Kommentierte Liste der Vogel des Pfalz". *Mitt. Pollichia* III/17: 129-143.
- GROSSKOPF,G. 1968. *Die Vogel der Insel Wangerooge*. Wilhelmshaven.
- GROSSKOPF,G. 1968. Verbreitung und Schutz des Goldregenpfeifers im Regierungsbezirk Hannover. *Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz* 8: 45-48.
- GROSSKOPF,G. 1975. Der Bestand des Rotschenkels (*Tringa totanus*) in Niedersachsen. *Vogelk. Ber. Niedersachs.* 7: 53-58.
- HAACK,W. 1969. Feldbruten des Sandregenpfeifers, *Charadrius hiaticula*, im ostholsteinischen Binnenland. *Corax* 3: 31-34.
- HAARMANN,K. 1970. Die Vogel der Wedeler Marsch (dritter Teil). *Hamb. avifaun. Beitr.* 8: 190-216.
- HAARMANN,K. 1975. Kriterien zur Bestimmung international, national und regional bedeutsamer Feuchtgebiete für Wat- und Wasservogel. *Schr. Reihe Landschaftspflege und Naturschutz* 12: 13-17.
- HAARMANN,K. 1976. Die im Hamburger Raum gefährdeten Vogelarten - "Rote Liste" (Stand 1.1.1976). *Hamb. avif. Beitr.* 14: 1-16.
- HAARMANN,K. & PRETSCHER,P. 1976. *Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland*. Kilda, Greven.
- HACKEL,H. 1975. *Die Vogelwelt des Ungenrieder Teichgebietes (Landkreis Unterallgäu)*. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 6.
- HAMMERSCHMIDT,R. 1970. *Die Vogelwelt des Reg.-Bez. Osnabrück und der unmittelbaren Greuzgebiete - unter besonderer Berücksichtigung des Dummers*. Vols. 1-3, Braunsche.
- HARENBERG,M. 1972. Der gegenwärtige Stand der Brutverbreitung einiger Laro-Limikolen in Westfalen. *Anthus* 9: 25-36.
- HARENBERG,M., PRUNTE,W. & SPECKMANN,M. 1973. Zugphanologie und Status der Limikolen in den Ruschfeldern der Stadt Münster. *Vogelwelt* 94: 81-118, 121-146.
- HARMS,W. 1971. Vermehrte Bruten vom Kreibitz (*Vanellus vanellus*) im Nachwinter 1966 im Elbtal bei Hamburg. *Corax* 3: 172-175.
- HARMS,W. 1972. Das Kiebitzvorkommen (*Vanellus vanellus*) auf der Giest bei Hamburg-Harburg. *Vogel und Heimat* 21: 154-155.
- HARMS,W. 1975. Sommer- und Wintervogelbestand auf feuchten Wiesen und Weiden des Daerstorfer Moors 1970/71. *Hamb. avifaun. Beitr.* 13: 133-144.
- HAUSKA,G. 1982. Flussregenpfeifer brutet im Bangelande des Universitätsklinikums. *Jahresber. or A.G. Ostbayern* 9: 266-267.
- HAUSMANN,A. & HAUSMANN,K. 1972. Der Austernfischer (*Haematopus ostralegus*) der Insel Mellum 1971. *Orn. Mitt.* 24: 87-95.
- HAUSMANN,A. & HAUSMANN,K. 1974. Der Austernfischer (*Haematopus ostralegus*) der Hallig Norderoog 1973. *Orn. Mitt.* 26: 89-94.
- HECKENROTH,H. 1985. Atlas der Brutvogel Niedersachsens 1980 und des Landes Bremen mit Ergänzungen aus den Jahren 1976-1979. *Natursch. Landschaftspfl. Niedersachs.* 14: 1-428.
- HECKENROTH,H. & KIPP,M. 1982. Zur Situation des Grossen Brachvogels (*Numenius arquata*) in Niedersachsen. *Beih. Veroff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 25: 79-82.
- HEER,E. 1969. Kiebitz und Brachvogel im Kreise Aalen (Wurtt.). *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 73: 86-90.
- HEER,E. 1973. Bruten der Waldschnepfe auf der Schwäbisch-Fränkischen Alb. *Jh. Ges. Naturkd. Württemberg* 128:172.
- HEINEN,W. 1972. Neue Brutnachweise des Flussuferlaufers. *Charadrius* 8:28.
- HEISER,F. 1969. Zur Vogelwelt des Naturschutzgebietes "Holl" bei Merlingen und seiner Umgebung. *Ber. Naturw. Ver. Schwaben* 73: 38-44.
- HEISER,F. 1971. Zum Vorkommen der Wasservogel im Lech-Donau-Wonkel. *Ber. Naturw. Ver. Schwaben* 75: 6-11.
- HELM,G. 1976. Die Wedeler-Haseldorfer Marsch muss vor vollständiger Zerstörung gerettet werden. *Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz* 16: 47-52.
- HEMINGHAUS,W. 1955. Der Austernfischer als Binnenlandbruter im Regierungsbezirk Osnabrück unter besonderer Berücksichtigung des Vorkommens im Vechtegebiet der Grafschaft Bentheim. *Veroff. Naturwiss. Ver. Osnabrück* 27: 75-85.
- HESSE,M. 1974. Zur Brutverbreitung des Kiebitzes (*Vanellus vanellus*) in Westfalen. *Aliedo* 3: 75-86.
- HEYNE,K.H. 1971. Bestandentwicklung und Lebenstraume des Flussregenpfeifers im Kreis Trier-Saarburg. *Dendrocopos* 4: 5-6.
- HIRSCHEL,O. 1962. Die Uferschnepfe - *Limosa limosa* - Brutvogel im südhessischen Ried. *Luscinia* 35:36.
- HOCHEDER,C. 1958. Die Uferschnepfe (*Limosa limosa*) Brutvogel bei Regensburg. *J. Orn.* 99:461.
- HOLSCHER,R., MULLER,B.B.K. & PETERSEN,B. 1959. Die Vogelwelt des Dummer-Gebietes. *Biol. Abh.* 18:21.
- HOLZINGER,J. 1969. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (1). *Anz. orn. Ges. Bayern* 8: 473-509. Lapwing population.
- HOLZINGER,J. 1973. Existenzbedrohte Vogelarten in Baden-Württemberg. *Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz* 13: 61-67.
- HOLZINGER,J., KROYMANN,B., KNOTZSCH,G. & WESTERMANN,K. 1970. Die Vogel Baden-Württembergs - eine Übersicht. *Anz. orn. Ges. Bayern* 9: 1-175.
- HOLZINGER,J., MICKLEY,M. & SCHILLHAUSEL,K. 1971. Zum Vorkommen der Bekassine (*Gallinago gallinago*) und des Grossen Brachvogels (*Numenius arquata*) im Ulmer Raum. *Mitt. Ver. Naturw. Mathem. Ulm/Donau* 28: 122-135.
- HOFFMANN,D. 1976. Brutvorkommen 1974 des Brachvogels - *Numenius arquata* - in der Pfalz. *Beitr. Landspfl. Rhld-Pflaz* 4:92.
- HOLLUNDER,W., JOREK,N. & KIPP,M. 1977. Entwurf eines Schutzprogrammes für grossflächige westfälische Feuchtgebiete. *Natur und Landschaft* 5: 231-235.
- HUNCK,P. 1973. Vogelschutz - Luhesand 1971. *Vogel und Heimat* 22: 171-174.
- HUNCK,P. 1976. Luhesand 1975. *Vogel und Heimat*, Sonderheft 4/76: 11-18.
- HUNCK,P. 1977. Luhesand 1976. *Vogel und Heimat*, Sonderheft 5/77: 19-26.
- HUNCK,P. 1978. Luhesand 1977. *Mitteilungsblatt DBV Landesverband Hamburg eV*, Sonderheft 6: 29-37.
- HUNCK,P. 1979. Luhesand 1978. *Mitteilungsblatt d. DBV Landesverband Hamburg Sonderheft* 7: 40-48.
- HUTTER,C.P. & LINDER,W. 1975. Die Bedeutung der Talaue zwischen Freiburg und Pleidelsheim für Brutvogel, Durchzugler und Überwinterer. *Orn. Mitt.* 27: 175-181.
- HYLA,W. 1965. Beobachtungen zur Brutzeit 1963 im Raum Oberhausen-Ulheim. *Charadrius* 1: 33-34.
- JACOBY,H., KNOTZSCH,G. & SCHUSTER,S. 1970. Die Vogel des Bodenseegebietes. *Orn. Beob.* 67, Sonderheft.

- JAKOBS,B. 1962. Beobachtungen an moselländischen Flussregenpfeifern, Brutpaaren 1952-1956. Neues Trierisches Jahrbuch 1962:94.
- JAKOBS,B. 1968. Die derzeitigen Brutvogel des Stadtkreises Trier; eine kurze Übersicht. Kurtrierisches Jahrb. 8: 325-339.
- JAKOBS,B. 1971. Zur Vogelwelt des Murnesmoores in der Vulkaneifel. Landeskundl. Vierteljahresbl. Trier 17: 21-40.
- JAKOBS,B. 1978. Erster Brutnachweis des Flussuferläufers (*Tringa hypoleucus*) im Saarland. Abh. Arb. Geogr. Heimatforsch. Saarl. 8: 155-161.
- JALOWITSCHER,M., HAIMERL,G. & MAGERL,C. 1976. Die Vogelwelt des Viehlassmoses. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 9.
- JUNGE,K. 1971. Die Vogelwelt Salzgitters und seiner Umgebung. Eigenverlag, Hildesheim.
- JUNIGE,D. 1974. Pagensand 1973. Vogel und Heimat, Sonderheft 2/74: 31-38.
- JUNIGE,D. 1975. Pagensand 1974. Vogel und Heimat, Sonderheft 3/75: 31-37.
- JUNIGE,H.D. 1976. Pagensand 1975. Vogel und Heimat, Sonderheft 4/76: 43-51.
- JUNIGE,H.D. 1977. Pagensand 1976. Vogel und Heimat, Sonderheft 5/77: 27-35.
- JUNIGE,H.D. & MACHUT,J. 1978. Pagensand 1977. Mitteilungsblatt DBV Landesverband Hamburg e.V., Sonderheft 6: 17-27.
- JUNIGE,H.D. & TOBIAS,H. 1979. Pagensand 1978. Mitteilungsblatt d. DBV Landesverbandes Hamburg, Sonderheft 7: 27-39.
- KAISER,H. 1968. Die Vogelwelt des Schwenniger Moores und seiner Umgebung. In: Das Schwennninger Moos. pp. 285-304. (Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs, Bd. 5).
- KAMKE,H. & WERNER,A. 1983. Beobachtungen an einer Flussregenpfeiferpopulation im Mittleren Fuldatal. Vogelk. Jber. Mittl. Fuldatal 4: 48-71.
- KAPPES,W. & BOSCH,H. 1969. Der Brutvogelbestand der Hallig Hooge 1968. Informationsbrief Naturschutzges. Schutzstation Wattenmeer 7, Nr. 9.
- KASPAREK,M., KRUGER,G. & PFARR,M. 1975. Die Vogelwelt der Isarauen bei Rosenau/Moosburg. Vogelbiotope Bayerns, Dokumentation Nr. 3.
- KEIL,W. & WINTHNER,K. 1983. Biotop-Management des Grossen Brachvogels - *Numenius arquata* - in Hessen. Vogel und Umwelt 2: 267-272.
- KELLER,H. 1982. Artenschutzprojekt Grosser Brachvogel (*Numenius arquata*) im Donaumoos bei Langenau: Erste Zwischenbilanz. Bech. Veroff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Wurtt. 25: 113-118.
- KELM,H.-J. 1979. Beobachtungen auf Hallig Habel 1977. Corax 7: 41-42.
- KINZELBACH,R. 1965. Kommentierte liste der Vogel der Pfalz. Emberiza 1: 5-36.
- KIPP,M. 1977. Artenschutzprojekt Brachvogel (*Numenius arquata*). Ber. dt. Sch. intern. Ratesf. Vogelschutz 17: 33-38.
- KIPP,M. 1982. Zur Situation des Grapen Brachvogels (*Numenius arquata*) und der Uferschnepfe (*Limosa limosa*) im Kreis Minden-Lübbecke. Charadrius 18: 57-60.
- KIPP,M. 1984. Zur Bestandsentwicklung des Grossen Brachvogels (*Numenius arquata*) in den Kreisen Borken und Coesfeld. Charadrius 20: 23-27.
- KIPP,M. 1984. Zum Vorkommen des Grossen Brachvogels (*Numenius arquata*) in Rheinland. Charadrius 20:54.
- KIRCHHOFF,K. 1971. Kiebitz, Brutverbreitung, Brutbiologie und Zug im Berichtsgebiet. Hamb. avifaun. Beitr. 9: 47-99.
- KIRCHHOFF,K. 1972. Der Brutvogelbestand des Ohekuhlenmoors (Hamburg - Hummelsbuttel) von 1967-1970. Hamb. avifaun. Beitr. 10: 83-88.
- KIRCHNER,H. 1972. Zur Brut des Waldwasserläufers (*Tringa ochropus*) in Schleswig-Holstein. Orn. Mitt. 24: 268-271.
- KIRCHNER,H. 1973. Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) brutet in Schleswig-Holstein. Heimat 80: 168-170.
- KLAEHN,D. 1975. Die ornitho-ökologische Bedeutung des Niederelberaumes - zugleich eine kritische Flächenbilanz. Dtsch. Rat für Landespflege H.25. Bonn.
- KLEENE,R., MUNKEMULLER,K. & MICHAELIS,H. 1974. Brutvogelbestandsaufnahme eines Feuchtgebietes (Dusterdieker Niederung bei Mettingen, Kr. Tecklenburg). Natur und Heimat 34: 26-30.
- KLEIN,M., KLEIN,G. & FOHLISCH,R. 1971. Flussregenpfeifer Brutvogel im Kreis Olpe. Anthus 8:86.
- KLEIN,W. 1969. Zur Vogelwelt des Kinzigtales (Hessen) und seiner Einzugsgebiete. Luscinia 40: 185-191.
- KLEIN,W. 1971. Zur Vogelwelt des Kinzigtales (Hessen) und seines Einzugsgebietes. Luscinia 41: 169-177.
- KLIEBE,K. 1969. Der grosse Brachvogel - *Numenius arquata* - wieder Brutvogel im Amoneburger Becken. Luscinia 40:262.
- KNIEF,W. & BUSCHE,G. 1982. Zur Brutverbreitung des Grossen Brachvogels (*Numenius arquata*) in Schleswig-Holstein. Beih. Veroff. Natursschutz Landschaftspflege Bad.Wurtt. 25: 71-77.
- KNOBLAUCH,G. 1956. Die Vogel des Naturschutzgebietes "Heiliges Meer". Natur und Heimat 16: 79-84.
- KNOBLAUCH,G. 1980. Die Vogelwelt des Naturschutzgebietes "Heiliges Meer". Kilda, Greven.
- KNORR,E. 1967. Die Vogel des Kreises Erkelenz. Schriftenreihe Landkr. Erkelenz, Band 2, Neuss.
- KOBUS,D. 1966. Die Vogelwelt des Fahrer Vorlandes. Orn. Mitt. 18: 195-199.
- KOHLS,A. 1966. Der Große Brachvogel im Hamburger Raum. Hamb. avifaun. Beitr. 3: 98-123.
- KOLLER,J. 1978. Vogelwelt im Dachauer Moos und im Allacher Forst. Eigenverlag.
- KONIG,D. 1956. Der Alpenstandläufer als Brutvogel an der schleswig-holsteinischen Westküste. Vogelwelt 75: 108-114.
- KOPKE,G. 1971. Beobachtungen an Goldregenpfeifer-Brutplätzen im Westlichen Niedersachsen. Orn. Mitt. 23: 87-90.
- KOPP,F. 1982. Die Bestands situation des Grossen Brachvogels (*Numenius arquata*) in Hessen unter besonderer Berücksichtigung des Hessischen Rieds. Beih. Veroff. Natursschutz Landschaftspflege Bad.-Wurtt. 25: 61-64.
- KORTNER,W. 1970. Beobachtungen am Brachvogel (*Numenius arquata*) der Altmühlwiesen. Anz. orn. Ges. Bayern 9: 235-236.
- KORTNER,W. 1984. Erste Gelegefunde des Flussuferläufers *Actitis hypoleucus* im Oberen Maintal. Anz. orn. Ges. Bayern 23: 246-247.
- KRAUS,M. & KRAUSS,W. 1972. Zum Vorkommen der Bekassine (*Gallinago gallinago*) im Regnitzbecken mit Angaben zur Brutverbreitung in Nordbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 11: 129-138.
- KRAUS,M. & KRAUSS,W. 1967. Zur Bestandsaufnahme des Kiebitzes in der Oberpfalz im Jahre 1967. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 108-112.
- KRAUS,B. & ZIEGLER,W. 1976. Die Vogelwelt der Loisach-Kochelseemoore und des Kochelsees. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 15.

- KRAUSS,W. 1966. Zur Bestandsaufnahme des Kiebitzes in Franken im Jahre 1966. *Anz. orn. Ges. Bayern* 7: 763-770.
- KRAUSS,W. 1967. Zum Brutvorkommen des Kiebitz in Franken. Ein Nachtrag. *Anz. orn. Ges. Bayern* 8: 105-107.
- KRAUSS,W. & SPRINGER,H. 1962. Beitrage zur Vogelwelt des bayerischen Schwaben. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 362-384.
- KRAUTER,K. 1959. Erfolgreiche Brut des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius couronicus* Gm) an der Ahr. *Vogelring* 28:118.
- KRAUTER,K. 1959. Flussuferlaufer (*Actitis hypoleucus*) als Brutvogel auf der Rheininsel Hammerstein (Kreis Neuwied). *Vogelring* 28:118.
- KRAMER,H. & ROOS,R. 1968. Brut- und Raststatten von Wasservögeln und Limikolen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. *Decheniana* 119: 191-214.
- KROSIGK,E.VON. 1978. Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 32. Bericht: 1974-1976. *Anz. orn. Ges. Bayern* 17: 37-62.
- KROYMANN,B. 1969. Methode und Ergebnisse einer Bestandsaufnahme beim Kiebitz zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb. *Vogelwelt* 90: 8-17.
- KROYMANN,B. & KROYMANN,L. 1969. Die Kiebitz-Brutplätze zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb. *Jh. Ges. Naturk. Württemberg* 124: 251-259.
- KUHNAST,O. & PETERS,S. 1976. Zur Vogelwelt und Landschaft der Spülfläche Kirchsttimbeck 1974/75. *Vogel und Heimat* 25: 4-5.
- KUHN,M. 1978. Nur Felder- aber dennoch eine vielfältige Vogelwelt. Vogel der Ackerbaufläche in der Zulpicher Borde. *Jb. d. Kreises Fuskirchen* 1979: 135-147.
- KUHNEN,K. 1967. Untersuchungen über den Brutbestand des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) im Landkreis Kempen-Krefeld. *Charadrius* 3: 4-5.
- KUHNEN,K. 1970. Zum Brutvorkommen des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) am Niederhein. *Charadrius* 6: 92-95.
- KUHNEN,K. 1970. Brutplätze des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius*) am südlichen Niederrhein. *Charadrius* 6: 131-135.
- KUKLICK,H.-W., STREICHERT,J., HEINKEN,T., SCHUTZ,A., RIEMENSCHNEIDER,G. & STOLTE,P. 1982. Der Auflandeteich Gross Bulten-Adenstedt (Landkreis Peine) - ein Beispiel für die ökologische Vitalität eines ehemaligen Industriegewässers. *Beitr. Naturk. Niedersachs.* 35: 63-111.
- KUMERLOEVE,H. 1954. Vom Ausernfischer im nordwestdeutschen Binnenland. *Kosmos* 50: 404-407. KUMERLOEVE,H. 1954. Vom Bruten des Seeregenpfeifers auf Amrum. *Beitr. Vogelkd.* 4: 53-54.
- KUMERLOEVE,H. 1961. Uferschnepfe und Trauerseeschwalbe als Brutvogel auf der Ostfriesischen Insel Föhr. *Falke* 8: 313-314.
- KUMERLOEVE,H. 1963. Die Brutvogelwelt der nordfriesischen Inseln Amrum und Föhr. *Abh. Verh. Nat. Verein. Hamburg* 7: 79-123.
- KURTH,D. 1966. Die Vogel der Wedeler Marsch (Erster Teil). *Hamb. avifaun. Beitr.* 4: 1-138.
- KURTH,D. 1970. Die Vogel der Wedeler Marsch (Zweiter Teil). *Hamb. avifaun. Beitr.* 8: 155-189.
- KUSCHERT,H. 1983. *Wiesenvogel in Schleswig-Holstein*. Husum Druck- und Verlagsgesellschaft, Husum, 120 pp.
- LATZEL,G. 1977. Zum Status bemerkenswerter Brutvogel und Durchzugler im zukünftigen Naturschutzgebiet "Dupen" bei Wolfsburg. *Orn. Mitt.* 29: 34-37.
- LEHMANN,H. & MERTENS,R. 1965. Die Vogelfauna des Niederbergischen. *Jahres ber. Naturwiss. Ver. Wuppertal* 20: 11-164.
- LEIBEL,F. 1980. Die Vogelau in Straubing. Ihre Avifauna und deren Bedrohung durch den Bau der Stanstufe Straubing. *Jahres ber. Orn. A.G. Ostbayern* 7: 129-146.
- LEMKE,W. 1972. Bemerkenswerte Vogel auf Neuwerk. *Beitr. Naturk. Nieders.* 252: 2-8.
- LEMKE,W. 1975. Die Brutvogel Neuwerks einst und jetzt. *Hamb. avifaun. Beitr.* 13: 145-186.
- LEMKE,W. 1975. Zur Vogelwelt der Medemsand-Insel. *Vogelk. Ber. Niedersachs.* 7: 13-18.
- LEMKE,W. 1977. Neuwerk 1975 - Brutvogel - und Beobachtungsbericht. *Hamb. avifaun. Beitr.* 15: 81-96.
- LENZ,M. 1970. Über die Vogelwelt der Gatower Rieselfelder in Berlin. *Berl. Naturschutzbzl.*, Sonderh. Deut. Naturschutztag, Mai 1970, Berlin: 30-34.
- LIEGL,M. & SCHON,W. 1982. Die Vogelwelt der Weihergebiete Wiesau. *Jahres ber. Orn. A.G. Ostbayern* 9: 199-239.
- LILLE,R. 1972. Die Vogelwelt einer Binnenlandspülfläche bei Hamburg - Kirchsteinbech im Jahre 1969. *Hamb. avifaun. Beitr.* 10: 25-36.
- LOHMER,R. 1979. Feuchtwiesen von internationaler Bedeutung "Diepholzer Moorniederung". Auswirkungen der Wasserwirtschaftlichen und agrarstrukturellen Massnahmen auf die Vogelwelt im Raum Renzel. *Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz* 19: 43-49.
- LUBCKE,W. & SPERNER,K. 1969. Limikolenbruten an der Eder. *Luscinia* 40:259.
- LUBCKE,W. & SPERNER,K. 1970. Neue Bruthinweise für den Flussuferlaufer - *Actitis hypoleucus* - an der Eder. *Luscinia* 41: 94-95.
- LUCKER,L. 1970. Die Niersniederung bei Neersen als Brut- und Rastplatz für Limikolen. *Charadrius* 6: 135-140.
- MAASS,E. 1951. Die Vogelwelt Wanderooges. In: Hartung,W. (ed.) *Wanderooge, wie es wurde, war und ist*. Oldenburg.
- MAGERL,C.H. 1981. Bestandsaufnahme und Untersuchungen zur Habitatstruktur des Grossen Brachvogels *Numenius arquata* im nordöstlichen Erdinger Moos. *Anz. orn. Ges. Bayern* 20: 1-34.
- MAGERL,C. & MAGERL,H. 1975. Die Vogelwelt des Eittinger Weiher (Kreis Freising). Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 5.
- MAGERL,C., STEGER,R. & JALOWITSCHAR. 1978. Die Vogelwelt der Isaranen bei Freising. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 18.
- MAKATSCH,W. 1984. Der Stelzenlaufer (*Himantopus himantopus*). *Gef. Welt* 108: 141-142.
- MEBS,T. 1972. Rote Liste der gefährdeten Brutvogel Nordrhein - Westfalen. *Anthus* 9: 16-18.
- MEIER,J. 1977. Die Vogelwelt des Schwandorf-Schwarzenfelder Wiehengebietes. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 16.
- MEIER,O.G. 1969. Trischen 1968. Jn. 2. *Vogelkde Schleswig-Holsteins*, Ausgabe 1969: 54-55.
- MEIER,W. 1970. Die Vogel des Kreises Lüchow-Dannenberg. *Lüchow-Dannenberg Orn. Jber.* 1.
- MEIER,W. 1974. Über jahresperiodisches Auftreten der Wasser- und Watvogel an dem Elbabschnitt zwischen Penkefitz und Hitzacker. *Vogelk. Ber. Niedersachs.* 6: 33-76.
- MEIJERING,M.P.D. & MEYER-DEEPEN,H. 1974. Verbreitung von Brutvogelarten in primären und sekundären Biotopen einer

- Nordseeinsel, dargestellt am Beispiel von Spiekeroog. *Vogelwelt* 95: 81-88.
- MEISE,W. 1953-1962. Brutberichte des Vereins Jordsand für die Jahre 1952-1963. *Vogelwelt* 74-84.
- MICHAELIS,H. 1973. Neues Brutvorkommen des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius*) im Kreis Tecklenburg. *Natur und Heimat* 33: 29-31.
- MILDENBERGER,H. 1952. Zunahme und Ausbreitung einiger Vogel am Niederrhein. *Bonner zool. Beitr.* 3:40.
- MILDENBERGER,H. 1963. Der Austernfischer am Niederrhein. *Der Niederrhein* 30: 66-68.
- MILDENBERGER,H. 1982. Die Vogel des Rheinlandes. Ges. Rhein. Ornithologen, Düsseldorf, 400 pp.
- MILDENBERGER,H. & MULLER,W. 1977. Zur Brutverbreitung des Rotschenkels (*Tringa totanus*) im Rheinland. *Charadrius* 13: 16-19.
- MOBUS,K. 1982. Brutvorkommen und Durchzue der Limikolen im nord-westlichen Nordhessen - Teil 1. *Vogelk. Hefte Edertal* 8: 43-54.
- MOHRLEIN,E. 1980. Die Vogelwelt im Bereich des geplanten Speichers Gumpen. *Jahresber. Orn. A.G. Ostbayern* 7: 111-128.
- MOHRLEIN,E. 1981. Die Vogelwelt des Tirschenreuther Weihergebietes. *Jahresber. Orn. A.G. Ostbayern* 8: 65-75.
- MORITZ,V. 1973. Sandregenpfeifer - (*Charadrius hiaticula*) Brut im Binnenland. *Vogel und Heimat* 22: 195-196.
- MOTHS,U. 1979. Bestandsaufnahme des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) westlich von Kiel 1978. *Corax* 7: 65-67.
- MUHLEN,D. & ZUR MUHLEN,P. 1975. Die Vogelwelt des Naturschutzgebietes Maisinger See. *Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 4.*
- MULLER,E. 1962. Der Kiebitz in Westfalen. Abh. *Landesmus. Naturk. Münster* 24: 1-14.
- MULLER,W. 1970. Brutvogelbestandsaufnahme auf einer Weiden- und Weisenfläche in Oberhausen. *Charadrius* 6:143.
- MULLER,W. 1970. Uferschnepflebrut im Kreis Dinslaken. *Charadrius* 6: 146-147.
- MULLER,W. 1971. Zum Brutvorkommen des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) im Stadtkreis Oberhausen. *Charadrius* 7: 67-68.
- MULLER,W. 1972. Ergebnis einer Bestandsaufnahme des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius*) in Oberhausen und Randgebieten 1971. *Charadrius* 8: 16-19.
- MULLER,W. 1972. Das Brutvorkommen des Austernfischers (*Haematopus ostralegus*) im Landkreis Dinslaken 1971. *Charadrius* 8: 26-27.
- MULLER,W. 1973. Ufersnepflebrut in der Rheinaue bei Walsum. *Charadrius* 9:127.
- MÜLLER,W. 1973. Der Limikolen-Brutbestand auf Reeserschanz 1973. *Charadrius* 9:129.
- MULLER-ZECH,O. 1975. Auf Luhesand ist alles anders. Bericht über die Betreuung des Vogelschutzgebietes Luhesand im Jahre 1974. *Vogel und Heimat, Sonderheft* 3/75: 23-28.
- NEBELSIEK,U. & STREHLLOW,J. 1978. Die Vogelwelt des Ammerseegebietes. Aus den Naturschutzgebieten Bayerns, H.2: 5-82, 85-91.
- NEMETSCHEK,G. 1975. Beitrag zu den Balz- und Brutbiotopen der Waldschneepfe (*Scolopax rusticola* L.) in Niedersachsen. Beitr. *Naturk. Niedersachs.* 28: 1-9.
- NEMETSCHEK,G. 1976. Status der Waldschneepfe im Kreise Lüchow-Dannenberg. *Lüchow-Dannenberger Orn. Jber.* 6: 7-52.
- NEMETSCHEK,G. 1978. Zum Status der Waldschneepfe (*Scolopax rusticola*) im Raum Göttingen, Northeim und im Eichsfeld. *Faun. Mitt. Sud-Niedersachsen* 1: 187-188.
- NEUBAUR,F. 1957. Beiträge zur Vogelfauna der ehemaligen Rheinprovinz. *Decheniana* 110: 1-278.
- NEUENSTEIN,E.VON. 1970. Pagensand 1969. *Vogel und Heimat* 19: 381-386.
- NEUENSTEIN,E.VON. 1971. Pagensand vom 24.4 bis 8.7.1970. *Vogel und Heimat* 20: 22-27.
- NEUENSTEIN,E.VON & BRUSTER,K.H. 1972. Pagensand 1971. *Vogel und Heimat* 21: 111-115.
- NEUSCHULZ,F. 1983. Einjährige Brutbestandsaufnahme vom Kiebitz (*Vanellus vanellus*), vom Grossen Brachvogel (*Numenius arquata*) und von der Uferschnepfe (*Limosa limosa*) im Raum Dannenberg - Luchow - Gorleben (Kreis Lüchow-Dannenberg). *Luchow-Danneberg. Orn. Jber.* 9: 133-137.
- NIEBUHR,O. 1970. Die Vogel der Sudheide und der Aller-Niederung.-Erweiterte Artenliste. *Celler Ber. Vogelkde.* H.1.
- NIEHUIS,M. 1979. Bemerkung zur "Roten Liste" der bestandsgefährdeten Vogel in Rheinland-Pfalz. *Pfalzer Heimat* 30: 81-86.
- NIERMANN,H.G. & ZIEGLER,G. 1975. Durchzug und Brutvorkommen der Laro-Limikolen im Nordteil des Altkreises Mindern/Westfalen. *Alcedo* 2: 1-33.
- NITSCH,G. 1969. Die Vogelwelt des Eggstatter Seengebietes. *Anz. orn. Ges. Bayern* 8: 321-348.
- NOTHDURFT,W. 1975. Vorkommen der Bekassine *Gallinago gallinago* (L.) im Westharz. *Beitr. Naturk. Niedersachs.* 28: 10-13.
- OAG MÜNSTER. 1977. Einfluss der Biotope-Pessimierung auf die Rast- und Brutbestände einiger Limikolen und Anatides in den Rieselfeldern der Stadt Münster. *Alcedo* 4: 35-52.
- OAG NORDBAYERN. 1976. Die Bedeutung des Altmühltales für die Vogelwelt. *Garten und Landschaft* 2: 79-81.
- OAG OSTBAYERN. 1978. Lebensraum Donautal. Ergebnisse einer ornitholo-ökologischen Untersuchungen zwischen Straubing und Vilshofen. *Schriftenreihe Naturschutz Landschaftspflege* H.11.
- OELKE,H. 1972. Brutvorkommen der Waldschneepfe (*Scolopax rusticola*) im Peiner Moranen- und Lossgebiet. *Vogelk. Ber. Niedersachs.* 4: 45-46.
- OELKE,H. 1968. Vogel auf dem Grossen Knechtsand. *Falke* 15: 342-351, 372-377.
- OPITZ,H. 1982. Bestand und Bestandsentwicklung des Grossen Brachvogels (*Numenius arquata*) in Baden-Württemberg. *Beih. Veroff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 25: 15-31.
- OVEN,I.VON & MERTENS,E. 1974. Kein Platz für unsere Seevogel? *DBV-Mitt. Landesverband Schleswig-Holstein* 2174: 15-18.
- PANZER,W. & RANHE,H. 1978. Die Vogelwelt an Elb - und Wesermündung. Verlag der Männer vom Morgenstern, Bremerhausen.
- PANZKE,C. 1975. Kritischer Beitrag über die Entwicklung des Naturschutzgebietes Rantum-Becken. *Sylt Biol. Abh.* 4: 117-135.
- PANZKE,C. 1980. Der Brutverlauf beim Sabelschnabler (*Recurvirostra avosetta*) 1977 in der Leybucht. *Vogelk. Ber. Niedersachs* 12: 1-10.
- PEITZMEIER,J. 1941. Biotopstudien an Vogeln in Westfalen. *Orn. Mitt.* 49: 74-78.
- PEITZMEIER,J. 1951. Bestandsschwankungen des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius curonicus* GM) in Westfalen. *Natur und Heimat* 11: 65-67.
- PEITZMEIER,J. 1961. Die Brutvogelfauna der Nordseeinsel Borkum. Abh. *Landesmus. Naturk. Münster/Westf.* 23: 1-39.
- PEITZMEIER,J. 1969. Avifauna von Westfalen. *Münster/Westfalen.*
- PEITZMEIER,J. 1979. Avifauna von Westfalen. 2. Aufl. Abh. *Landesmus. Naturkd. Münster/Westf.* 41.
- PETERSEN,R. & PETERSEN,C. 1976. Die Vogelarten eines Klarteichgebietes an der Nahe bei Sobernheim. *Beitr. Landspfl. Rhld-Pfalz* 4: 50-55.

- PICKEL,R. 1978. Einige bemerkenswerte Limikolen brüten im Raum Hachenburg-Westerwalder Seenplatte. *Beitr. Landspfl. Rhld.-Pfalz* 6:97.
- POLTZ,W. 1977. Bestandsentwicklungen bei Brutvögeln in der Bundesrepublik Deutschland. Kilda, Greven.
- PRANGE,F. 1970. Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) im Enarepe-Ruhr-Kreis. *Orn. Mitt.* 22:66.
- PRAUSE,H. 1979. Wedeler Marsch 1978. *Mitteilungsblatt DBV Hamburg, Sonderheft* 7: 20-24.
- PUTTGER,A. 1978. Flussuferläufer (*Tringa hypoleucos*) brütet in Holstein. *Corax* 6: 40-41.
- QUEDENS,G. 1974. Das Tierleben der Insel Amrum. Eine Übersicht. *Nordfriesland* 8: 49-56.
- QUEDENS,G. 1976. Die Amrumer Natur 1975. Der Mensch in der Inselnatur. *Nordfriesland* 10: 15-17.
- QUEDENS,G. 1977. Die Amrumer Natur. Beobachtungen 1976. *Nordfriesland* 11: 25-27.
- RADERMACHER,W. 1977. Die Vogelwelt im Bergischen Land im Raume Neunkirchen-Seelscheid. *Beitr. Avifauna Rheinland* H.9, 176 pp.
- RANFTL,H. 1977. Beiträge zur Avifauna des Ampermooses. *Anz. orn. Ges. Bayern* 16: 177-185.
- RANFTL,H. 1982. Zur Situation des Grossen Brachvogels (*Numenius arquata*) in Bayern. *Beih. Veroff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Wurtt.* 25: 45-60.
- RANFTL,H. 1983. Zum Brutvorkommen des Flussregenpfeifers *Charadrius dubius* in Nordbayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 22: 103-106.
- RANFTL,H. 1983. Der Brutbestand des Grossen Brachvogels *Numenius arquata*, der Uferschnepfe *Limosa limosa* und des Rotschenkels *Tringa totanus* 1982 in Nordbayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 22: 107-110.
- RAUHE,H. 1949. Die Vogelwelt zwischen Niederspalte und Wesermündung (Land Hadeln und Nachbargebiete). *Orn. Abh. H.4.*
- RAUHE,H. 1958. Erstmaliger Brutnachweis des Stelzenlaufers (*Himantopus himantopus*) in Niedersachsen. *Orn. Mitt.* 10: 208-212.
- RAUNEKER,W. 1966. Die Vogelwelt der Illeranen vom Stausee Kellmünz bis Ulm. *Beitr. Avifauna Ulmer Raum* 7: 76-99.
- REICHHOLF,J. 1971. Erster Brutversuch des Sabelschnäblers (*Recurvirostra avosetta*) in Bayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 10: 184-186.
- REICHHOLF,J. 1978. Rasterkartierung der Brutvogel im sudostbayerischen Imtal. *Garmischer vogelk. Ber.* 4: 1-56.
- REICHHOLF,J. & UTSCHICK,H. 1977. Die Brutvogel der Salzachmündung. *Garmischer vogelk. Ber.* 2: 41-48.
- REICHLING,H. 1922. Die Verbreitung der Schwarzschnäbeligen Uferschnepfe *Limosa limosa* L., im nördlichen Westfalen und den angrenzenden Gebieten. *Jb. f. Jagdk.* 6: 81-106.
- REICHLING,H. 1932. Beiträge zur Ornithologie Westfalens und des Eurolandes. *Abh. Westf. Prov. Mus. f. Naturk.* 3: 307-362.
- REISER,K.-H. & HEIN,K. 1974. Zum Vorkommen und zur Brutbiologie des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius*) in Schleswig-Holstein. *Corax* 5: 9-30.
- REITMANN,C.J. 1974. Unsere Schutzarbeit auf der Hamburger Hallig. *DBV-Mitt. Landesverband Schleswig-Holstein* 1: 12-14.
- RETTIG,K. 1962. Zur Avifauna des Kreises Burgdorf/Hannover. *Ber. Naturhist. Ges. Hann.* 106: 79-107.
- RETTIG,K. 1963. Nachtrag zur Arbeit über die Vogelwelt des Kreises Burgdorf/Hannover. *Ber. Naturhist. Ges. Hann.* 107: 95-100.
- RETTIG,K. 1970. Aus der Brutvogelwelt Nordwest-Ostfrieslands im Jahre 1969. *Orn. Mitt.* 22:100.
- RETTIG,K. 1971. Die Vogelwelt an der Nordostseite des Dollarts. *Mitt. AG Ostfries. Landschaft* 2: 78-82.
- RETTIG,K. 1971. Baustein zur Avifauna im Nordwestteil Ostfrieslands. *Mitt. AG Ostfries. Landschaft* 2: 104-122.
- RETTIG,K. 1973. Avifaunistische Besonderheiten aus dem Nordwestteil Ostfrieslands. *Beitr. Naturk. Niedersachs.* 26: 97-99.
- RETTIG,K. 1973. Die Knock - ein Vogelparadies an der Emsmündung. *Orn. Mitt.* 25: 207-215.
- RETTIG,K. 1977. Zum Brutvorkommen des Sandregenpfeifers (*Charadrius hiaticula*) und des Seeregengräfers (*Charadrius alexandrinus*) in der Leybucht. *Orn. Mitt.* 29: 172-173.
- RETTIG,K. 1978. Die Brutvogel der Nordseeinsel Juist im Jahre 1978. *Orn. Mitt.* 30: 270-272.
- RIEDEL,B. 1978. Avifaunistischer Jahresbericht 1976 für die Schlammteiche der Zuckerfabrik von Norden-Hardenberg. *Faun. Mitt. Sud-Niedersachs.* 1: 75-92.
- RIEDER,M. 1976. Die Auswirkungen eines Modellflugplatzes bei Unterwattenbach (Landkreis Landshut) auf die Brutvogelwelt dieses Gebietes. *Naturwiss. Zeitschr. Niederbayern (Ber. naturwiss. Ver. Landshut)* 26: 13-19.
- RINGE,F. 1973. Zum Status und zur Brutbiologie des Flussregenpfeifers *Charadrius dubius* SCOPOLI im Kreise Osnabrück. *Osnabrucker Naturwiss. Mitt.* 2: 89-100.
- RINGE,F. 1977. Die Vogelwelt des "Altkreises" Osnabrück - eine Darstellung in tabellarischer Form. *Osnabrucker Naturwiss. Mitt.* 5: 73-93.
- RINGLEBEN,H. 1949. Vom Vogelleben auf der Insel Neuwerk. *Wald und Wisch* 2: 128-131.
- RINGLEBEN,H. 1975. Über unbeständige Brutvorstöße nach Niedersachsen und Ansiedlungen gebietsfremder Vogel in diesem Lande. II. Teil: Non-Passeriformes. *Vogelk. Ber. Niedersachs.* 7: 32-39.
- RITTINGHAUS,H. 1977. Oldeooog - Perspektiven eines Seevogelschutzgebietes. *Orn. Mitt.* 29: 211-217.
- ROI,O.LE. 1906. Die Vogelfauna der Rheinprovinz. *Verhandl. Naturhist. Verein der preuss. Rheinlande und Westfalens* 63: 1-325.
- ROTH,H.J. 1973. Die Westerwalder Seenplatte. *Schriftenreihe "Rheinische Landschaften"* 2/3.
- RUGER,A. 1976. In Schleswig-Holstein gefährdete sowie seltene Vogelarten und deren Lebensräume ("Rote Liste"). *Corax* 5: 151-160.
- RUGER,A. 1976. In Schleswig-Holstein gefährdete sowie seltene Vogelarten und deren Lebensräume - "Rote Liste". *Die Heimat* 83: 303-308.
- RUTHKE,P. 1975. Westerhever Sand und seine Brutvogel. *Corax* 5: 130-135.
- RUTTGERS,C. 1977. Die Bedeutung eines künstlichen Feuchtbiotop - als Brut- und Rastplatz zahlreicher Vogelarten. *Staatsexamensarbeit. (Unpubl. thesis).*
- SANDELMANN,H. 1978. Vogelhüllig Norderoog. *Naturschutz und Nationalparke* 89: 39-46.
- SARTORIUS,K. 1952. Über das Vorkommen des Flussregenpfeifers im nordwestdeutschen Flachland. *Orn. Mitt.* 4: 121-127.
- SARTORIUS,K. 1953. Der Austernfischer im Gebiet der Ems-Weser-Niederspalte. Oldenb. *Naturk. Blätter* H.2, Oldenburg.

- SARTORIUS,K. 1954. Die Uferschnepfe (*Limosa limosa*), ihre Verbreitung im nordwestdeutschen Flachlande. *Oldenb. Jb.* 54: 65-93.
- SCHAFFER,J. 1978. Die Vogelwelt des Oberhauser Riedes. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 20.
- SCHAFFER,J. 1979. Zur Siedlungsdichte in einem Flachmoor bei Illertissen. *Garmischer Vogelk. Ber.* 5: 21-31.
- SCHAFFER,K.J. 1968. Über den Brutbestand der Uferschnepfe (*Limosa limosa* L.), des Grossen Brachvogels (*Numenius arquata*) und des Kiebitzes (*Vanellus vanellus* L.) in den Wiesen zwischen Hansdulmen und Maria Veen. *Natur und Heimat* 28: 82-84.
- SCHARFF,G. 1982. Über die Bedeutung des Wiesenbewuchs in Brachvogel-Brutgebieten. *Beih. Veroff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Wurtt.* 25: 33-43.
- SCHERNER,E.-R. 1966. Die Vogel des Wolfsburger Raumes. Wolfsb. Orn. Beitr., Heft. 1.
- SCHERNER,E.-R. 1980. Vogel und Umwelt im Soiling. *Faun. Mitt. Sud-Niedersachs.* 3: 1-240.
- SCHIEMANN,H. 1959. Zum Brutnachweis des Stelzenlaufers (*Himantopus himantopus*) vom Funfsee. *Orn. Mitt.* 21:206.
- SCHIEMANN,H. 1975. Vogelwelt in und um Koblenz. Koblenz.
- SCHLEEF,P. 1973. Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) als Brutvogel im Baumschulgelande. *Jahrbuch für den Kreis Pinneberg* 1973: 193-197.
- SCHLEMMER,R. 1982. Ergebnisse einer ornitholo-ökologischen Untersuchung im Isartal zwischen Gottfrieding und Plattling. *Jahresber. Orn. A.G. Ostbayern* 9: 1-121.
- SCHLENKER,R. 1966. Die Brut- und Gastvogel in den Schutzgebieten des Vereins Jordsand 1963 und 1964. *Jordssand-Mitt.* 2: 43-50.
- SCHLENKER,R. 1977. Zu: "Schwedischer Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*) brutet auf Spiekeroog". *Vogelk. Ber. Niedersachs.* 9: 11-12.
- SCHLÖTTER,H. 1927. Der Austernfischer als Brutvogel an der Eins. *Beitr. Fortpfl. biol. Vogel* 3:168.
- SCHMITT,G.A.J. 1976-77. Aktuelles vom Seevogelschutz an der Nord- und Ostseeküste. *Die Heimat* 83: 224-230, 84: 46-51.
- SCHMIDT,G.A.J. & BREHM,K. 1974. Vogelleben zwischen Nord- und Ostsee. Wachholz, Neumünster.
- SCHMIDT,H.-J. 1981. Brutinweise für den Rotschenkel *Tringa totanus* L. in der "Rohrlache von Heringen" 1979, Kreis Hersfeld-Rotenburg. *Vogel und Umwelt* 1: 183-185.
- SCHNEIDER,U. 1980. Hallig Norderoog - zur Situation des vereinseigenen Seevogelschutzgebiets. *Seevogel* 1: 33-37.
- SCHNEIDER,H. & SCHNEIDER,P. 1970. Bestandsaufnahme des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius*) in Nordbayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 9: 105-119.
- SCHNICKERS,E. & EBERHARDT,D. 1960. Vogel der Bislicher Insel. *Gewässer und Abwasser* 28: 1-73.
- SCHOENNAGEL,E. 1964. Austernfischer (*Haematopus ostralegus*) brutet im Kreis Minden. *Orn. Mitt.* 16: 237.
- SCHOENNAGEL,E. 1972. Die Vogelwelt der Nordseeinsel Borkum im Dichtesakularer Bestandsveränderungen. *Orn. Mitt.* 24: 135-152.
- SCHOENNAGEL,E. 1974. Bemerkenswerte Brut- und Gastvogel auf Borkum in den Jahren 1972-1974. *Orn. Mitt.* 26: 191-212.
- SCHOENNAGEL,E. 1975. Ornithologische Notizen aus dem Gebiet der Ober- und Mittelweser. *Orn. Mitt.* 27: 141-143.
- SCHOENNAGEL,E. 1978. Naturschutzgebiet "Lutjehorn". *Orn. Mitt.* 30:22.
- SCHOENNAGEL,E. 1978. Zur Brutvogelfauna der Nordseeinsel Borkum. *Orn. Mitt.* 30:22.
- SCHOSSLER,W. 1965. Neue Flussregenpfeifer-Vorkommen im Hessen und einige brutbiologische Daten von *Charadrius dubius*. *Luscinia* 38: 102-103.
- SCHOFF,E. 1957. Brutnachweis des Flussuferlaufers an der Eder. *Vogelring* 26: 7-9.
- SCHREIBER,M. 1982. Brutversuch des Sandregenpfeifers (*Charadrius hiaticula*) im Landkreis Osnabrück. *Vogelk. Ber. Niedersachs.* 14:14.
- SCHREINER,J. 1975. Die Avifauna der Donauaue zwischen Regensburg und Straubing und ihre Gefährdung durch die geplanten technischen Grossprojekte in deisen Raum. Manuskript, Eigendruck im Selbstverlag.
- SCHREINER,J. 1980. Vogelbiotop Wiese. Bestandsaufnahmen indikatorisch bedeutsamer Arten in Ostbayern. *Schriftent. Naturschutz und Landschaftspfl.* 12: 171-185.
- SCHUBERT,W. 1970. Zur Brutvogelwelt des unteren Isar. *Anz. orn. Ges. Bayern* 9: 134-139.
- SCHUCKING,A. 1974. Zur Verbreitung und Brutbiologie des Flussregenpfeifers im Raum Hagen/Westf. *Natur und Heimat* 33: 76-81.
- SCHUHMANN,H.-U. 1979. Der Sommervogelbestand von sechs kiesgruben (75 ha) am Ostrand Hamburgs. *Hamb. avifaun. Beitr.* 16: 9-18.
- SCHULZ,H. 1943. Der Brutbestand des Sabelschnablers (*Recurvirostra a. avosetta* L.) an unseren Küsten. *Orn. Mber.* 51:13.
- SCHULZ,H. 1952. Brutbericht des Vereins Jordsand für das Jahr 1951. *Vogelwelt* 73: 25-27.
- SCHWARTHOFF,H. 1974. Vogel im Julicher Land. Versuch einer Gebietsavifauna. Mit einen Beitrag von Wilfried Moll. Beitr. Avifauna Rheinland. H.4, Düsseldorf.
- SEITZ,J. 1975. Die Wummeniederung. Ein wichtiger Lebensraum für bedrohte Vogelarten. Eine quantitative Übersicht über in der Bundesrepublik Deutschland gefährdete Brut- und Gastvogel in der Wummeniederung. *BNG Informationen* 1/75, Mitt. d. Bremer Naturschutz-Ges. e.V.: 13:20.
- SIEBOLD,D. 1969. Brutplätze des Kiebitz - *Vanellus vanellus* - im Werratal. *Luscinia* 40:260.
- SIEBOLD,D. 1972. Limikolen im Werratal bei Heringen (Kreis Hersfeld/Rotenburg). *Luscinia* 41: 243-245.
- SIMON,L. 1981. Bruten des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius*) in der Vorderpfalz. *Naturschutz Ornithologie Rheinland-Pfalz* 2: 190-192.
- SIMON,L. 1982. Grosser Brachvogel (*Numenius arquata*) - verbreitung und Habitatgefährdung in Rheinland-Pfalz. *Beih. Veroff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Wurtt.* 25: 65-69.
- SISCHKA,N. 1973. Zum Brutvorkommen des Grossen Brachvogels - *Numenius arquata* - in der Pfalz. *Emberiza* 2:182.
- SODING,K. 1953. Vogelwelt der Heimat. Recklinghausen.
- SODING,K. 1958. Ein weiterer Beitrag zum Brutvorkommen der Uferschnepfe (*Limosa limosa*) und des Grossen Brachvogels (*Numenius arquata*) in den kunstwiesen zwischen Hausdulmen und Maria-Veen. *Natur. und Heimat* 18: 5-9.

- SODING,K. 1965. Die Vogelwelt im Gebiet des Halterner Stausees. *Natur und Landschaft im Ruhrgebiet* 2: 51-133.
- SPEICHER,K. 1968. Brut vom Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) bei Griesborn. *Faunist. florist. Notizen aus dem Saarland* 1: 7-8.
- SPICKENREUTHER,E. 1979. Die Vogelwelt der Pfrentscheiherwiesen und der angrenzenden Waldgebiete von 1975-1978. *Jahresber. Orn. A.G. Ostbayern* 6: 42-46.
- STAATLICHE VOGELSCHUTZWARTE FÜR HESSEN, RHEINLAND-PFALZ UND SAARLAND. 1976. Rote Liste der Bestandsgefährdeten Vogel in Hessen (Stand 1.3.1976). *Luscinia* 43: 62-65.
- STAUDE,J. 1976. Neuer Brutnachweis der Bekassine (*Gallinago gallinago*) im Gebiet der Westerwalder Seenplatte. *Orn. Mitt.* 28: 40-41.
- STEINIGER,F. 1963. Zur Frage des Goldregenpfeifer-Schutzes. *Beitr. Naturk. Niedersachs.* 16: 2-9.
- STICHMANN,W. 1957. Bemerkenswertes aus der Ornis von Hamm (Westf.) und Umgebung. *Orn. Mitt.* 9: 29-32.
- STICHMANN,W. & STICHMANN-MARUG,U. 1967. Die Uferschnepfe-Vorkommen im Bereich des Messtischblattes 3807 (Alstatte, Krs. Ahaus). *Natur und Heimat* 27: 59-65.
- STICKEL,W. 1966. Zum Vorkommen der Limikolen im Gebiet der Arbeitsgemeinschaft Eifelvogel. *Charadrius* 2: 13-34.
- STOPPE,H. 1956. Der Austernfischer (*Haematopus ostralegus L.*) Brutvogel bei Bocholt in Westfalen. *Natur und Heimat* 26: 62-63.
- STOPPE,H. 1963. Der Austernfischer, Brutvogel bei Bocholt. *Niederhuis* 30: 68-69.
- STREHLOW,J. 1982. Die Vogelwelt des Summerseegebietes 2. Ergänzungsbericht 1976-1980. *Anz. orn. Ges. Bayern* 21: 43-86.
- STRUWE,G. 1983. Zum Brutvorkommen des Steinwalzers (*Arenaria interpres*) an der westküste Schleswig-Holsteins. *Corax* 9: 239-240.
- STUVEN,K. 1970. Uferschutzarbeiten zur Erhaltung des Seevogelschutzgebietes Hallig Norderoog. *Intern. Rat Vogelsch.* 10: 41-44.
- SZIJJ,J., ERZ,W. & PRETSCHER,P. 1974. Feucht-gebiete von internationaler Bedeutung für Watt- und Wasservogel in der Bundesrepublik Deutschland. *Orn. Mitt.* 26: 239-258.
- TANZEN,R. 1939. Die Brutvogel des Naturschutzgebietes auf Wanderooge 1938. *Oldbg. Jb.* 43: XIII.
- TANZEN,R. 1954. Die Seevogelschutzgebiete an der Jade- und Wesermündung. *Orn. Mitt.* 6: 120-125.
- TANZEN,R. 1953. Millum 1951. *Orn. Mitt.* 5: 50-52.
- TEMME,M. 1974. Vogelfreistatte Scharhorn. *Jordsand-Mitt.* 3: 1-165.
- THIEDE,W. & BRUNS,H. 1966. Die Verbreitung des Rotschenkels, *Tringa totanus* (L.), in Niedersachsen. *Biol. Abh.* 31.
- THIELCKE,G. 1951. Beobachtungen und Feststellungen am Seeregenpfeifer. *Vogelwelt* 72: 185-188.
- THEISS,N. & DIETER,F. 1983. Brutnachweise des Flussuferläufers *Actitis hypoleucus* 1982 im oberen Maintal. *Anz. orn. Ges. Bayern* 22: 221-222.
- THIENEL,F. 1981. Beobachtungen von Stelzenläufern (*Himantopus himantopus*) bei Bobenheim-Roxheim. *Naturschutz Ornithologie Rheinland-Pfalz* 2: 192-193.
- TILLMANNS,W. 1965. Brutnachweise von Austernfischer, Flussregenpfeifer, Uferschnepfe, Trauerseeschwalbe und Flusssseeschwalbe bei Emmerick-Huthum. *Charadrius* 1: 47-48.
- TILLMANNS,W. 1979. Brutnachweise des Sabelschnablers (*Recurvirostra avosetta*) im Rheinland. *Charadrius* 15:131.
- TIMMERMANN,G. 1972. Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) brutet in Schleswig-Holstein. *Orn. Mitt.* 24:223.
- TRELLINGER,K. & LUCE,J. 1976. Die Vogelwelt der Stauseen der mittleren Isar zwischen Landshut und Moosburg. *Naturwiss. Zeitschr. Niederbayern (Ber. naturwiss. Ver. Landshut)* 26: 52-114.
- TRELLINGER,J. & LUCE,J. 1977. Die Vogelwelt der Stauseen der mittleren Isar zwischen Moosburg und Landshut. *Anz. orn. Ges. Bayern* 10: 123-155.
- VAUK,G. 1972. *Die Vogel Helgolands.* Parey, Hamburg & Berlin.
- VAUK,G. 1973. Seltene Gaste, Ingäste und Bemerkungen zu den Brutvögeln Helgolands, 1972. *Vogelwelt* 94: 146-154.
- VAUK,G. 1978. Brut des Waldwasserläufers (*Tringa ochropus*) im Kreis Elle. *Beitr. Naturk. Niedersachs.* 31:51.
- VAUK,G. 1980. Ein weiterer Brutplatz des Waldwasserläufers (*TRinga ochropus*) im Kreis Elle. *Beitr. Naturk. Niedersachs.* 33: 97-98.
- VIDAL,A. 1972. Ein Neuer Brutplatz des Rotschenkels (*Tringa totanus*) im bayerischen Domautal. *Anz. orn. Ges. Bayern* 11:317.
- VIDAL,A. 1973. Die Vogelwelt des Oberpfälzer Donautales und ihre Bedrohung durch technische Projekte. *Anz. orn. Ges. Bayern* 12: 65-79.
- VIDAL,A. 1976. *Die Vogelwelt des Anwaldgebietes Pfatter-Johannishof.* Vogelbiotope Bayerns, Dokumentation Nr. 11. Woodcock data.
- VIDAL,A. 1980. Die Vogelwelt der Donauauen Pfatter-Gmund/Ldkrs. Regensburg. *Jahresber. Orn. A.G. Ostbayern* 7: 1-104.
- VIDAL,A. & SCHREINER,J. 1974. Bestandsaufnahme von Grossen Brachvogel (*NUmenius arquata*), Uferschnepfe (*Limosa limosa*) und Rotschenkel (*Tringa totanus*) im Donautal zwischen Regensburg und Deggendorf. *Jber. orn. AG Ostbayern* 2: 12-13.
- VIERTEL,K. 1975. *Die Vogelwelt der Krombachtaalsperre.* Montabaur.
- WARNCKE,K. 1970. Limikolen - und Grauammer brutvorkommen im Raum zwischen München und der Donau 1969. *Ber. Naturw. Ver. Schwaben* 74: 66-71.
- WEBER,H. 1949b. Neue Brutvorkommen im Naturschutzgebiet Zwillbrocker Venn. *Natur und Heimat* 9: 19-22.
- WEBER,H. 1949b. Der Radbodsee als Brutgebiet seltener Sumpf- und Wasservogel. *Natur und Heimat* 9: 40-46.
- WEISSKOPPEL,P. 1975. *Die Vogelwelt am Steinhuder Meer und in seiner weiteren Umgebung.* Wunstorf.
- WEISSKOPPEL,P. 1981. Der Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) als Brutvogel bei Hannover. *Vogelkd. Ber. Niedersachs.* 13: 13-14.
- WENDLAND,V. 1971. *Die Wirbeltiere Westberlins.* Berlin.
- WESTERMANN,K. & SAUMER,F. 1970. Die Vogel des Landschaftsschutzgebietes. Tambergussen und einiger angrenzender Gebiete. *Mitt. Bad. N.F.* 10: 375-415. On Common Sandpipers.
- WESTPHAL,U. 1979. "Untere Seeveniederung" 1978. *Mitteilungsblatt DBV Landesverband Hamburg, Sonderheft* 7: 53-58.
- WEYERS,H. 1971. Die Avifauna des Kiesgrubengebietes bei Bliesmelen-Bolchen. *Abh. Arbgem. tierpflanzengeogr. Heimatforsch. Saarland* 3: 32-56.
- WINKLER,R. 1974. Mehr Schutz für die Strandzone. *DBV-Mitt. Landsverband Schleswig-Holstein* 2174: 9-13.

- WILLE,U. 1971. Jahresubersicht 1969/70. *Charadrius* 7: 17-27.
- WINCHENBACH,R., SCHREIBER,K. & FRANZ,A. 1972. Erstnachweis einer Flussregenpfeiferbrut im Siegerland. *Anthus* 9: 83-84.
- WISMATH,R. 1974. Die Vogelwelt des Alt-Landkreises Fussen. *Naturwiss. Mitt. Kempten-Allgau* 18(1): 42-52.
- WISMATH,R. 1977. Die Vogelwelt des Alt-Landkreises Fussen, 2. Teil. *Mitt. Naturwiss. Arb. Kr. Kempten* 21/1: 17-28.
- WITTENBERG,J. 1965. Brut des Stelzenlaufers (*Himantopus himantopus*) bei Braunschweif. *Vogelwelt* 86: 123-124.
- WO-G. 1974. Die in Westfalen gefahrdeten Vogelarten. *Alcedo* 1: 82-87.
- WOIKEWITSCH,R. 1974. Brut des Flussuferlaufers (*Tringa hypoleucus*) im Sudosten des Hamburger Berichtsgebietes. *Vogel und Heimat* 23:237.
- WOLF,A. 1981. Die Vogelwelt der Heidenaabau zwischen Etzenricht und Weiherhammer. *Jahresber. Orn. A.G. Ostbayern* 8: 77-83.
- WOLFF,G. 1959. Flussuferlaufer (*Actitis hypoleucus*) an einem Tumpel immerhalb eines Fabrikgrundstückes. *Orn. Mitt.* 11:35.
- WUST,W. 1962. Prodromus einer Avifauna Bayerns. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 305-358.
- WUST,W. 1982. Avifauna Bavariae. Bd.1. *Gaviiformes-Charadriiformes*. Geiselberger, Altötting.
- ZACH,P. 1981. Bemerkenswerte Brutvorkommen im Rotelseegebiet 1980. *Jahresbr. Orn. A.G. Bayern* 8: 119-122.
- ZACH,P. 1982. Zur Vogelwelt des Rotelseeweihergebietes bei Cham (Oberpfalz) in den Jahren 1980 und 1981. *Jahresbr. Orn. A.G. Ostbayern* 9: 123-198.
- ZAJEC,H. 1971. Verzeichnis der Vogel von Aschaffenburg und seiner Umgebung. Zweite Ergenzung. *Nachr. Naturw. Ver. Aschaffenburg* 80: 51-57.
- ZIMMERMANN,K.D. 1972. Erster Brutnachweis für den Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) im Siegerland. *Siegerland* 49: 114-116.

## 6.60. EAST GERMANY

compiled by Arnd Stiefel

- ALBERT,P. 1970. Das NSG "Grosser Kobleutzer See". Ein erster Bericht über seine Vogelwelt. *Naturschutzarb. Meckl.* 13: 11-15.
- ALLMANN,R. 1969. Vogelbeobachtungen in der Riestedter Mulde (Kreis Sangerhausen). *Apus* 1: 287-289.
- BAUER,G. 1974. Seltene Beobachtungen am Alpenstrandlaufer. *Falke* 21: 169-171.
- BERGER,W. 1960. Neuer Brutnachweis des Sabelschnablers an Mecklenburgs Ostseeküste. *Beitr. Vogelkd.* 7: 59-62.
- BERNHARDT,P. 1949. Der Kiebitzbestand der letzten Jahrzehnte im Moritzburger Teichgebeit. *Beitr. Vogelkd.* 1: 21-26.
- BEUDT,R. & HOLZ,R. 1972. Zur Vogelwelt des geplanten NSG "Kooser Wiesen und Kooser See" bei Griefswald. *Naturschutzarb. Meckl.* 15: 17-21.
- BRANDT,H., GRUN,U. & KAHNT,J. 1981. Limikolendurchzug auf den Falkenberger Rieselfeldern im Nordosten Berlins. *Pica (Berlin)* 1: 44-47.
- BRENNING,U. 1960. Die Brutvogel der Vogelschutzinsel Langenwerder. *Naturschutzarb. Meckl.* 3(6): 16-22.
- BRIESEMEISTER,E. 1971. Der Bestand des Kiebitzes, *Vanellus vanellus*, in der Elbaue bei Magdeburg. *Apus* 2: 161-164.
- BRIESEMEISTER,E. 1974. Zum Brutbestand des Kiebitzes im Jahre 1972 in der madgeburger Elbaue und der Magdeburger Börde. *Apus* 3: 98-102.
- CONRAD,U., HOLZ,R. & SELLIN,D. 1979. Die Entwicklung des Limikolenbrutbestandes am südlichen Greifswalder Bodden von 1967 bis 1978. *Orn. Rundbr. Meckl.* 21: 56-72.
- CREUTZ,G. 1978. Die Verbreitung der Waldschneepfe in der DDR zur Brutzeit. *Unsere Jagd* 82-83.
- CZERLINSKY,H. 1961. Flussregenpfeifer im nordlichen Vogtland als Brutvogel. *Beitr. Vogelkd.* 7: 375-376.
- DEPPE,H.-J. 1977. Zur Geschichte des Brutvogelbestandes im ehemaligen Vogelschutzgebeit "Muritzhof". *Beitr. Vogelkd.* 23: 177-187.
- DICK,W. 1966. Limikolen um Annaberg-Buchholz (Erzgebirge). *Beitr. Vogelkd.* 12: 194-196.



- DITTBERNER,H. & DITTBERNER,W. 1969. Der Brutbestand des Kiebitzes (*Vanellus vanellus L.*) in Berlin. *Milu* 2: 433-453.
- DITTBERNER,H. & DITTBERNER,W. 1969. Die Vogelwelt des Rudersdorfer Rieselfeldes am Ostrand Berlins. *Milu* 2: 495-618.
- DITTBERNER,H. & DITTBERNER,W. 1970. Zur Brutvogelwelt des NSG Felchower See (Uckermark). *Falke* 17: 344-349.
- DITTBERNER,H. & DITTBERNER,W. 1975. Brutvorkommen und Massendurchzug des Kampflaufers im unteren Odertal. *Falke* 22: 82-87, 124-129.
- DITTBERNER,H. & DITTBERNER,W. 1975. Die ornithologische Bedeutung der Oderaue bei Schwedt (Bez. Frankfurt/Oder). *Naturschutzarb. Berlin u. Brandenburg* 11: 45-57.
- DITTBERNER,H. & DITTBERNER,W. 1979. Erfahrungen und Ergebnisse der Limikolenberingung auf Berliner Rieselfeldern. *Falke* 26: 194-203.
- DITTBERNER,H. & DITTBERNER,W. 1983. Zum Vorkommen der Pfuhlschnepfe (*Limosa limosa*) in der DDR. *Beitr. Vogelkd.* 29: 19-28.
- DITTBERNER,W. 1966. Die Avifauna des Wernsdorfer Sees bei Berlin. *Beitr. Vogelkd.* 12: 1-94.
- DORNBUSCH,M. & DORNBUSCH,C. 1977. Zu, Vorkommen des Mornell, *Eudromias morinellus* (L. 1758) im Hrubby Jesenik (Altvater-Gebige, CSSR). *Orn. Jber. Mus. Heineanum* 2: 15-17.
- DOST,H. 1958. Brutversuche von Sabelschnabler und Raubseeschwalbe auf Rügen. *Beitr. Vogelkd.* 5:322.

- DOST,H. 1960. Über den Schutz der Seevogel auf der Vogelinsel Heuwiese im Jahre 1959. *Falke* 7: 43-46.
- DOST,H. 1961. Die Vogelinsel Heuwiese im Jahre 1960. *Falke* 8: 198-202. Number of wader pairs.
- DOST,H. 1963. Über den Seevogelschutz auf Rügen 1961 und 1962. *Falke* 10: 81-87.
- EHRING,R. 1978. Ornithologische Beobachtungen im Seevogelschutzegebiet Insel Libitz (1964-1975). *Falke* 25: 297-303.
- EIFLER,G. 1981. Beobachtungen zur Biologie des Kiebitzes, *Vanellus vanellus*, in der Sudlausitz. *Actitis* 21: 4-13.
- FEILER,M. 1965. Zum Brutvorkommen des Flussuferläufers am Knappensee. *Falke* 12:282.
- FISCHER,H.-U. 1974. Avifaunistischer Jahresbericht aus dem Bezirk Erfurt für 1972. *Mitt. AG Avifauna Bez. Erfurt* 2: III-VII, 1-49.
- FISCHER,H.-U. 1974. Limikolen-Brutvorkommen im Bezirk Erfurt von 1965-1973. *Mitt. AG Avifauna Bezirk Erfurt* 2: 51-55.
- FLOSSNER,D. 1962. Eine Wiederansiedlung der Bekassine bei Olbernhau. *Falke* 9:212.
- FREIDANK,K. & PLATH,L. 1982. Zur Vogelwelt des Elbe-Havel-Winkels (Kreise Havelberg und Genthin). Kreisheimatmuseum Genthin, 100 pp.
- FRENZEL,K. 1972. Brutvorkommen des Austernfischers im Kreis Genthin. *Apus* 2: 280-281.
- GNIELKA,R. 1966. Die Vogel des Tagebaurestlochs Halle-Brückdorf. *Apus* 1: 65-74.
- GNIELKA,R. 1977. Avifaunistischer Jahresbericht 1974 für den Bezirk Halle. *Apus* 3: 25-39.
- GNIELKA,R. 1979. Avifaunistischer Jahresbericht 1975 für den Bezirk Halle. *Apus* 3: 97-112.
- GNIELKA,R. 1974. Die Vogel des Kreises Eisleben. *Apus* 3: 145-221.
- GNIELKA,R. 1983. Avifaunistischer Jahresbericht 1979 für den Bezirk Halle. *Apus* 5: 101-112.
- GNIELKA,R. 1983. Avifaunistischer Jahresbericht 1980 für den Bezirk Halle. *Apus* 5: 112-122.
- GNIELKA,R. 1983. Vogelwelt des Kreises Querfurt (Bez. Halle). Querfurt (Kulturbund), 40 pp.
- GNIELKA,R. & SPRETKE,T. 1982. Avifaunistischer Jahresbericht 1976 für den Bezirk Halle. *Apus* 3: 241-253.
- GNIELKA,R. & SPRETKE,T., et al. 1984. Avifauna von Halle und Umgebung. Natur und Umwelt, Halle.
- GRAUMANN,G., JAKEL,D., MULLER,S. & ZOLLIICK,H. 1980. Die Vogel des Naturschutzgebietes Bock und Hohe Dune von Pramort. Natur und Naturschutz in Mecklenburg 16: 5-79.
- GRIMM,H. 1970. Uferschnepfe brutete 1969 bei Seehausen, Kreis Artern. *Apus* 2: 92-93.
- GRIMM,P. 1975. Zur Vogelwelt der unteren Peeneniederung bei Anklam. *Falke* 22: 202-207.
- GROSSLER,K. 1981. Klarbeckenbeobachtung. *Actitis* (Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig, Karl-Marx-stadt u. Dresden) 20: 47-75.
- GROSSLER,K. & TUCHSCHERER,K. 1968. Beobachtungsbericht 1965. *Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig (Actitis)* 2: 6-79.
- GROSSLER,K. & TUCHSCHERER,K. 1969. Beobachtungsbericht 1966. *Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig (Actitis)* 3: 1-94.
- GROSSLER,K., TUCHSCHERER,K., SAEMANN,D. & WEISE,W. 1971. Beobachtungsbericht 1967. *Actitis* (Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig u. Karl-Marx-stadt) 5: 1-68.
- GROSSLER,K., TUCHSCHERER,K., SAEMANN,D. & WEISE,W. 1972. Beobachtungsbericht 1968 (Bezirke Leipzig, Karl-Marx-Stadt). *Actitis* (Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig u. Karl-Marx-stadt) 6: 1-128.
- GROSSLER,K. & TUCHSCHERER,K. 1975. Prodromus zu einer Avifauna des Bezirkes Leipzig. *Actitis* (Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig u. Karl-Marx-stadt) 10: 1-113.
- GROSSLER,K. & TUCHSCHERER,K. 1977. Beobachtungsbericht (Bezirk Leipzig) für die Jahre 1969-1972. *Actitis* (Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig u. Karl-Marx-stadt) 13: 3-101.
- GRUMMT,W. 1961. Brutvorkommen der Waldschnepfe bei Zwickau. *Beitr. Vogelkd.* 7:374.
- GUNTHER,R. 1981. Berichte zur Avifauna des Bezirkes. *Gera* 1981: 9-12.
- GUNTHER,R. & STREIFFLER,H. 1968. Die Vogelwelt der Karower und Bucher Teiche sowie einiger Rieselfelder im Norden Berlins. *Beitr. Tierwelt d. Mark V:* 69-135.
- GUNTHER,R., HEYER,J., LORENZ,L., et al. 1976. *Die Vogel im Gebiet der Plothener Teiche. Gera*, Sonderheft, 86 pp.
- HAASE,S. 1973. Rotschenkel brutete 1972 an den Fischteichen bei Auleben. *Thur. Orn. Runbr.* 21:21.
- HAENSEL,J. 1967. Einige Beobachtungen in Bornburg und Umgebung 1957/58. *Thur. Orn. Rundbr.* 11: 11-13.
- HAENSCHKE,W., HAMPE,H., et al. 1983. *Die Vogelwelt von Dessau und Umgebung. 1. Teil. Museum Naturkd. u. Vorgeschichte, Dessau*, 96 pp.
- HAENSEL,J., HANDTKE,K., KONIG,H. & SCHNEIDER,R. 1964. Der Einfluss der Vernassungserscheinungen 1961 auf die Vogelwelt im Grossen Bruch bei Oschersleben/Bode. *Beitr. Vogelkd.* 9: 402-419.
- HACKER,K. 1972. Der Kiebitz-Bestand der Friedlander Grossen Wiese. *Falke* 19: 230-234, 275.
- HANDKE,K. 1971. Die Avifauna des Naturschutzgebietes Wildenhainer Bruch. *Beitr. Vogelkd.* 17: 104-134.
- HANSEL,J. & KONIG,H. 1978. *Die Vogel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX: Charadriiformes* 156-199.
- HAPPATZ,M. 1966. Stelzenläuferbrut im Bezirk Magdeburg. *Falke* 13: 202-203.
- HASSE,H. & WOBUS,U. 1964. Der Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) - Brutvogel in der Oberlausitz. *Beitr. Vogelkd.* 9: 426-429.
- HAUFF,P. 1966. Die Vogelwelt des Naturschutzgebiets "Kuhlrader Moor und Roggeline See", Kreis Gadebusch. *Naturschutzb. Meckl.* 9: 25-32.
- HERZOG,G. 1978. Zum früheren Vorkommen des Triels (*Burhinus oedicnemus* (L.)) im Kreis Luckau. *Biolog. Studien Kreis Luckau* 7: 41-43.
- HEYDER,R. 1961. Zur Permanenz des Brutens des Mornellregenpfeifers (*Eudromias morinellus* L.) auf dem Riesengebirge. *Abh. u. Ber. Naturkundemus. Gorlitz* 37: 101-108.
- HEYDER,R. 1962. Nachtrage zur sächsischen Vogelfauna. *Beitr. Vogelkd.* 8: 1-106.
- HEYDER,R. 1962. Nachlese zur Verbreitung und Biologie des Mornellregenpfeifers (*Eudromias morinellus* L.) *Zool. Abh. u. Ber. Mus. Tierkd. Dresden* 26: 103-111.
- HEYDER,R. 1969. Zur Klarstellung früherer Mornellverbreitung. *Beitr. Vogelkd.* 15: 85-86.
- HEYER,J. 1968. Die Limikolen am Hohenfeldener Stausee 1967. *Thur. Orn. Rundbr.* 12: 21-23. HEYER,J. 1977. Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt um Reuthendorf. *Thur. Orn. Mitt.* 23: 31-36.
- HEYDER,R. 1960. Die Sudereale des Morellregenpfeifers (*Eudromias morinellus* L.) in Europa. *Zool. Abh. u. Ber. Mus. Tierkd. Dresden* 25: 47-70.
- HEYMER,A. 1955. Kiebitzbruten im Speicherbecken Windischleuba. *Falke* 2:212.

- HILDEBRANDT,H. & SEMMLER,W. 1978. Ornithologische Beobachtungen am Thüringer See. Teil 3. *Thür. Orn. Mitt.* Sonderheft 4: 1-71.
- HOENE,J. 1982. Die Brutvogel der Cumbacher Teiche, Kreis Gotha, 1965-1979. *Thür. Orn. Mitt.* 29: 1-72.
- HOLUPIREK,H. 1970. Die Vogel des hohen Mittelerzgebirges. *Beitr. Vogelkd.* 15: 105-182.
- HOLUPIREK,H. & DICK,W. 1964. Der Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) als Brutvogel des oberen Erzgebirges. *Beitr. Vogelkd.* 9: 451-452.
- HOLUPIREK,H. 1976. Zum Bruten des Flussregenpfeifers im Bezirk Karl-Marx-Stadt. *Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkde Dresden* 6: 55-68.
- HOLZ,R. 1982. Unser Kustenvogelschutz im Überblick. *Meer und Museum (Stralsund)* 3: 12-21.
- HOLZ,R. & SELLIN,D. 1981. Untersuchungen zur Verbreitung und Ökologie der Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*) in Nordostmecklenburg (DDR) mit Hilfe der Rasterkartierung. *Zool. Jb. Syst./Okol.* 108: 36-50.
- HOYER,E. 1975. Über den Brutvogelbestand der Insel Koos bei Greifswald 1972 und 1973. *Falke* 22: 196-199.
- JAHN,G. 1971. Austernfischerbrut bei Wittenberge an der Elbe. *Apus* 2: 191-192.
- KAISER,W. 1960. Die Lewitz als Vogelschutzgebeit. *Naturschutzarb. Meckl.* 3: 31-35.
- KAISER,W., KOBUS,S., WULF,J. & ZIMMERMANN,H. 1969. Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt der Lewitz. *Naturschutzarb. Meckl.* 12: 15-30.
- KAISER,W., RICHTER,E. & ZUPKE,U. 1978. Die Vogel des Barniner Sees und seiner Umgebung. *Orn. Rundbr. Meckl.* 19: 18-24.
- KALBE,L. 1970. Zum Vorkommen von Limikolen an Abwasserteichen bei Nauen (Bez. Potsdam) in den Jahren 1962-1967. *Beitr. Tierwelt Mark VI*: 31-46.
- KALBE,L. & SEEGER,J.-J. 1972. Das Vorkommen der Uferschnepfe (*Limosa limosa*) in Brandenburg. *Beitr. z. Tierwelt d. Mark (Potsdam)* IX: 95-117.
- KANTHAK,H. 1982. Waldschnepfenbrut bei Coswig. *Falke* 29:30.
- KARLSTEDT,K. 1969. Ornithologische Beobachtungen 1967 am Helmestausee bei Berga-Kalbra. *Apus* 1: 257-269.
- KARLSTEDT,K. 1970. Ornithologische Beobachtungen 1968 am Helmestausee bei Berga-Kalbra. *Apus* 2: 67-74.
- KATZER,B. & BAESELER,M. 1978. Ornithologische Notizen aus dem Kreis Sonneberg. *Thür. Orn. Mitt.* 24: 17-30.
- KEIL,H. 1971. Flussuferläufer brütete erfolgreich an der Mittelelbe. *Apus* 2:194.
- KINTZEL,W. & MEWES,W. 1976. Die Vogelwelt des Kreises Lubz. *Natur. u. Naturschutz Meckl.* 14: 1-120.
- KLAFS,G. & STUBS,J. 1977. Die Vogelwelt Mecklenburgs. Jena, 358 pp.
- KLAMMER,G. 1983. Sabelschnabler im Saalkreis. *Apus* 5:144.
- KNOBLOCH,H. 1961. Die Waldschnepfe in der Sudlausitz. *Beitr. Vogelkd.* 7: 280-284.
- KOBOLDT,O. 1967. Über eine Brut des Flussregenpfeifers bei Treffurt. *Thür. Orn. Rundbr.* 10: 1-2.
- KOBOLDT,M. 1967. Über eine Brut des Flussregenpfeifers bei Treffurt. *Thür. Orn. Rundbr.* 10: 1-2.
- KOBOLDT,M. 1967. Über eine Brut des Flussregenpfeifers bei Treffurt. *Thür. Orn. Rundbr.* 10: 1-2.
- KOBOLDT,M. 1980. Die Vogelwelt der Kreise Grimma, Oschatz und Genthin. *Aquila - Sonderheft, Teil II*, 187 pp.
- KONIG,H. 1969. Der Brutvogelbestand einer Kontrollfläche in der Lenzener Wische (Kreis Ludwigslust) im Jahre 1965. *Mitt. IG Avifauna* 2: 43-58.
- KONIG,H. 1975. Avifaunistischer Jahresbericht 1973 für den Nordharz und das nördliche Vorland. *Mitt. IG Avifauna DDR* 7: 19-52.
- KONIGSTEDT,D. & NICOLAI,B. 1972. Zur Kenntnis der Avifauna des Kreises Burg. *Naturkd. Jber. Mus. Heineanum VII*: 43-80.
- KRAATZ,S. & WEGNER,W. 1969. Zwei erfolgreiche Triebbruten im Bezirk Frankfurt/Oder. *Falke* 16: 304-309.
- KRAGENOW,P. 1969. Zur Entwicklung des Brutvogelbestandes im Kerngebiet des Naturschutzgebiets "Ostufer der Müritz". *Mitt. IG Avifauna DDR* 2: 21-42.
- KRAGENOW,P. & KREMP,K. 1976. Die Vogel des Kreises Waren. Veroff. Muritz-Museum Waren Nr. 14: 63 pp.
- KRAUSE,R. 1983. Ornithologische Beobachtungen aus der oberen "Goldenen Aue". *Thür. Orn. Mitt.* 31: 1-74.
- KRUGER,H.P. 1979. Die Bestandsentwicklung des Großen Brachvogels und der Uferschnepfe von 1960-1976 in der Niederlausitz. *Naturschutzarb. Berlin u. Brandenburg* 15: 2-6.
- KRUGER,H.-P. 1980. Die Fischteiche von Peitz und ihre Bedeutung als Lebensraum für Wasser- und Watvogel unter der Berücksichtigung einiger bedeutsamer Wirtschaftsmaßnahmen der Teichwirtschaft. *Naturschutzarb. Berlin u. Brandenburg* 16: 10-18.
- KRUGER,H. 1980. Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Thüringen. Jahresbericht 1978. *Thür. Orn. Mitt.* 26: 31-45.
- KRUGER,H. 1983. Bemerkenswerte avifaunistische Feststellungen aus Thüringen. *Thür. Orn. Mitt.* 30: 49-68.
- KRUGER,S. 1973. Flussuferläufervorkommen in einem Tagebaurestsee Hoyerswerda. *Falke* 20: 303-305.
- KRUGER,S. & SCHIPKE,R. 1971. Uferschnepfe wieder Brutvogel bei Hoyerswerda. *Beitr. Vogelkd.* 17: 253-254.
- KUHLIG,A. & HEINL,K. 1983. Die Vogelwelt des Kreises Bitterfeld (Kr. Halle). Teil 1. *Bitterfelder Heimatblätter*, Sonderheft, 48 pp.
- KUHNEL,H., LUGE,J. & NEUMANN,V. 1982. Der Stelzenläufer erneut Brutvogel im Kreis Köthen. *Falke* 29: 66-67.
- KUMMER,J. 1981. Frühbrut eines Großen Brachvogels. *Beitr. Vogelkd.* 27: 373-374.
- KUMMER,J., MULLER,M. & STEIN,H. 1973. Zur Avifauna des Schollener Sees und seiner Umgebung. *Naturkd. Jber. Mus. Heineanum VIII*: 31-78.
- LAMBERT,K. 1965. Über die Vogelwelt im Gebiet Reuterstadt Stavenhagen-Ivenack. *Orn. Rundbr. Meckl.* 4: 11-50.
- LANGE,H. & LEO,F. 1978. Die Vogel des Kreises Greiz. *Staatl. Mus. Greiz* : 1-60.
- LEIPE,Th. 1983. Spülfeldprobleme um ein Kustenvogelschutzgebeit im westlichen Greifswalder Bodden. *Naturschutzarb. Meckl.* 26: 19-24.
- LIBBERT,W. 1972. Hat Charadrius hiaticula in der Mark Brandenburg gebrütet? *Beitr. Vogelkd.* 18: 445-446. Yes.
- LIPPERT,W. 1973. Ornithologische Beobachtungsmaterial aus der Elbauen bei Tangermünde. *Beitr. Vogelkd.* 19: 179-186.
- LORENZ,D. & LORENZ,I. 1976. Kiebitzerfassung 1975. *Labus* 6: 27-28.
- LOSCH,W. 1980. Seit 12 Jahren ein Flussregenpfeifer-Pärchen auf einem Kiesdach. *Falke* 27:355.
- MAHNKE,W. & DANKERT,C. 1963. Die Entwicklung der Insel Walfisch zur Seevogelbrutstätte. *Falke* 10: 147-152.

- MAHNKE,W. & DANKERT,C. 1965. Vogelinsel Walfisch 1963 und 1964. *Falke* 12: 224-226.
- MEISSNER,S., RYSSEL,A. & SCHWARZ,U. 1981. Avifauna des Kreises Merseburg (Bez. Halle). *Merseburger Land, Museum Merseburg*, Sonderheft 18: 1-108.
- MERZWEILER,A. 1965. Die Vogelwelt der unteren Schwarzen Elster (Jessen/Elster und Umgebung). *Beitr. Vogelkd.* 11: 55-76.
- MEWES,W. 1970. Zur Avifauna des Naturschutzgebietes "Nordufer des Plauer Sees". *Orn. Rundbr. Meckl.* 10: 56-66.
- MEY,E. 1971. Zur Vogelfauna eines mittelthüringischen Teiches (Blankenhainer Seeteich). *Thur. Orn. Rundbr.* 17/18: 32-36.
- MISSBACH,D. & KOOP,D. 1970. Der Rotschenkel, *Tringa totanus*, als Brutvogel an der unteren Saale, Mittelelbe und in der Börde. *Apus* 2: 49-54.
- MOCKEL,E. 1965. Brutvorkommen des Flussregenpfeifer, *Charadrius dubius curonicus*, im Vogtland. *Beitr. Vogelkd.* 10: 262-267.
- MOCKEL,R. 1975. Flussregenpfeifer Brutvogel an der Talsperre Sosa im Erzgebirge. *Beitr. Vogelkd.* 21:151.
- MULLER,S. 1970. Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg. II. Jahresbericht für 1968. *Orn. Rundbr. Meckl.* 10: 82-91.
- MULLER,S. 1975. Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg 1973. *Orn. Rundbr. Meckl.* 16: 54-81.
- MULLER,S. 1976. Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg 1974. *Orn. Rundbr. Meckl.* 17: 34-60.
- MULLER,S. 1977. Die gegenwärtige Bedeutung der Insel Poel als Brutgebiet für Limikolen. *Naturschutzarb. Meckl.* 20(3): 12-17.
- MULLER,S. 1977. Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg 1975. *Orn. Rundbr. Meckl.* 18: 52-88.
- MULLER,S. 1979. Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg 1977. *Orn. Rundbr. Meckl.* 20: 69-94.
- MULLER,S. 1980. Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg 1978. *Orn. Rundbr. Meckl.* 23: 69-92.
- MULLER,S. 1980. Sommervorkommen von Meeressstrandläufern an der Ostseeküste Mecklenburgs. *Orn. Rundbr. Meckl.*, Sonderheft 22:84.
- MULLER,S. 1981. Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg 1979. *Orn. Rundbr. Meckl.* 24: 63-87.
- MULLER,S. 1982. Brutvogel auf dem Schmidt-Bulten. *Meer und Museum (Stralsund)* 3: 32-33.
- MULLER,S. 1982. Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg 1980. *Orn. Rundbr. Meckl.* 25: 72-100.
- MULLER,S. 1983. Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg 1981. *Orn. Rundbr. Meckl.* 26: 60-83.
- MULLER,S. & PREUSS,B. 1971. Seeregenpfeifer an der Ostseeküste der DDR. *Falke* 18: 162-164.
- MUNCH,H. 1974. Ehemalige Brutvorkommen von Uferschnepfe und Triel in Sudhuringen. *Thur. Orn. Rundbr.* 22: 22-25.
- MUNCH,H. 1978. Vertikale Arealerweiterung beim Kiebitz im Thüringer Wald. *Falke* 25: 257-266.
- NEHLS,H.W. 1960. Stelzenlaufer und Sabelschnabler in Rostock-Marienehe. *Falke* 7:93.
- NEHLS,H.W. 1964. Die Seevogelinsel Langenwerder in den Jahren 1962 und 1963. *Falke* 11: 156-162.
- NEHLS,H.W. 1966. Die Seevogelinsel Langenwerder 1964/1965. *Falke* 13: 231-239.
- NEHLS,H.W. 1967. Die Brutvogel der Mecklenburgischen Ostseeküste - Bestand und Probleme. *Orn. Rundbr. Meckl.* 5: 9-16.
- NEHLS,H.W. 1968. Die Seevogelinsel Langenwerder 1966/1967. *Falke* 15: 188-195.
- NEHLS,H.W. 1974. Die Seevogelinsel Langenwerder 1968/69. *Falke* 21: 52-59, 90-94.
- NEHLS,H.W. & BUTTNER,U. 1973. Die Usedomer Vogelinseln im NSG "Bohmke und Werder". *Naturschutzarb. Meckl.* 16.1: 29-35.
- NEUBAUER,W. 1971. NSG "Krakower Obersee". Brutbericht 1970. *Naturschutzarb. Meckl.* 14.1:52.
- NEUMANN,J. 1968. Avifaunistische Notizen aus dem Kreis Uckermark. *Falke* 15: 164-169.
- NICOLAI,B. 1970/1971. Das Vorkommen des Triels, *Burhinus oedicnemus*, im Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises "Mittelelbe-Börde". *Naturkdl. Jber. Mus. Heineanum* V/VI: 75-82.
- NICOLAI,B. 1972. Der Vogelbestand einer Kontrollfläche in der Elbeniederung westlich von Burg bei Magdeburg. *Mitt. IG Avifauna DDR* 5: 69-72.
- OAK ALTMARK. 1975. Avifaunistischer Jahresbericht 1973 für die Altmark. *Naturkdl. Jber. Mus. Heineanum* X: 55-74.
- OAK NORDMARZ UND VORLAND. 1972. Avifaunistischer Jahresbericht 1971 für den Nordharz und das nördliche Harzvorland. *Naturkdl. Jber. Mus. Heineanum* VII: 81-108.
- OAK NORDMARZ UND VORLAND. 1973. Avifaunistischer Jahresbericht 1972 für den Nordharz und das nördliche Vorland. *Naturkdl. Jber. Mus. Heineanum* VIII: 79-105.
- ODRICH,E. 1965. Flussregenpfeiferbrut im Erzgebirge. *Falke* 12:68.
- OERTEL,ST. & SAEMANN,D. 1978. Jahresbericht 1976 und 1977 der AG Avifaunistik im Bezirk Karl-Marx-Stadt. *Actitis (Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig u. Karl-Marx-stadt)* 15: 59-84.
- OESEER,R. 1977. Zum Vorkommen der Waldschnepfe im Erzgebirge. *Beitr. Vogelkd.* 23: 306-307.
- OLSCHLAGEL,H. 1964. Flussregenpfeifer brutet in Plothen. *Falke* 11: 65-66.
- ORTLIEB,R. 1975. Zum Vorkommen der Waldschnepfe im Sudostharz. *Apus* 3: 261-265.
- OTTO,W. 1981. Brutbestand des Kiebitzes (*Vanellus vanellus* L.) in Berlin-Weissensee 1980. *Pica (Berlin)* 1: 40-43.
- OXFORT,M. 1964. Flussregenpfeifer wieder Brutvogel bei Erfurt. *Beitr. Vogelkd.* 9:460.
- OXFORT,M. 1967. Der Grosse Brachvogel bei Erfurt. *Thur. Orn. Rundbr.* 11: 6-7.
- OXFORT,M. 1968. Fruhjahrsbeobachtungen 1967 am Unstrutrückhaltebecken bei Straußfurt. *Thur. Orn. Rundbr.* 12: 16-19.
- PABST,H.-J. 1967. Flussregenpfeifer brutete 1964 und 1965 bei Weimar? *Thur. Orn. Rundbr.* 10:22.
- PATZOLD,W. & BANZ,K. 1964. Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt des Parsteiner Sees und seiner Umgebung. *Falke* 11: 111-117.
- PLATH,L. 1973. Bestandserfassung des Kiebitzes 1972 im Kreis Rostock-Stadt. *Orn. Rundbr. Meckl.* 14: 14-19.
- PLATH,L. 1974. Die Brutvogel des Überseehafens Rostock im Jahre 1972. *Orn. Rundbr. Meckl.* 15: 5-15.
- PLATH,L. 1975. Die Breitlingsinsel Pagenwerder - ein weiterer Seevogelbrutplatz an der mecklenburgischen Ostseeküste. *Naturschutzarb. Meckl.* 18.2: 30-31.
- PLATH,L. 1976. Die Vogel der Stadt Rostock (*Nonpasseres*). Rostock, 112 pp.
- PLATH,L. 1982. Die Bedeutung der Wittenbergen Elbäue als Brut und Rastgebiet für Limikolen. *Orn. Rundbr. Meckl.* 25: 34-38.
- PRANGE,H. 1972. Limikolenbeobachtungen auf dem "Bock" nordwestlich von Stralsund. *Beitr. Vogelkd.* 18: 367-387.

- PRILL,H. 1963. Erfassung der Brutplätze der Laro-Limikolen im Bezirk Neubrandenburg. *Naturschutzarb. Meckl.* 6:1: 25-30.
- PRILL,H. 1965. Brutversuch des Austernfischers im Binnenland. *Falke* 12:248.
- PRILL,H. 1966. Die Vogelwelt des Naturschutzgebietes "Grosser Schwerin". *Falke* 13: 269-276.
- PRILL,H. 1968. Eine Bestandsaufnahme des Kiebitz. *Falke* 15: 200-202.
- PRILL,H. 1972. Das Vorkommen der Uferschnepfe in den Nordbezirken der DDR. *Falke* 19: 130-135.
- PRILL,H. 1976. Auswirkungen einer Trockenperiode auf den Brutbestand einer Kiebitzpopulation. *Falke* 23: 11-13.
- ROCHLITZER,R. & KUHNEL,H. 1979. *Die Vogelwelt des Gebietes Kothen (Bezirk Halle).* Naumann-Museum Kothen, 131 pp.
- RUTHENBERG,H. 1964. Die Vogelwelt des Tollensesee-Gebietes. *Orn. Rundbr. Meckl.* 2: 16-38.
- RUTSCHKE,E. 1964. Kampfläufer (*Phiomachus pugnax*) Brutvogel am Gulper See. *Beitr. Vogelkd.* 10: 234-235.
- RUTSCHKE,E. 1964. Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt des Gulper Sees. *Beitr. Tierwelt Mark I:* 59-96.
- RUTSCHKE,E. 1983. *Die Vogelwelt Brandenburgs.* Jena, 385 pp.
- SEAMANN,D. 1967. Sumpf- und Wasservogel in Karl-Marx-Stadt während der Jahre 1955 - 1965. *Beitr. Vogelkd.* 12: 242-256.
- SEAMANN,D. 1973. Beobachtungsbericht 1969 - 1972 der Arbeitsgruppe Avifaunistik im Bezirk Karl-Marx-Stadt. *Actitis (Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig u. Karl-Marx-stadt)* 9: 2-98.
- SEAMANN,D. 1976. Die Vogelfauna im Bezirk Karl-Marx-Stadt während der Jahre 1959 - 1975. *Actitis (Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig u. Karl-Marx-stadt)* 11: 3-85.
- SEEGER,J.-J. 1974. Untersuchungen zum Brutbestand von Limicolen im Bereich der Unteren Havel. *Beitr. Vogelkd.* 20: 421-426.
- SCHEFFLER,W. 1980. Brutnachweis des Waldwasserlaufers im NSG Stechlin. *Naturschutzarb. Berlin u. Brandenburg* 16:32.
- SCHEUFLER,H. & STIEFEL,A. 1978. Aufgaben und Probleme der Betreuung des Seevogelschutzgebietes Insel Kirr als Teil des Naturschutzgebietes Inseln Oie und Kirr. *Naturschutzarb. Meckl.* 21: 5-12.
- SCHEUFLER,H., STIEFEL,A. & STURMHOEFEL,E. 1982. Die Brutvogel des NSG "Inseln Oie und Kirr" und ihre Betreuung durch die Vogelwarter. *Meer und Museum (Stralsund)* 3: 24-32.
- SCHILDMESSER,H. 1965. Seevogelschutz an der Ostseeküste der DDR. *Falke* 12: 45-50.
- SCHNEIDER,R. 1969. Die Siedlungsdichte der Vogel einer Bruchlandschaft im nordlichen Harzvorland im Jahre 1962. *Mitt. IG Avifauna DDR* 2: 3-12.
- SCHMIDT,K. 1969. Zum Brutvorkommen der Limicolen im mittleren Werratal. *Thur. Orn. Rundbr.* 15: 14-18.
- SCHMIDT,K. 1969. Zum Vorkommen des Flussregenpfeifers im Werratal. *Falke* 16: 201-202.
- SCHMIDT,K. 1969. Zum Brutvorkommen der Limicolen im mittleren Werratal. *Thur. Orn. Rundbr.* 15: 14-18.
- SCHMIDT,K. 1972. Zum Brutvorkommen der Limicolen im Bezirk Suhl. *Beitr. zur Avifauna des Bez. Suhl* 3: 34-35.
- SCHMIDT,K. 1973. Zum Brutvorkommen und Durchzug der Limicolen im Werratal. *Beitr. Vogelkd.* 19: 43-70.
- SCHMIDT,R. 1970. Zur Avifauna des Mulknitz-Euloer Teichgebietes. *Beitr. Tierwelt Mark VII:* 108-132.
- SCHMIDT,R. 1975. Brutversuch des Seeregenpfeifers auf Hiddensee 1975. *Falke* 22: 424-425.
- SCHONERT,H. & HEISE,G. 1970. Die Vogel des Kreises Prenzlau. *Orn. Rundbr. Meckl.* 11: 3-43.
- SCHRODER,H. 1962. Über die Vogelwelt im Naturschutzgebiet "Ostufer der Müritz". In: *Beiträge zur Erforschung des NSG "Ostufer der Müritz", Greifswald.*
- SCHRODER,P. 1962. Zur Avifauna des Zicker Sees und seiner Umgebung. *Falke* 9: 407-411.
- SCHRODTER,W. 1969. Neues Brutvorkommen des Flussregenpfeifers in der oberen Goldenen Aue (Kreis Nordhausen). *Thur. Orn. Rundbr.* 14: 35.
- SCHULZ,G. 1983. Brutversuch des Austernfischers an der Mittelelbe. *Apus* 5: 143-144.
- SCHULZ,U. 1967. Bemerkungen zur Vogelwelt der Inseln Oie und Kirr im Barther Bodden. *Orn. Rundbr. Meckl.* 5: 16-20.
- SCHULZE,C. 1976. Waldschnepfenbrut bei Königswartha. *Abh. u. Ber. Naturkundemus. Gorlitz* 50(16):33.
- SCHULZE,K.-H. 1967. Der Kiebitz nun auch Brutvogel der stillgelegten Lausitzer Braunkohlengruben. *Beitr. Vogelkd.* 12:288.
- SEELIG,K.-J., et al. 1979. Brutvogel und bemerkenswerte Durchzugler im Mittelelbe-Borde-Gebiet in den Jahren 1973-1975. *Abh. Ber. Naturkd. Vorgeschichte Magdeburg:* 52-77.
- SEIBT,E. 1969. Beiträge zur Avifauna des mittleren Thüringer Waldes. *Thur. Orn. Rundbr.* 14: 20-24.
- SEIFERT,B. 1978. Die Vogelwelt der Helmsdorfer Schlammtäler. *Actitis (Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig u. Karl-Marx-stadt)* 15: 3-58.
- SELLIN,D. 1973. Avifaunistische Notizen aus der Umgebung von Coswig/Anhalt. *Apus* 3: 34-36.
- SELLIN,D. 1975. Das Brutvorkommen der Limicolen im Bereich des Peenestromes im Zeitraum von 1970-1975. *Mitt. IG Avifauna DDR* 8: 61-78.
- SELLIN,D. 1979. Zum Vorkommen der Waldschnepfe bei Greifswald auf Grundlage der Erfassung der Balzreviere. *Falke* 26: 150-153.
- SELLIN,D. 1979. Das NSG "Peenemunder Haken, Struck und Ruden" - Bericht 1977/78 für das Teilgebiet Struck. *Naturschutzarb. Meckl.* 22: 72-73.
- SIEFKE,A. 1980. Zur Brutbestandsermittlung bei Sandregenpfeifer, Zwergseeschwalbe und Austernfischer. *Falke* 27: 304-309.
- SITTEL,A. & SITTEL,U. 1979. Staubecken Altmoritz - ein neues Beobachtungsgebiet. *Actitis (Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig u. Karl-Marx-stadt)* 16: 73-76.
- SPRETEKE,T. 1982. Avifaunistischer Jahresbericht 1978 für den Bezirk Halle. *Apus* 5: 13-25.
- STAHLBAUM,G. 1964. Beobachtungen an einem Austernfischergelege. *Beitr. Vogelkd.* 9: 378-379.
- STEGEMANN,K.-D. 1971. Siedlungsdichteuntersuchungen an Niederungswiesenflächen der Friedlander Grossen Wiese. *Mitt. AG Avifauna DDR* 4: 45-52.
- STEGEMANN,K.-D. 1971. Eine Bestandsaufnahme des Grossen Brachvogels in der Friedlander Grossen Wiese. *Orn. Rundbr. Meckl.* 12: 16-19.
- STEGEMANN,K.-D. 1977. Der Brutvogelbestand einer Viehweide in der Friedlander Grossen Wiese in Jahren mit unterschiedlicher Feuchtigkeit. *Orn. Rundbr. Meckl.* 18: 33-35.
- STEGEMANN,K.-D. 1983. Brutbestand und Durchzug der Limicolen in der Friedlander Grossen Wiese. *Orn. Rundbr. Meckl.* 26: 6-14.
- STEIN,F. 1956. Zur Brutverbreitung des Flussregenpfeifers, *Charadrius dubius curonicus*, in Nordwestsachsen. *Beitr. Vogelkd.* 4: 181-187.

- STEINKE,G. 1978. Die Vogel des NSG "Bucher Brack", Kreis Genthin. *Natursch. naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg* 14 (Beiheft): 98-100.
- STEINKE,G. & HEINDORF,K. 1982. Die Vogel des Kreises Tangerhütte. *Orn. Jber. Mus. Heineanum* 7: 1-105.
- STENZEL,F. 1978. Stelzenlaufer brutete 1958 bei Halle. *Falke* 5: 147-149.
- STIEFEL,A. & SACK,R. 1966. Brutversuche des Rotschenkels (*Tringa totanus*) am Süssen See bei Eisleben. *Apus* 1: 41-43.
- STIEFEL,A., SCHEUFLER,H. & STURMOEFEL,E. 1982. Die wissenschaftliche Vogelberingung auf Oie und Kirr und die bisherigen Ergebnisse. *Meer und Museum (Stralsund)* Bd.3: 55-64.
- STIEFEL,A. & SCHEUFLER,H. 1982. 10 Jahre Betreuung des Küstenvogelschutzgebietes Insel Kirr durch ehrenamtliche Vogelwarter aus Halle. *Naturschutzarb. Meckl.* 25: 63-67.
- STREICHER,S. 1982. 20 Jahre Küstenvogelschutz auf den Inseln Oie und Kirr. *Meer und Museum* 3(1982): 2-11.
- STURMHOESEL,E. 1967. Die Vogel des Naturschutzgebietes Insel Libitz. *Orn. Rundbr. Meckl.* 5: 21-23.
- TEICHMANN,A. 1975. Das Brutvorkommen des Kiebitzes im Kreis Merseburg. *Apus* 3: 253-261.
- TRAUTMANN,R. 1969. Brut des Flussregenpfeifers im Kreis Wismar. *Thur. Orn. Rundbr.* 15:26.
- TUCHSCHERER,K. 1966. Untersuchungen über den Vogelbestand im Gebiet des Torgauer Großteiches in den Jahren 1958 bis 1965. *Hercynia* 3: 250-332.
- TUCHSCHERER,K. & GROSSLER,K. 1966. Beobachtungsbericht 1964. *Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig (Actitis)* 1: 6-31.
- UFER,W. 1973. Quantitative Bestandsaufnahme der Kiesgrube Rattmannsdorf im Saalkreis 1968. *Apus* 3: 17-18.
- ULBRICHT,J. 1979. Zur Territorialstruktur einer "Kolonie" des Flussregenpfeifers. *Falke* 26: 351-354.
- ULRICH,A. 1973. Die Verbreitung des Kiebitzes im Kreis Wolmirstedt und der Einfluss unterschiedlicher Wasserstandsverhältnisse auf den jährlichen Brutbestand. *Apus* 3: 10-16.
- ULRICH,A. 1975. Der Brutvogelbestand einer Kontrollfläche in der Ohreniederung bei Wolmirstedt. *Mitt. IG Avifauna* 7: 53-57.
- WADEWITZ,O. 1955. *Dort wo der Triel ruft. Wittenberg-Lutherstadt.*
- WADEWITZ,O. 1974. Veränderungen des Brutvogelbestandes einer mitteldeutschen Flusslandschaft innerhalb von 20 Jahren. *Beitr. Vogelkd.* 20: 176-180.
- WAGNER,S. 1962. Brut von Sabelschnabler und Zwergseeschwalbe auf der Insel Koos. *Falke* 9:244.
- WARMBIER,N. 1974. Das Vorkommen von Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) und Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*) im Kreis Anklam. *Orn. Rundbr. Meckl.* 15: 3-5.
- WARMBIER,N. 1979. Zur Vogelwelt des Naturschutzgebietes "Anklamer Stadtbruch". *Orn. Rundbr. Meckl.* 20: 49-55.
- WEGENER,L. 1972. Der Brutvogelbestand einer Wiese im Kreis Waren. *Mitt. IG Avifauna DDR* 5: 83-84.
- WILKE,H. 1966. Stelzenläufer, *Himantopus himantopus*, im Kreis Cottbus. *Beitr. Vogelkd.* 11: 322-327.
- WITSACK,W. 1969. Die Siedlungsdichte der Vogel zweier Grünlandtypen im Nordharz und im Nordharzvorland. *Mitt. IG Avifauna DDR* 2: 13-20.
- WODNER,D. 1965. Die Vogelwelt am Knappensee 1959-1962. *Falke* 12: 76-82.
- WODNER,D. 1975. Zur Vogelwelt des Eichsfeldes. Sonderausgabe Eichsfelder Heimathefte, 128 pp.
- ZUPPKE,U. 1979. Die avifaunistische Bedeutung des Landschaftsschutzgebietes "Mittellelle" im Kreis Wittenberg. *Natursch. naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg* 16: 41-53.



## 6.61. THE NETHERLANDS

compiled by Theunis Piersma and Theo Verstraet

- ABRAHAMS,A., DOOVE,H. & SCHUIT,S. 1979. *Effekten van een voorgenomen polderpeilverlaging op de weidevogels in de polder Groot Wilnis Vinkeveen. Doktoraalverslag R.U. Leiden (Milieubiologie/Theor. Biologie).* In Dutch.
- AKKER,R.VAN, BOUMA,A., HAZENBOSCH,H., KOENS,K., PRINS,D., SLOOFF,J. & SCHOORL,A. 1983. *Ik zal handhaven. Een vergelijkend onderzoek naar vormen van weidevogelbeheer in Nederland. Doktoraalverslag C.M.L., R.U. Leiden.* In Dutch.

- ALLEYN,W.F. et al. (eds.) 1971. *Avifauna van Midden Nederland.* Van Gorcum, Assen 520 pp. In Dutch.
- ALTENBURG,W., BEEMSTER,N., VAN DIJK,K., ESSELINK,P., PROP,D. & VISSER,H. 1985. (Development of the breeding bird population in the Lauwersmeer 1978-83.) *Limosa* 58: 149-161. In Dutch with English summary.
- BAKKER,G. 1961. Morinelplevier broedt (met succes) in N.O. Polder. [Dotterel breeds successfully in N.O. Polder.] *Vogeljaar* 9: 185-187. In Dutch.

- BAUMEISTER,G.A. 1981. De kemphaan in de Dorregeester polder. [Ruffs in the Dorregeester polder.] Grutter 5: 67-74. In Dutch.
- BEINTEMA,A.J. 1981. Meadow birds in the Netherlands. In: Annual Report 1981 Research Inst. for Nature Management: 86-93, Arnhem.
- BEINTEMA,A.J. 1982. Meadow birds in the Netherlands. In: Scott,D.A. (ed.). Managing Wetlands and Their Birds. IWRB, Slimbridge, pp. 83-91.
- BEINTEMA,A.J. 1983. Weidevogels in de noordamerikaanse prairie. Verslag van een studiereis naar Canada en de V.S., 17 mei - 13 juni 1982. [Meadow birds in the north-american prairie. report of a study trip to Canada and USA, 17 May - 13 June 1982.] Rapport R.I.N., Leersum. In Dutch.
- BEINTEMA,A.J. 1983. Meadowbirds in the Netherlands. Wader Study Group Bull. 37: 17-20.
- BEINTEMA,A.J. 1983. Wader species breeding on agricultural grasslands. In: Boyd,H. (ed.). First western hemisphere waterfowl and waterbird symposium. IWRB, pp. 105-106.
- BEINTEMA,A.J. & VAN DEN BERGH,L.M.J. 1976/77/79. Relaties tussen waterpeil, grondgebruik en weidevogelstand. Deel I, Deel II, Deel III. R.I.N.- rapporten, Leersum.
- BEINTEMA,A.J. & MUSKENS,G.J.D.M. 1981. De invloed van beheer op de produktiviteit van weidevogels. RIN-rapport 81/19, Leersum, 74 pp. In Dutch.
- BEINTEMA,A.J., DE BOER,T.F., BUKER,J.B., MUSKENS,G.J.D.M., VAN DER WAL,R.J. & ZEGERS,P.M. 1982. Verstoring van weidevogellegsels door weidend vee. Rapport D.B.L., Utrecht/Rapport R.I.N. Leersum. In Dutch.
- BEINTEMA,A.J., DE BOER,T.F. & BUKER,J.B. 1983. Verslag van het weidevogelonderzoek in Waterland 1982 (C.O.A.L.-Onderzoek). Rapport D.B.L., Utrecht/Rapport R.I.N., Leersum. In Dutch.
- BELT,W.VAN DEN & ENTJES,B. 1981. Relatie tussen het voorkomen van zwarte kraaien en weidevogels. Doktoraalverslag L.H. Wageningen/Rapport R.I.N., Arnhem. In Dutch.
- BERENDSEN,P. 1981. De relatie tussen de zwarte kraai en enkele broedvogels op de Kampina en omgeving (N.B.). Doktoraalverslag L.H. Wageningen/Rapport R.I.N., Arnhem. In Dutch.
- BERGH,L.M.J. VAN DEN. 1982. Broedgevallen van de Kluut (*Recurvirostra avosetta*) langs de grote rivieren. [Breeding of Avocets along the great rivers.] Vogeljaar 29: 140-143. In Dutch.
- BERGH,L.M.J. VAN DEN, GERRITSE,W.G., HEKKING,W.H.H., KEIJ,P.G.M.J. & KUYK,F. (eds.). 1979. Vogels van de Grote Rivieren. Spectrum, Utrecht. 328 pp. In Dutch.
- BEIJERSBERGEN,R.B. 1975. Inventarisatie van de Kluut in de Delta in 1974. [Survey of Avocets in the Delta in 1974.] Vogeljaar 23: 114-117. In Dutch.
- BEIJERSBERGEN,R. 1985. Broedgeval van Bonte Strandloper op De Hooge Platen in 1984. [Breeding Dunlins on De Hooge Platen in 1984.] Vogeljaar 33:182. In Dutch.
- BLOEMENDAAL,F. & SCHUURKES,R. 1979. De achteruitgang van de wulp als broedvogel op het Zuid-Hijkerzand en de rol van de zwarte kraai daarin. Doktoraalverslag K.U. Nijmegen/Rapport R.I.N., Arnhem. In Dutch.
- BOEKEMA,E.J., GLAS,P. & HULSCHER,J.B. (eds.). 1983. De vogels van de provincie Groningen. Wolters-Noordhoff/Boeuma's Boekhuis, Groningen. 387 pp.
- BONTENBAL,J. 1979. Onderzoek ten behoeve van beheer en inrichting van het graslandgebied tussen Harderwijk en Doornspijk. Doktoraalverslag L.H., Natuurbeheer, Wageningen, 75/76 no. 26 en 76/77 no. 21. In Dutch.
- BRAAKSMA,S. 1954. De Kemphaan als broedvogel in Nederland. [The Ruff as a breeding bird in The Netherlands.] Verslag Staatsbosbeheer, Utrecht.
- BRAAKSMA,S. 1960. De verspreiding van de Wulp als broedvogel. [The distribution of the Curlew as a breeding bird.] Ardea 48: 65-90. In Dutch.
- BRINKKEMPER,J. 1979. De Kemphaan in Nederland. [The Ruff in The Netherlands.] Wet. Med. KNNV 137, Hoogoud. In Dutch.
- BROUWER,G.A. 1936. De invasie van den Steltkluut in 1935. [The invasion of the Black-winged Stilt in 1935.] Ardea 25: 64-74. In Dutch.
- BUKER,J.B., WINKELMAN,J.E., DE BOER,T.F. & BEINTEMA,A.J. 1984. Voortgangsverslag (1982, 1983) van het weidevogelonderzoek in Waterland. Rapport D.B.L., Utrecht/Rapport R.I.N., Leersum. In Dutch.
- BUND,C.F.VAN DE. 1980. De zuidelijke Gelderse Vallei als weidevogelgebied. [The southern Gelderse Vallei as a meadowbird-area.] In: Klomp,H., Woldhek,S. & de Bruin,C. (eds.). Weidevogels in de verdrukking. Vogelbescherming, Zeist, pp. 81-88. In Dutch.
- BUND,C.F.VAN DE, DE VRIES,D.M. & DE VRIES-SMEEK,G. 1969. Biosociologisch onderzoek betreffende vogelstand en hoeveelheid ongervelde dieren. [Biosociological study of the bird populations and quantities of invertebrates.] De Levende Natuur 72: 279-284. In Dutch.
- BUYS,E. 1982. De broedvogels van de Enge Wormer. [Breeding (meadow) birds of the Enge Wormer.] Grutter 6: 46-53. In Dutch.
- CHARDON,W.J. 1977. De invloed van bemesting op bodemfauna in relatie tot het voorkomen van weidevogels. Doktoraalverslag L.H., Natuurbeheer, no. 55, Wageningen. In Dutch.
- CREYHTON-SCHOUTEN,E. 1981. De verstoring van weidevogels in reservaten door landbouwontsluitingswegen. Doktoraalverslag R.U. Leiden. In Dutch.
- CRUL,R. & VAN KRAY,W. 1978. Onderzoek naar de rol van de ekster bij het leeghalen van vogelnesten in het natuurreervaat De Geul op Texel. Doktoraalverslag K.U. Nijmegen/Rapport R.I.N., Arnhem. In Dutch.
- DIREKTIE BEHEER LANDBOUWGRONDEN. 1980. Verstoring van nesten door weidend melkvee; verslag van een onderzoek in enige weidevogelgebieden. Rapport D.B.L.. Utrecht. In Dutch.
- DIRKSEN,S. 1980. De weidevogels van de Paesenser polder (Fr.) in 1978. [The meadowbirds of the Paesenser polder in 1978.] Aythya 19(5): 18-26. In Dutch.
- DOP,D.C. VAN DEN. 1981. Invloed van het gebruik van het fiets-annex voetpad "De Ruijke Kade" en van de boerderijstrook aan de Hoge Rijndijk langs de Achthovenerpolder te Leiderdorp op de dichtheid en verspreiding van de weidevogels ter plaatse. Rapport R.U. Leiden. In Dutch.
- DIJK,A.J.VAN. 1974. De relatie tussen koeien en broedvogels op Schiermonnikoog. RIN-rapport, Leersum.
- DIJK,A.J.VAN. 1979. Onderzoek naar de relatie tussen beweiding en broedvogelpopulatie op de Oosterkwelder van Schiermonnikoog. Rapport R.U. Groningen.
- DIJK,A.J.VAN & BAKKER,J. 1980. Beweiding en broedvogels op de Oosterkwelder van Schiermonnikoog. [Grazing and breeding

- birds on the Oosterkwelder of Schiermonnikoog.] *Waddenbulletin* 15(4): 134-140. In Dutch.
- DIJK, A.J.VAN & VAN OS, B.L.J. (eds.). 1982. *Vogels van Drenthe*. Van Gorcum, Assen, 348 pp. In Dutch.
- DIJK, D.VAN & NIJESSEN, W. 1980. *De invloed van de zwarte kraai op de purperreiger en weidevogelstand in de Bethunepolder te Maarssen (U.)*. Doktoraalverslag R.U. Utrecht/Rapport R.I.N., Arnhem. In Dutch.
- DIJK, G.VAN. 1981. *Het inventariseren van weidevogels*. Rapport SBB, Utrecht. In Dutch.
- DIJK, G.VAN. 1983. *De populatie-omvang (broedparen) van enkele weidevogelsoorten in Nederland en de omringende landen. [Population size of some meadowbird species in the Netherlands and surrounding countries.]* *Vogeljaar* 31: 117-133. In Dutch with English summary.
- DIJK, G.VAN. & KUIJK, F. 1985. *De weidevogelstand in het gebied van de Avifauna van Midden-Nederland. [Meadowbird population-levels in the central area of the Netherlands.]* *Vogeljaar* 33: 4-14. In Dutch.
- DIJK, K.VAN & BORRIUS, K. 1985. *(Breeding record of the Dunlin Calidris alpina in the Lauwersmeer.)* *Limosa* 58:166. In Dutch with English summary.
- DIJKSEN, A.J. & DIJKSEN, L.J. 1977. *Texel-Vogeleinland*. Thieme, Zutphen, 246 pp.
- EERDEN, M.R.VAN, PROP, J. & VEENSTRA, K. (The development of the breeding populations in several species of birds in the Lauwerszee-area in eight years following reclamation.) *Limosa* 52: 176-190. In Dutch with English summary.
- ENGELMOER, M., VAN DIJK, K. & TIMMERMAN, A. 1984. *Vogels van de Friese Waddenkust*. FFF rapport nr. 20, Leeuwarden, 104 pp. In Dutch.
- ERICH, W. & PEETERS, P. 1976. *De relatie tussen vogelstand, grondwaterstand en bodemfauna in de Bennekomse Hooilanden*. Doktoraalverslag R.U. Utrecht/L.H., Natuurbeheer, Wageningen. In Dutch.
- EVERTS, R. & TIMMERMAN, A., Azn. 1981. *Weidevogelinventarisaties in het Riperkritegebied in 1981*. Rapport SBB, Natuurbeheer, Leeuwarden. In Dutch.
- FABRITIUS, H.E. 1974/1975. *Dichtheid en productiviteit van steltlopers in Lapland en Noord-Holland. [Density and productivity of waders in Lapland and Noord-Holland.]* Doktoraalverslag Vrije Universiteit, Amsterdam.
- FOKKEMA, J. 1976. Vergelijking van de broedstand van vier soorten steltlopers gedurende 1965 +/m 1974. [Comparison of densities of four species during 1965-1974.] *Vanellus* 29: 81-94. In Dutch.
- GANZEVLES, W. 1982. Broedgeval van de Oeverloper *Actitis hypoleucos* in 1981 bij Eijsden. [Breeding of Common Sandpipers near Eijsden, Limburg in 1981.] *In Vogelvlucht* 5(1): 2-4. In Dutch.
- GANZEVLES, W., HUSTINGS, F., SCHEPERS, F., UMMELS, J. & VERGOOSSEN, W. 1985. *Vogels in Limburg. [Birds in Limburg.]* Publ. Natuurhist. Genootsch. Limburg 35-5-15, 224 pp. In Dutch.
- GELDER, A.D.E. 1982. *Weidevogels in de Eilandspolder*. Rapport SBB, Natuurbeheer, 1982-25, Haarlem. In Dutch.
- GERRITSEN, G.J. 1981. *Noord-west Overijssel: onderzoek naar broedvogels, doortrekkers en wintergasten in de polders*. Rapport PPD, Overijssel, 63 pp. In Dutch.
- GERRITSEN, G.J. 1984. *(Ornithological significance of the Barsbekerbinnenvelder, N.W. Overijssel.)* *Limosa* 57: 141-145. In Dutch with English summary.
- GRAANSMA, P. 1983. *De verstoring van weidevogelpopulaties door wegen en bebouwingen. Stageverslag R.H.L.S., Groningen/SBB, Natuurbehoud, Leeuwarden.* In Dutch.
- GROTHUIS, J.W. 1980. *Voorkomen, aantalverloop en biotoopkeus van weidevogels in de Oost Achterhoek. [Occurrence, population-changes and habitat selection of meadowbirds in the Oost Achterhoek.]* In: Klamp, H., Woldhek, S. & de Bruin, C. (eds.). *Weidevogels in de verdrukking. Vogelbescherming, Zeist*, pp. 93-100. In Dutch.
- GROTHUIS, J. 1982. *Voorkomen en verspreiding van de zeldzame weidevogels in 1981. [Occurrence and distribution of rare meadowbirds in 1981.] Meded. Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek* 9: 5-6. In Dutch.
- GROTHUIS, J., HUSTINGS, F., KWAK, R. & LANJOUW, R. (eds.). 1985. *Broedvogels van Winterswijk. [Breeding birds of Winterswijk.]* KNNV, Hoogvliet. 232 pp. In Dutch.
- GULDEMOND, A. 1980. *Veranderingen in het landelijk gebied van Noord-Holland*. Rapport PPD-Noordholland, Haarlem. In Dutch.
- HEINEN, M.A. 1984. *Kritische weidevogels en kwelgebieden op de Oost-Veluwe*. Rapport Regionale Milieuraad Oost-Veluwe, Apeldoorn. In Dutch.
- HENDRIKSE, K., OOSTERVELD, E. & WURING, G. 1979. *De invloed van ruilverkaveling op de weidevogel en bodemfaunastand in het beekdal van het Rolderdiep*. Doktoraalverslag R.U. Groningen/L.H., Natuurbeheer, no. 542, Wageningen. In Dutch.
- HENDRIKSMA, J.T. 1974. *Inventarisatie in een weidevogelgebied. [Survey of a meadowbird area.]* *Vanellus* 2: 48-52. In Dutch.
- HETTINGA, D. & DE VRIES, D.M. 1971. *Enkele waarnemingen over het voorkomen van vogels op proefvelden met verschillende ontwateringsdiepten in het westelijke veenweidegebied*. I.C.W.-nota 162, Wageningen.
- HOEKSTRA, E. & LAMMERTS, E.J. 1978. *De oecologische gevolgen van de ruilverkavelingen "Rolle" en "Anloo".* Doktoraalverslag R.U. Groningen/L.H., no. 541, Wageningen. In Dutch.
- HOEKSTRA, J. 1984. *"Nazorgjaar" 1984. [Breeding meadowbirds in the province of Friesland in 1984.]* *Vanellus* 37: 167-170. In Dutch.
- HOEKSTRA, J. 1985. *Nazorg in 1985. [Meadowbirds in Friesland in 1985.]* *Vanellus* 38: 149-154. In Dutch.
- HOEKSTRA, J. 1986. *Nazorg in 1985(2). [Meadowbirds in Friesland in 1985. (2).]* *Vanellus* 39: 15-16. In Dutch.
- HOLWERDA, J. 1980. *De weidevogelstand in relatie tot de vocht-voorzienings- en verzorgingstoestand van grasland*. Rapport no. 80/14, R.I.N., Leersum. In Dutch.
- HOMAN, J. 1980. *Een inventarisatie van de rijke weidevogelgebieden in het ruilverkavelingsgebied "Brummen-Voorst".* Rapport Vogelwerkgroep Oost-Veluwe. In Dutch.
- HULSCHER, J.B. 1970. *De broedstand van Kievit, Grutto, Tureluur en Scholekster in Friesland in 1966-1969. [Populations of Lapwing, Black-tailed Godwit, Redshank and Oystercatcher in Friesland in 1966-1969.]* *De Levende Natuur* 73: 255-262, 269-274. In Dutch.
- HULSCHER, J.B. 1972. *De Scholekster, een nieuwkomer onder de weidevogels. [The Oystercatcher, a new meadowbird.]* *Vanellus* 25: 206-210. In Dutch.

- JANSEN,F. 1980. De weidevogels op Schouwen-Duiveland. [The meadowbirds on Schouwen-Duiveland.] In: Klomp,H., Woldhek,S. & de Bruin,C. (eds.). *Weidevogels in de verdrukking*. Vogelbescherming, Zeist, pp. 91-92. In Dutch.
- JONG,H.DE. 1972. Het weidevogelreservaat in Oostelijk Flevoland. [The meadowbird-reserve in Oostelijk Flevoland.] *Limosa* 45: 49-57. In Dutch.
- JONG,H.DE. 1978. Het beheer van weidevogelpopulaties in de Noordhollandse veenweidegebieden. [The management of meadowbird populations in Noord-Holland.] *Contactblad Oecologen* 14(1): 14-16. In Dutch.
- JONG,H.DE. 1981. Over de verstoring van weidevogelnesten door vee. Rapport SBB, Natuurbehoud, Haarlem. In Dutch.
- JONG,H.DE. & VOETBERG,K.S. 1978. Mogelijkheden voor het beheer van weidevogelgebieden in Noord-Holland. [Possibilities for the management of meadowbird-areas in Noord-Holland.] *Cultuurtechn. Tijdschrift* 18(3): 117-125. In Dutch.
- JONG,H.DE. & FABRITIUS,H.E. 1979. Over de achteruitgang van weidevogels in Noord-Holland. [On the decline of meadowbirds in Noord-Holland.] *Cultuurtechn. Tijdschrift* 19(2): 62-72. In Dutch.
- JONGMAN,R. 1981. Broedende Kluten langs de grote rivieren: een aanwinst? [Breeding Avocets along the great rivers: a gain?] *Vogeljaar* 29:327. In Dutch.
- JONGSMA,J.M. & VAN STRIEN,A.J. 1983. Effecten van landbouw op weidevogels. Een literatuuranalyse, deel I. Rapport Vakgroep Milieubiologie, R.U. Leiden. In Dutch.
- JONKERS,D.A., DIJK,G.VAN. & BRAAKSMA,S. 1981. De weidevogelbevolking van de polder Arkenheem. [The meadowbird population of the polder Arkenheem, central Netherlands.] *Watervogels* 6: 187-194. In Dutch.
- KALSBEK,H.G. & NAUTA,K. 1985. De betekenis van de relatie tussen het eierzoeken en de praktische weidevogelbescherming in Friesland. Rapport B.F.V.W., Leeuwarden, 20 pp. In Dutch.
- KAMP,J.VAN DE, KLEIJNE,A., MAKAHENA-LANDAAL,M., SCHADE,E., SMEELE,Q. & DE VOS,R. 1981. Invloed van predatie en rekreatie op het gedrag en het broedsucces van enkele steltlopers en van kokmeeuwen. Doktoraalverslag G.U. Amsterdam. In Dutch.
- KNOL,W.C. 1981. Weidevogeltellingen in Eemland in 1979. Rapport SBB, Utrecht 1981-9. In Dutch.
- KOY,H.VAN DER. 1974. Het instellen van een weidevogelreservaat in polder Nieuwkoop en Noorden. Rapport Ver. Behoud Natuurmonumenten, 's-Graveland. In Dutch.
- KRIKKE,S. 1975. Onderzoek naar de broedresultaten bij enkele weidevogelsoorten te Oudehaske in de periode 1970-74. [Breeding success of some meadowbird species near Oudehaske, 1970-74.] *Vanellus* 28: 43-52, 86-95. In Dutch.
- KUIPER,F.J. 1963. Broedgevallen van de Houtsnip in Nederland in 1961. [Breeding of Woodcock in the Netherlands in 1961.] *De Levende Natuur* 66: 287-288. In Dutch.
- KUIPER,F.J. & MORZER BRUIJNS,M.F. 1962. Het onderzoek naar het voorkomen van de Houtsnip als broedvogel in Nederland. [Study on the occurrence of the Woodcock as a breeding bird in The Netherlands.] *De Levende Natuur* 65: 73-76. In Dutch.
- LEEUWEN,B.L.J.VAN. 1980. Het populatieverloop in enkele Noordhollandse reservaten. [The population changes in some reserves in North-Holland.] In: Klomp,H., Woldhek,S. & de Bruin,C. (eds.). *Weidevogels in de verdrukking*. Vogelbescherming, Zeist, pp. 67-70. In Dutch.
- MANNEVELD,J. 1981. *Weidevogels in het Rietbos bij Schagen*. Ecoverslag no. 1, Vogelwerkgroep Schagen. In Dutch.
- MANNEVELD,J. 1981. Weidevogels in het Rietbos bij Schagen. [Meadowbirds in Rietbos near Schagen.] *Graspieper* 1(2): 60-64. In Dutch.
- MANNEVELD,J. & VAN WETTEN,J. 1984. Hoge dichtheden en clusters van nesten by kievit en Grutto in het Rietbos by Schagen. [High densities and clusters of nests of Lapwings and Black-tailed Godwit in the Rietbos near Schagen.] *Graspieper* 4: 160-165. In Dutch.
- 
- MARRA,N. 1964. Een broedgeval van de Morinelpievier in Oostelijk Flevoland. [Breeding of the Dotterel in Oostelijk Flevoland.] *Limosa* 37: 1-4. In Dutch.
- MARRA,N. 1965. Nieuwe broedgevallen van de Morinelpievier in Oostelijk Flevoland. [New breeding attempts of the Dotterel in Oostelijk Flevoland.] *Limosa* 38: 2-5. In Dutch.
- MARRA,N. & TAAPKEN,J. 1963. Nieuw broedgeval van de Morinelpievier in Nederland. [New breeding attempt of Dotterel in The Netherlands.] *Vogeljaar* 11: 109-115. In Dutch.
- MEER,P.VAN DER. 1984. De invloed van nestbescherming op de predatiekans en de totale overlevingskans van weidevogelleggels. Rapport Afd. Milieubiologie, C.M.L., Leiden, 54 pp. In Dutch.
- MEININGER,P.L. 1986. (Avocet Recurvirostra avosetta, plovers Charadrius, and terns Sterna as breeding birds in the Delta area (SW. Netherlands) in 1979-85.) *Limosa* 59: 1-14. In Dutch with English summary.
- MES,R.G. & VAN DER WAL,R.J. 1982. Snekermeer, een relatiestudie waterrecreatie en weidevogels. Rapport Bureau Ecoland/Staatsbosbeheer, Utrecht, nr. 82-21, 98 pp. In Dutch.
- MOOSER,R. 1973. De vogels van Schiermonnikoog. Wet Med. KNNV 95. In Dutch.
- MULDER,T. 1972a. De Grutto in Nederland. [The Black-tailed Godwit in the Netherlands.] Wet. Med. KNNV 90, Hoogvliet. In Dutch.
- MULDER,T. 1972b. De grutto in Friesland in vergelijking met overig Nederland en hoe de soort zich weet te handhaven. [The Black-tailed Godwit in comparison with the rest of the Netherlands.] *Vanellus* 25: 219-223. In Dutch.
- OOMEN,H.A.P.C. 1924. Een nieuwe Hollandse broedvogel: de Oeverloper (*Tringa hypoleucos* L.). *Ardea* 13: 97-99. In Dutch.
- ORDEN,C.VAN. 1978. De invloed van beweidingsstypen op weidevogelpopulaties van veenweidegebieden in N.Holland. Doktoraalverslag V.U. Amsterdam. In Dutch.

- OS, B.L.J.VAN. 1983. *Weidevogels en overige fauna in agrarische landschappen in Drenthe*. Rapport PPD, Assen. In Dutch.
- OS, B.L.J.VAN. 1985. Weidevogels in Drenthe in 1975-82. [Meadowbirds in Drenthe in 1975-82.] *Drentse Vogels* 1: 72-76. In Dutch.
- OSIECK, E.R. 1982. (Wetlands of ornithological importance in the Netherlands.) *Limosa* 55: 43-55. In Dutch with English summary.
- PAASSEN, A.G.VAN. 1980. *Invloed van graslandbeheer op broedresultaten en jongenproductie van weidevogels*. Doktoraalverslag R.U. Utrecht/Rapport R.I.N., Leersum. In Dutch.
- PEETSMAN, J. 1980. Het broedseizoen 1980 (weidevogels). [The breeding season 1980 (meadowbirds).] *Vanellus* 33: 169-172. In Dutch.
- POELGEEST, R.VAN & OSIECK, E.R. 1974. Enige gegevens over het voorkomen van de Kluut *Recurvirostra avosetta* in zuidelijk Flevoland. [Some data on the occurrence of Avocets in Zuidelijk Flevoland.] *Limosa* 47: 94-99. In Dutch.
- PHILIPONA, J. 1981a. Telling van het aantal broedparen van de wulp in het Staphorsterveld in 1980. [Count of breeding pairs of Curlew in Staphorsterveld in 1980.] *Watervogels* 6: 50-52. In Dutch.
- PHILIPONA, J. 1981b. Telling van weidevogels in het Staphorsterveld in 1981. [Count of meadowbirds breeding in the Staphorsterveld in 1981.] *Watervogels* 6: 195-197. In Dutch.
- PLOEG, D.T.E.VAN DER et al. 1977. *Vogels in Friesland. Deel II*. De Tille, Leeuwarden, pp. 501-907.
- PRANGER, D. 1982. *Weidevogels in het reservaat De Gouden Bodem*. Stageverslag H.L.S./SBB, Leeuwarden. In Dutch.
- PRINS, H.H.T. 1980. *De ontwikkeling van graslandvegetaties in noordwest-Europa*. Rapport Lab. voor Plantenoecologie, R.U. Groningen, 96 pp. In Dutch.
- PRUIJT, M. & VEENENDAAL, E. 1981. *De ruilverkaveling Assendelft en de weidevogels*. Doktoraalverslag L.H., Natuurbeheer, nr. 615, Wageningen. In Dutch.
- RHIJN, J.VAN. 1979. Zuinig zijn op kemphanen. [Careful with Ruffs.] *Noorderbreedte* 3: 180-183. In Dutch.
- RODENBURG, K. & TER STEEGE, H. 1983. *De relatie van broedvogels met de rekreatie en de vegetatiestruktuur in het Nieuwkoopse Plassengebied*. Doktoraalverslag R.U. Utrecht/Rapport R.I.N., Leersum. In Dutch.
- ROOS, G.T.D. 1981. The significance of the Isle of Vlieland, Dutch Wadden Sea, for breeding and wintering waders (Charadrii). In: Cooper, J. (ed.). *Proc. Symp. Birds of the Sea and Shore*, 1979. pp. 379-391.
- RUITENBEEK, W. 1978. De Kluut (*Recurvirostra avosetta*) in een akkergebied: het noordoosten van de Schermer. [The Avocet on arable land: the north-east Schermer.] *Pieper* 17: 24-29. In Dutch.
- RUITENBEEK, W. 1982. Kluut onderzoek. Eerste voorlopige verslag over 1981. [Avocet research. First preliminary results for 1981.] *Graspieper* 2: 3-11. In Dutch.
- RUITENBEEK, W. 1983. De Kluut als broedvogel in het binnenland van Noord-Holland. Eindverslag van het SVN-onderzoek. [The Avocet also breeding bird in inland Noord-Holland.] *Graspieper* 3: 158-169. In Dutch.
- SCHARENBURG, K.VAN. 1985. Veranderingen in de weidevogelstand van het Zuidelijk Westerkwartier. Een vergelijking tussen de jaren 1975 en 1980. [Changes between 1975 and 1980 in meadowbird populations in an area in the province of Groningen, The Netherlands.] *Grauwe Gors* 13: 7-13.
- SCHARRINGA, C.J.G. 1976. Broedgeval van de Goudplevier *Pluvialis apricaria apricaria* in Brabant. *Limosa* 49: 109-110. In Dutch.
- SCHARRINGA, C.J.G. 1984. Weidevogels in het zuidelijk deel van Noord-Holland. [Meadowbirds in the southern part of North Holland.] *Graspieper* 4: 3-33. In Dutch.
- SCHELHAAS, H., DEKKERS, G. & GERRITSEN, G. 1984. *Vogels in Overijssel*. Waanders, Zwolle, 120 pp. In Dutch.
- SCHIPPER, W.J.A. 1972. Vermoedelijk broedgeval van de Bonte Strandloper, *Calidris alpina*, in Oostelijk Flevoland. *Limosa* 45: 95-96. In Dutch.
- SCHOUW, J. & VAN DER VET, P. 1977. *Onderzoek naar de vogelstand in het Beneden-Linge gebied*. Doktoraalverslag L.H./Natuurbeheer, no. 356, Wageningen. In Dutch.
- SIKKEMA, K. 1973. *Mogelijke samenhang tussen vegetatie en broedplaatsen van enkele van onze weidevogels*. Karteringsverslag no. 149, C.A.B.O., Wageningen. In Dutch.
- SMIT, C.J. & WOLFF, W.J. (eds.). 1980. *Birds of the Wadden Sea*. A.A. Balkema, Rotterdam.
- SOLLIE, J.F. 1961. Twee broedgevallen van de Morinelpievier in de Noordoostpolder. [Two broods of Dotterel in the Noordoostpolder.] *Limosa* 34: 274-276. In Dutch.
- STOCKMANN, L. 1978. *Een onderzoek naar het gebruik door weidevogels van het weidevogelsreservaat "De Kievitslanden" in Oostelijk Flevoland*. Werkdocument 1978-224 Abw., R.I.J.P., Lelystad.
- STRIJBOS, J.P. 1980. De Griel: een duinvogel die verdwijnen moest. [Stone Curlew: a bird of the dunes that had to disappear.] *Vogeljaar* 28: 80-88. In Dutch.
- TAK, R. 1982. *Weidevogels in Driebruggen. Een onderzoek naar de relatie tussen de agrarische bedrijfsvoering en de broedpaardichtheid van weidevogels in het Landinrichtingsgebied "Driebruggen"*. Stageverslag R.H.T.L.S. Boskoop/L.D. Utrecht. In Dutch.
- TANGER, D. 1979. Het weidevogelbroedseizoen 1978 in twee Noordhollandse graslandgebieden. [Meadowbird-season 1978 in two grassland-areas in Noord-Holland.] *Pieper* 18(5): 53-62. In Dutch.
- TANGER, D. 1981. Het verloop van de broedseizoenen van weidevogels in 1978 en 1979 in Starnmeer en Westwouderpolder. [The breeding seasons 1978 & 1979 of meadowbirds, Lapwing, Black-tailed Godwit & Redshank, in Starnmeer & Westwouderpolder, Noord-Holland.] *Graspieper* 1: 65-70. In Dutch.
- TANGER, D. 1982. Broedende weide- en watervogels in de Westwouderpolder in 1978, 1979 en 1980. [Breeding meadow- & waterbirds in Westwouderpolder, N. Holland in 1978, 1979 & 1980.] *Grutter* 6: 89-94. In Dutch.
- TANGER, D., BOUMA, P.W. & HAITJEMA, T. 1979. Broedvogelinventariraties in de Haanmeer in 1977 en 1978. [Breeding birds in the Haanmeer 1977-1978.] In: *Jaarboek 1978 VWG Friese IJsselmeeerkust e.o.*: 5-8. In Dutch.
- TENSEN, D. 1984. *Het voedselaanbod voor gruttoekinkens in de loop van het seizoen*. Doktoraalverslag V.U., Amsterdam/Rapport R.I.N., Leersum. In Dutch.
- TEIXEIRA, R.M. (ed.). 1979. *Atlas van de Nederlandse Broedvogels*. [Atlas of the Dutch Breeding Birds.] Natuurmonumenten, 's-Graveland, 431 pp. In Dutch.
- TIMMERMAN, A. 1951. Een nieuw broedvogel van de Oeverloper *Actitis hypoleucus* (l.) in Nederland. *Limosa* 24: 6-7. In Dutch.

- TIMMERMAN,A.Azn. 1972. De broedvogelsamenstelling van het Lauwerseengebied voor en na de afsluiting. [Breeding birds of the Lauwerszee-area before and after reclamation.] *De Levende Natuur* 75: 172-179. In Dutch.
- TIMMERMAN,A.Azn. 1973. Weidevogelgebieden, onstaan en toekomst, biotoopeisen van weidevogels, veranderende landbouwmethoden; goede weidevogelstanden; weidevogelreservaten. Rapport SBB, Natuurbehoud, Leeuwarden. In Dutch.
- TIMMERMAN,A.Azn. 1975. Verslag van enkele inventarisaties van de weidevogelstand bij verschillende intensiteit van agrarisch gebruik in het Zwettegebied. Rapport no. 4, SBB, Natuurbehoud, Leeuwarden. In Dutch.
- TIMMERMAN,A.Azn. 1980. Weidevogels in het weidse Friesland. [Meadowbirds in Friesland.] *Noorderbreedte* 4: 43-48. In Dutch.
- TIMMERMAN,A.Azn. & VISSER,K. 1979. De Banckspolder op Schiermonnikoog: vegetatie en broedvogels op een weidevogelbedrijf. [Banckspolder on Schiermonnikoog: vegetation and breeding birds on a "meadowbird-farm".] *Waddenbulletin* 14(3): 135-141. In Dutch.
- TJALLINGII,S. 1970. Inventarisatie van de in 1969 in Nederland broeden de Kluten. [Survey of Avocets breeding in The Netherlands in 1969.] *De Levende Natuur* 73: 222-229, 251-255. In Dutch.
- TOLK,R. 1983. De Meeslouwerpolder ontwikkeling van opspuitterrein tot klein vogelparadijs. [The Meeslouwerpolder: a sand depot develops into small birds' paradise.] *Vogeljaar* 31: 236-244. In Dutch.
- VELDMAN,D. 1982. Bepaling van legdata van weidevogels en het broedverloop in verschillende biotopen maart tm juni 1980. Report R.I.N., Leersum/Report R.U. Groningen, 62 pp. In Dutch.
- VERMEER,P.J.M. 1981. Nestresultaten onderzoek 1981 in het reconstructiegebied Midden-Delfland, polder Noord-Kethel. Rapport Bureau Uitvoering Reconstructie Midden-Delfland, Maasland. In Dutch.
- VERSCHUREN,R. 1984. De verstoring van de grutto, scholekster en kievit door de fietspaden. *De Rijge Kade en De Mattenkade in de Rijnstreek-Zuid.* Doktoraalverslag R.U. Leiden. In Dutch.
- VISSER,D. 1980. Nestresultaten onderzoek 1980 in het reconstructiegebied Noord-Kethel. Rapport Bureau Uitvoering Reconstructie Midden-Delfland, Maasland. In Dutch.
- VISSER,H. 1983. Opgroeiende kievit-, grutto- en tureluurskiukens, maart-june 1983. Doktoraalverslag R.U. Groningen/Rapport R.I.N., Leersum, 43 pp. In Dutch.
- VLEUGEL,D.A. & WILMINCK,G.F. 1953. Steltklutenvoorvalen met broedgevallen in ons land. [Invasions of Black-winged Stilt with breeding attempts in our country.] *De Levende Natuur* 56: 101-108. In Dutch.
- VOGELWERKGROEP AVIFAUNA WEST-NEDERLAND. 1981. Randstad en broedvogels. Tilburg. In Dutch.
- VRIES,D.M.DE. 1972. Veranderingen in de vogelstand van een graslandgebied gedurende twintig jaren. [Changes in meadowbirds populations over 20 years.] *Landbouwk. Tijdschr.* 84: 15-24. In Dutch.
- VRIES,D.M.DE. & DE VRIES-SMEENK,G. 1975. Vogelstand in mei van een graslandgebied gedurende de laatste kwart eeuw. [Meadowbird populations in May during the last quarter of a century.] *De Levende Natuur* 78: 129-144. In Dutch.
- VRIES,F.D.E. 1984. Groeipatronen en geboortegolven van kievit, grutto en tureluur. Doktoraalverslag R.U. Utrecht/Rapport R.I.N., Leersum. In Dutch.
- VRIES,G.W.D.E. 1984. Een weidevogel-inventarisatie in een beekdal van de Drentsche Aa. [A meadowbird-survey in a valley of the river Drensch Aa.] *Vogeljaar* 32: 201-209. In Dutch.
- WERF,D.VAN DER. 1974. Invloeden van agrarische methoden op de weidevogelstand. Doktoraalverslag K.U. Nijmegen/Rapport R.I.N., Leersum. In Dutch.
- WERKGROEP WEIDEVOGELS NOORHOLLANDS NOORDERKEVARTIER. 1982. Weidevogels in Noordhollands Noorderkewertier. [Meadowbirds in Noordhollands Noorderkewertier.] Publikatie S.V.N., 120 pp. In Dutch.
- WESSELIUS,E. 1983. Over de invloed van wegen, spoorlijnen en bebouwingen op territoriumdichtheden van weidevogels. Intern rapport SBB, Natuurbehoud, Leeuwarden. In Dutch.
- WESSELS,B. 1982. Terreingebruik en reproduktiesucces van de fazant, patrijs, wulp en grutto in het Fochteloerveen. Doktoraalverslag R.U. Utrecht/Rapport R.I.N., Arnhem. In Dutch.
- WIEGERSMA,J. 1982. Resultaten van de inventarisatie en de nazorg van weidevogels. [Results of the survey and protection of meadowbirds, Friesland.] *Fjildrop* 1982: 2-11. In Dutch.
- WIND,H. 1977. De invloed van wegen en boerderijen op de verspreiding van weidevogels. Doktoraalverslag L.H., Natuurbeheer, no. 407, Wageningen. In Dutch.
- WINKELMAN,J.E. & UDO DE HAES,H.A. 1982. De effecten op de broedvogelstand van de waterwinningsprojekten in het Integraal Onderzoek Drinkwatervoorziening Zuid-Holland. Rapport no. LE-82-8A, C.M.L., Leiden. In Dutch.
- WIT,A. 1978. Vergelijkende weidevogeltellingen in de Niedorperkogge 1967-1977. [Comparation of meadowbird counts in Niedorperkogge 1967-1977.] *Pieper* 17(4): 37-44. In Dutch.
- WOLFF,W.J. 1968. Een samenvatting van de gegevens over de Kluten van het Deltagebied in de loop van het jaar. [Summary of data on Avocets in the Delta throughout the year.] *De Levende Natuur* 71: 35-42. In Dutch.
- WEIJER,W.D.E. 1976. De relaties tussen broedplaatsen van weidevogels en de vegetatie in de Riperkrite. Doktoraalverslag R.U. Utrecht/Rapport R.I.N., Leersum. In Dutch.
- ZOMERDIJK,P.J. 1977. De achteruitgang van de kempaan als broedvogel in Noord-Holland-Noord. [The decline of the Ruff as a breeding bird in Noord-Holland-Noord.] *Pieper* 16: 77-91. In Dutch.



## 6.62. BELGIUM AND LUXEMBURG

- COMMISSION POUR L'AVIFAUNE BELGE. 1967. Avifaune de Belgique. *Gerfaut* 57: 365-465.
- DEVOCHT,J., PAULUSSEN,W. & PINCEEL,L. 1974. Inventaris der broedparen van Grutto, Wulp, Tureluur en Scholekster in de Turnhoutse Kempen. [Survey of breeding Black-tailed Godwits, Curlews, Redshanks and Oystercatchers of 'Turnhoutse Kempen'.] *Wielewaal* 40: 8-14. In Flemish.
- LIPPENS,L. 1954. Les oiseaux d'eau de Belgique. 2 ième ed. Vercruyse-Vanhove, St. Andries-Brugge.
- LIPPENS,L. & WILLE,H. 1972. Atlas van de vogels in België en West-Europa. Lannoo, Tielt. In Flemish.
- LIPPENS,L., MAES,P. & VOET,H. 1966. De Steltkluten invasie 1965 in België en Nederland. [The invasion of Black-winged Stilts in Belgium and The Netherlands in 1965.] *Gerfaut* 56: 135-161. In Flemish.
- GEUENS,A. 1981. Broedgeval van de Goudplevier, *Pluvialis apricaria*, in Limburg. [Breeding Golden Plovers in Limburg.] *Wielewaal* 47: 181-182. In Flemish.
- GODIN,J. & LOISON,M. 1978. Nidification a la Barge a queue noire (*Limosa limosa*) en Hainaut occidental. *Gerfaut* 68: 115-116.
- GOMPEL,J.VAN. 1978. De broedvogels van het weidegebied van Uitkerke (Blankenberge). [The breeding birds of the meadow-area of Uitkerke (Blankenberge).] *Wielewaal* 44: 229-236. In Flemish.
- HUBAUI,D. 1984. Premier cas de nidification de l'Acocette (*Recurvirostra avosetta*) en Wallonie et Statut régional de l'espèce. *Aves* 21: 227-236.
- KARIGER,J. 1975. Die Kiebitz wiessen zwischen Imbringen und Altlinster. *Regulus* 11: 344-345.
- LAMBERT,M. & DEWITTE,T. 1985. Nidification du Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*) dans l'Entre-Sambre-et-Meuse en 1985. *Aves* 22: 216-218.
- MEEUS,H., BERCKVENS,L. & LEESTMAN,J. 1979. Inventaris 1978 van de broedparen van Grutto (*Limosa limosa*), Wulp (*Numenius arquata*), Tureluur (*Tringa totanus*) en Scholekster (*Haematopus ostralegus*) in de Turnhoutse Kempen. [Survey 1978 of breeding Black-tailed Godwits, Curlews, Redshanks and Oystercatchers in the 'Turnhoutse Kempen'.] *Wielewaal* 45: 2-9. In Flemish.
- SCHMITZ,J.P. 1981. Die Bekassine - vom Aussterben bedroht. *Regulus* 14: 80-81.
- STEEMAN,C. 1983. Nieuwe broedgevallen van Bonte Strandloper *Calidris alpina schinzii* op linker Scheldeoever in 1983. [New breeding attempts of Dunlin on left shore of Scheldt in 1983.] *Wielewaal* 49: 338-340. In Flemish.
- TRICOT,J. 1968. Les zones de nidification du Vanneau en Belgique. *Aves* 5: 113-124.
- TRICOT,J. 1969. Les zones de nidification du Vanneau en belgique. *Aves* 6: 31-32.
- VERHEYEN,R. 1948. *Les Echassiers de Belgique*. Bruxelles.
- VERHEYEN,R. 1957. Over de Laro-limicolae als broedvogels in België. [On the larids and waders as breeding birds in Belgium.] *Gerfaut* 47: 57-74. In Flemish.
- VOET,H. 1969. Een nieuwe beduidende vestiging van de Steltkluut in 1967 aan de Beneden-Schelde in verband met een kleine invarie in Europa. [A new important breeding site of Black-winged Stilts in 1967 at Lower Scheldt.] *Gerfaut* 59: 3-30. In Flemish.
- VOET,H. 1970. Esquisse du statut actuel des limicoles nicheurs en Belgique. *Gerfaut* 60: 198-223.
- VOET,H., MEEUS,H. & MAES,P. 1982. Broedvogel-inventarisatie van de steltlopers in Vlaanderen-1981. [Breeding wader survey of Flanders-1981.] *Wielewaal* 48: 201-218. In Flemish with English summary.
- WASSENICH,V. 1967. Der gegenwärtige Brutbestand des Kiebitzes in Luxemburg. *Regulus* 9: 103-112.
- WASSENICH,V. 1973. (New breeding sites and the 1973 population of the Little Ringed Plover (*Charadrius dubius*) in Luxemburg.) *Regulus* 11: 70-75. In German with English summary.

## 6.63. GREAT BRITAIN

- ALEXANDER,W.B. 1945/47. The Woodcock in the British Isles. *Ibis* 87: 512-550; 88: 1-24, 159-179, 271-286, 427-424; 89: 1-28.
- ALEXANDER,W.B. & LACK,D. 1944. Changes in status among British breeding birds. *Brit. Birds* 38: 62-69.
- BARRETT,J. & BARRETT,C.F. 1984. Breeding lowland waders in east Sutherland. *Scot. Birds* 13: 2-7.
- BELL,M.V. 1979. The status of Golden Plover (*Pluvialis apricaria*) and Dunlin (*Calidris alpina*) in Upper Wharfedale. *Naturalist* 104: 95-100.
- BOYD,J.M. 1956. Fluctuations of Common Snipe, Jack Snipe and Golden Plover in Tiree, Argyllshire. *Bird Study* 3: 105-118.
- BRIGGS,K.B. 1982. The breeding population of Oystercatchers in north-west England. *Naturalist* 107: 61-65.
- BRIGGS,K. 1983. The distribution and reproduction of Ringed Plovers breeding coastally and inland in north-west England. *Bird Study* 30: 222-228.
- BROWN,B.J. 1981. Breeding waders of wet meadows - Suffolk Pilot Survey 1981. *BTO News* 117:5.
- BROWN,P.E. 1949. The breeding of Avocets in England, 1948. *Brit. Birds* 42: 2-12.
- BROWN,P.E. 1950. Avocets in England. Report RSPB, London.
- BROWN,P.E. & LYNN-ALLEN,E. 1948. The breeding of Avocets in England in 1947. *Brit. Birds* 41: 14-17.
- BUNDY,G. 1978. Some breeding birds of Unst. *Scot. Birds* 10: 38-50.
- BUXTON,E.J.M. 1961. The inland breeding of the Oystercatcher in Great Britain, 1958-59. *Bird Study* 8: 194-209.
- BUXTON,N.E. 1983. The breeding wader populations of the Western Isles of Scotland and the integrated development programme. In: Evans,P.R., Hafner,H. & L'Hermite,P. (eds.). *Shorebirds and Large Waterbirds Conservation EC proceedings:* 34-35.

- BUXTON,N.E., GREEN,G.H. & LANGSLOW,D.R. 1984. The breeding wader populations on the machairs and blackland of the Southern Isles, Outer Hebrides. *Hebridean Naturalist* 8: 5-9.
- CADBURY,C.J. & OLNEY,P.J.S. 1978. Avocet population dynamics in England. *Brit. Birds* 71: 102-121.
- CADBURY,C.J. & HOUSDEN,S. 1982. Outer Hebrides - threat to breeding waders. *Wader Study Group Bull.* 35:5.
- CADBURY,J.C. 1979. Probable breeding of the Ruff in the Hebrides. *Scot. Birds* 10: 237-238.
- CAWKELL,E.M. 1947. Increase of Oystercatcher as breeder in East Sussex. *Brit. Birds* 40:126.
- COTTIER,E.J. & LEA,D. 1969. Black-tailed Godwits, Ruffs and Black Terns breeding on the Ouse Washes. *Brit. Birds* 62: 259-270.
- COWPER,C.N.L. 1973. Breeding distribution of Grey Wagtails, Dippers and Common Sandpipers on the Midlothian Esk. *Scot. Birds* 7: 302-306.
- CUNNINGHAM,P. 1983. *The birds of the Outer Hebrides: a guide to their status and distribution.* Melven Press, Perth, 241 pp.
- CUTHBERTSON,E.I., FOGGITT,G.T. & BELL,M.A. 1952. A census of Common Sandpipers in the Sedbergh area, 1951. *Brit. Birds* 45: 171-175.
- DA PRATO,S.R.D. 1985. The breeding birds of agricultural land in south-east Scotland. *Scot. Birds* 13: 203-216.
- DARE,P.J. 1966. The breeding and wintering populations of the Oystercatcher (*Haematopus ostralegus* Linneaus) in the British Isles. *Fishery Investigations Ser. II Vol. XXV, Nr. 5:* 1-69.
- DAVIS,T. 1983. Censusing breeding waders on Outer Hebridean machair. *BTO News* 129:9.
- DENNIS,R.H. 1972. Temmincks Stint nesting in Scotland. *Brit. Birds* 65:481.
- DENNIS,R.H. 1983. Purple Sandpipers breeding in Scotland. *Brit. Birds* 76: 563-566.
- DOWNHILL,I.R. & HALLAS,G. 1959. Wood Sandpiper breeding in Sutherland. *Scot. Birds* 1: 150-151.
- DOWNHILL,I.R. & PENNIE,I.D. 1963. Wood Sandpipers breeding in Sutherland. *Scot. Birds* 2:309.
- ENGLAND,M.D., HOHN,E.O., PEDLER,E.G. & TUCKER,B.W. 1944. The breeding of the Little Ringed Plover in England in 1944. *Brit. Birds* 38: 102-111.
- ETHERIDGE,B. 1982. Distribution of Dunlin *Calidris alpina* nests on an area of South Uist machair. *Bird Study* 29: 239-243.
- EVERETT,M.J. 1971. Breeding status of Red-necked Phalaropes in Britain and Ireland. *Brit. Birds* 64: 293-302.
- FERGUSON-LEES,I.J. 1971. Studies of less familiar birds. 164. Wood Sandpiper. *Brit. Birds* 64: 114-117.
- FULLER,R.J. 1978. Breeding populations of Ringed Plover and Dunlin on the Uists and Benbecula, Outer Hebrides. *Bird Study* 25: 97-102.
- FULLER,R.J. 1981. The breeding habitats of waders on North Uist machair. *Scot. Birds* 11: 142-152.
- FULLER,R.J. 1983. The Hebridean Machair and its breeding waders. *Wader Study Group Bull.* 37:8. Abstract.
- FULLER,R.J., WILSON,J.R. & COXON,P. 1979. Birds of the Outer Hebrides: the waders. *Proc. R. Soc. Edinb.* 77B: 419-430.
- FULLER,R. & BUXTON,N. 1983. The machair of the Outer Hebrides. *Wader Study Group Bull.* 39: 9-13.
- FULLER,R.J., GREEN,G.H. & PIENKOWSKI,M.W. 1985. Surveys of breeding waders (*Charadriii*) in the Outer Hebrides 1983 & 1984. *Bull. Brit. Ecol. Soc.* 16: 163-166.
- FULLER,R.J., GREEN,G.H. & PIENKOWSKI,M.W. 1985. Surveys of breeding waders in the southern isles of the Outer Hebrides - A progress report. *Wader Study Group Bull.* 43: 14-15.
- FURNESS,R.W. 1983. Breeding waders of the Yarrow Valley; effects of agricultural change and a cold winter. *Wader Study Group Bull.* 37:9. Abstract.
- GALBRAITH,H. 1981. Survey of the breeding waders of Scottish agricultural land. *BTO News* 117: 4-5.
- GALBRAITH,H. 1982. *The breeding waders of Upper Glen Fruin, Dunbartonshire.* NCC Report, Balloch, Scotland.
- GALBRAITH,H. & FURNESS,R.W. 1981. Censusing breeding waders on agricultural land in Scotland. *Wader Study Group Bull.* 33: 12-13.
- GALBRAITH,H. & FURNESS,R.W. 1983. Breeding waders on agricultural land. *Scot. Birds* 12: 148-153.
- GALBRAITH,H. & FURNESS,R.W. 1983. The WSG Survey of the breeding waders of Scottish agricultural land. *Wader Study Group Bull.* 39:30.
- GALBRAITH,H., FURNESS,R.W. & FULLER,R.J. 1984. Habitats and distribution of waders breeding on Scottish agricultural land. *Scot. Birds* 13: 98-107.
- GLUE,D.E. 1971. Saltmarsh reclamation stages and their associated bird life. *Bird Study* 18: 187-198.
- GORDON,S., HEWSON,R., NETHERSOLE-THOMPSON,D., TEWNION,R. & WATSON,A. 1957. "Northern" Golden Plovers in northern parts of Scotland. *Scot. Nat.* 69: 120-124.
- GREEN,G.H. 1983. WSG Survey to determine the number and distribution of waders breeding on the western seaboard of the Outer Hebrides, Scotland. *Wader Study Group Bull.* 38: 6-7.
- GREEN,G.H. 1983. WSG/NCC Survey of waders breeding on the Hebridean machair and adjacent land, 1983. *Wader Study Group Bull.* 39: 5-8.
- GREEN,G.H. (ed.). 1984. *A survey of waders breeding on the west coast of the Uists and Benbecula (Outer Hebrides) 1983.* Published jointly by the Wader Study Group and the Nature Conservancy Council, 9 pp.
- GREENHALGH,M.E. 1969. The populations of Redshank and Dunlin on saltmarshes in northwest England. *Bird Study* 16: 63-64.
- GREENHALGH,M.E. 1969. The breeding of the Oystercatcher in North-west England. *Naturalist* 909: 43-47.
- HARRISON,J.M. & HARRISON,J.G. 1965. The juvenile plumage of the Icelandic Black-tailed Godwit and further occurrences of this race in England. *Brit. Birds* 58: 10-14.
- HEADLAM,C.J. 1971. Whimbrel breeding at sea level in northern Highlands. *Scot. Birds* 6: 278-280.
- HEADLAM,C.G. 1972. Temminck's Stints breeding in Scotland. *Scot. Birds* 7:94.
- HEPBURN,I.R., SCHOFIELD,P. & SCHOFIELD,R.A. 1977. The birds of the Monarch Isles, Outer Hebrides. *Bird Study* 24: 25-46.
- HOLLAND,P.J.K., ROBSON,J.E. & YALDEN,D.W. 1982. The status and distribution of the Common Sandpiper (*Actitis hypoleucus*) in the Peak District. *Naturalist* 107: 77-86.
- JACKSON,R. & JACKSON,J. 1980. A study of Lapwing breeding population changes in the New Forest, Hampshire. *Bird Study* 27: 27-34.
- LEA,D. & BOURNE,W.R.P. 1975. The birds of Orkney. *Brit. Birds* 68: 261-283.
- LISTER,M.D. 1939. An account of the Lapwing population on a Surrey farm. *Brit. Birds* 32: 260-271.
- LISTER,M.D. 1964. The Lapwing habitat enquiry, 1960-61. *Bird Study* 11: 128-147.

- LOWE, P.R. 1935. Remarks on a well-authenticated clutch of four eggs of Temminck's Stint laid in the British Isles. *Bull. Brit. Orn. Club* 55: 7-8.
- MARCHANT, J.H. 1978. Bird population changes for the years 1976-77. *Bird Study* 25: 245-252.
- MEAD, C.J. 1981. The status of the Stone Curlew *Burhinus oedicnemus* in England. Report BTO, Tring, 24 pp.
- MITCHELL, O. 1983. The breeding status and distribution of Snipe, Redshank and Yellow Wagtail in Sussex. *Sussex Bird Rept.* 34(1981): 65-71.
- MOORE, R. 1969. The birds of Devon. Newton Abbott.
- MORGAN, R.A. 1975. Breeding bird communities on chalk downland in Wiltshire. *Bird Study* 22: 71-83.
- MORGAN, R.A. 1978. Changes in the breeding bird community at Gibraltar Point, Lincolnshire, between 1965 and 1974. *Bird Study* 25: 51-58.
- MORGAN, R. & SHORTEN, M. 1974. Breeding of the Woodcock in Britain. *Bird Study* 21: 193-199.
- MURFIT, R.C. & WEAVER, D.J. 1982. Breeding waders of wet meadows in Norfolk. *Norfolk Bird & Mammal Report* 1982: 196-202.
- MURRAY, R.D. 1979. Colonization of Scotland by northern birds, 1820-1977. *Scot. Birds* 10: 158-174.
- NETHERSOLE-THOMPSON, D. 1981. Greenshanks *Tringa nebularia* in north-west Sutherland. *Ibis* 123: 577-578.
- NICHOLSON, E.M. 1938. Report on the Lapwing habitat enquiry, 1937. *Brit. Birds* 32: 170-191, 207-229, 255-259.
- PARR, R. 1980. Population study of Golden Plover *Pluvialis apricaria* using marked birds. *Ornis Scand.* 11: 179-189.
- PARRINDER, E.R. 1964. Little Ringed Plovers in Britain during 1960-62. *Brit. Birds* 57: 191-198.
- PARRINDER, E.R. & PARRINDER, E.D. 1969. Little Ringed Plovers in Britain in 1963-67. *Brit. Birds* 62: 219-223.
- PARRINDER, E.R. & PARRINDER, E.D. 1975. Little Ringed Plovers in Britain in 1968-73. *Brit. Birds* 68: 359-368.
- PENHALLURICK, R.D. 1969. Birds of the Cornish Coast. Truro.
- PRATER, A.J. 1976. Breeding population of the Ringed Plover in Britain. *Bird Study* 23: 155-161.
- PRATER, A.J. 1984. Ringed Plover Survey. *BTO News* 31: 3.
- RANKIN, G.D. 1979. Breeding waders on Rockliff Marsh. *Wader Study Group Bull.* 26: 25.
- REED, T. 1985. Estimates of British breeding wader populations. *Wader Study Group Bull.* 45: 11-12.
- REED, T.M., LANGSLOW, D.R. & SYMONDS, F.L. 1983. Breeding waders of the Caithness flows. *Scot. Birds* 12: 180-186.
- SHARROCK, J.T.R. 1976. The atlas of breeding birds in Britain and Ireland. BTO, Tring.
- SHAW, G. 1975. The breeding birds of Crom Mhin, Loch Lomond. *Scot. Birds* 8: 356-363.
- SHRUBB, M. 1968. The status and distribution of Snipe, Redshank and Yellow Wagtail as breeding birds in Sussex. *Sussex Bird Rept.* 20: 53-60.
- SITTERS, H. 1974. *Atlas of Breeding Birds in Devon*. Plymouth.
- SMITH, K. 1983. Where are all the waders? *BTO News* 125: 3.
- SMITH, K.W. 1983. The status and distribution of waders breeding on wet grasslands in England and Wales. *Bird Study* 30: 177-192.
- SMITH, K. 1984. Lowland wader surveys. *BTO News* 31: 9.
- SMITH, K. 1984. Breeding waders of lowland grasslands - a new WSG/BTO project. *Wader Study Group Bull.* 40: 7.
- SMITH, K. 1984. Wader numbers on lowland agricultural land in England, Wales and Scotland. *Wader Study Group Bull.* 40: 30-31.
- SMITH, K. 1985. Breeding wader monitoring. *BTO News* 136: 3.
- SMITH, K. & WILLIAMS, G. 1982. Breeding wader surveys. *BTO News* 119: 4-5.
- SPENCER, K.G. 1953. *The Lapwing in Britain*. Brown, London, 166 pp.
- STALKER, D. 1969. Little Ringed Plovers breeding in Clyde. *Scot. Birds* 5: 282-283.
- STANFORD, J.K. 1955. The Common Curlew as a Wiltshire breeding bird. *Wilts. Arch. Nat. Hist. Mag.* 56: 30-34.
- STATTON, J. 1945. The breeding of Black-winged Stilts in Nottinghamshire in 1945. *Brit. Birds* 38: 322-328.
- STEVENTON, D.J. 1984. Breeding waders of wet meadows in Hampshire. *Hampshire Bird Report* 1983: 70-73.
- SYMONDS, F.L. 1981. A survey of breeding waders and wildfowl in Caithness. *Wader Study Group Bull.* 31: 9.
- TAYLOR, G.K. & MARCHANT, J.H. 1983. Population changes for waterways birds, 1981-1982. *Bird Study* 30: 121-126.
- THOM, V.M. 1966. Probable breeding of Wood Sandpipers in Perthshire. *Scot. Birds* 4: 228. THOM, V.M. 1986. *Birds in Scotland*. Poyser, Calton. 380 pp.
- THOMAS, J.F. 1942. Report on the Redshank Enquiry 1939-40. *Brit. Birds* 36: 5-14, 22-34.
- THOMPSON, P.S. 1983. Dotterel numbers and breeding in Central Grampians. *Scot. Birds* 12: 190-191.
- VENABLES, L.S.V. & VENABLES, U.M. 1955. *Birds and mammals of Shetland*. Edinburgh.
- WATSON, D. 1972. *Birds of moor and mountain*. Edinburgh.
- WILLIAMSON, K. 1951. The moorland birds of Unst, Shetland. *Scot. Nat.* 63: 37-44.
- WILLIAMSON, K. 1968. Bird communities in the Malham Tarn region of the Pennines. *Field Studies* 2: 651-668.
- WILSON, G.E. 1976. Spotted Sandpipers nesting in Scotland. *Brit. Birds* 69: 288-292.
- WILSON, J.R. 1978. Agricultural influences on waders nesting on the South Uist machair. *Bird Study* 25: 198-206.
- YALDEN, D.W. 1974. The status of the Golden Plover (*Pluvialis apricaria*) and Dunlin (*Calidris alpina*) in the Peak District. *Naturalist* 930: 81-91.



## 6.64. IRELAND

- ENNIS,T. 1979. Breeding Golden Plovers *Pluvialis apricaria* (L.) in Co. Antrim. *Irish Nat. J.* 19: 424-425.
- EVERETT,M.J. 1971. Breeding status of Red-necked Phalarope in Britain and Ireland. *Brit. Birds* 64: 293-302.
- HUTCHINSON,C. 1979. *Ireland's Wetlands and their birds*. Irish Wildlife Conservancy, Dublin, 201 pp.
- MERNE,O.J. 1974. Waders in Ireland. *Proc. Wader Symp. IWRB Warsaw* 1973: 37-48.
- NAIRN,R.G.W. & SHEPPARD,J.R. 1985. Breeding waders of sand dune machair in northwest Ireland. *Irish Birds* 3: 53-70.
- O'SULLIVAN,D. & SHORTEN,M. 1978. Little Ringed Plover in Co. Cork. *Irish Birds* 1: 550-551.
- RUTTLEDGE,R.F. 1978. Red-necked Phalarope breeding south of latitude 53° 37' in Ireland. *Irish Birds* 1: 229-231.
- RUTTLEDGE,R.F. 1978. Greenshanks nesting in Ireland. *Irish Birds* 1: 236-238.
- RUTTLEDGE,R.F. 1982. Red-necked Phalarope - a hitherto unrecorded case of breeding in Co. Mayo. *Irish Birds* 2: 196-197.
- SHARROCK,J.T.R. 1976. *The atlas of breeding birds in Britain and Ireland*. BTO, Tring.
- STRONACH,B. 1979. Woodcock reproductive activity in february in Ireland. *Proc. First Eur. Woodcock & Snipe Workshop IWRB*: 45.

## 6.65. FRANCE

compiled by Brigitte Vadier

- ANONYMOUS. 1955. Nos etudes: etangs de Saint-Quentin et de Saclay. *Oiseaux France* 12: 44-51.
- ANONYMOUS. 1956. Les etangs de Saint-Quentin et de Saclay. *Oiseaux France* 14: 82-83.
- ANONYMOUS. 1958. Actualites regionales: la Sologne. Nidification du Courlis cendre (*Numenius arquata*). *Oiseaux France* 22:24.
- ANONYMOUS. 1961. La nidification des Vanneaux huppée (*Vanellus vanellus*) en France. *Oiseaux France* 32:3.
- ANONYMOUS. 1962. Quelques additions au statut des limicoles nicheurs. *Oiseaux France* 34:11.
- ANONYMOUS. 1964a. Nouveautés pour le statut des limicoles nicheurs. *Oiseaux France* 41:25.
- ANONYMOUS. 1964b. Nouveautés sur la répartition des oiseaux nicheurs de France. *Oiseaux France* 42: 27-32.
- ANONYMOUS. 1968. Résultats de l'enquête sur la nidification du Vanneau huppe dans la Nord et le Pas-de-Calais au printemps 1967. *Heron* 1968(1): 10-11.
- ANONYMOUS. 1971. Oiseaux nicheurs en Allier. *Grand Duc* (automne 71): 21-27.
- ANONYMOUS. 1975. Inventaire provisoire des oiseaux et migrateurs des Cévennes. *Grand Duc* (décembre 75): 3-14.
- ANONYMOUS. 1976. Observations estivales et nidification 1975. *Bull. G.O. Vienne* 7: 3-22.
- ANONYMOUS. 1976. Nidification d'Avocettes. Ass. Marq. Nat., 3 pp.
- ANONYMOUS. 1977. Nidification de l'Avocette. Ass. Marq. Nat., pp. 9-10.
- ANONYMOUS. 1978. Atlas qualitatif des oiseaux du Massif Central, additif. *Grand Duc* (novembre 78): 67-73.
- ANONYMOUS. 1978. La colonie d'Avocettes. Ass. Marq. Nat., pp. 10-11.
- ANONYMOUS. 1979. La colonie d'Avocettes. Ass. Marq. Nat., p.11.
- ANONYMOUS. 1980. La nidification du Chevalier gambette en Bretagne: données récentes. *Bull. liaison Ar Vran* 24, no page-numbers.
- ANONYMOUS. 1981. La mise en réserve des basses vallées angevines. *Bull. Gr. Angevin Et. Orn.* N° spécial, 55 pp.
- ANONYMOUS. 1981. Marais de Lucon: étude du milieu naturel. Rapport L.P.O./D.R.A.E. Pays de Loire, 8 pp.
- ANONYMOUS. 1985. *La nidification des limicoles en France*. Notes Techniques Bull. Mensuel ONC No. 94, Septembre 1985, Fiche No. 24, 8 pp.
- ADRET,P., FOURNIER,O., ROUSSELOT,J. & WATIER,J-M. 1978. Premiers résultats de recherche sur la conservation de la population d'Avocette (*Recurvirostra avosetta*) en Vendée. *Heron* 4: 5-44.
- ANNEZO,J-P. 1979. Vanneau huppe en Bretagne. Effectif nicheur en 1970. *Bull. liaison Ar Vran* 19, no page-numbers.
- ANNEZO,J-P. 1980. Avifaune de la rivière et de la baie de Daoulas. Rapport dact., 13 pp.
- AUCLAIR. 1975. Avifaune de la région Montconnaise. *Revue scientifique du Bourbonnais* 1975: 5-30.
- AUCLAIR. 1979. Denombrement des oiseaux nicheurs sur un quadrat de bocage bourbonnais. *Grand Duc* (décembre 79): 65-86.
- BARDIN,M. 1937. Le Chevalier combattant en Vendée. *Oiseau et R.F.O.* 7:647.
- BARRUEL,P. 1949-1950. Notes sur les oiseaux des plateaux du Jurs. *Alauda* 17-18: 193-205.
- BAUDOUIN-BODIN,J. 1968. Statut actuel des oiseaux marins nicheurs en Bretagne. V. La Loire-Atlantique. *Ar Vran* I(4): 162-172.
- BEAUDOIN,J.C. 1963. Notes sur l'avifaune du Maine et Loire. *Oiseaux France* 39: 27-53.
- BEAUDOIN,J-C. & CORMIER,J-P. 1972. Nidification et estivage en 1970. *Bull. Group Angevin Et. Orn.* 6: 2-29.
- BEAUDOIN,J-C., JACQUEMIN,C., J-L., et al. 1979. Un cas de reproduction de la Becassine des marais (*Gallinago gallinago*). *Bull. Gr. Angevin Et. Orn.* 9(25): 66-67.
- BEAUDOIN,J-C., et al. 1980. Rapport sur la nidification et l'estivage 1978 en Maine-et-Loire. *Bull. G.A.E.O.* 28: 1-41.
- BEAUDOIN,J-C., et al. 1981. Rapport sur la nidification et l'estivage 1979 en Maine-et-Loire. *Bull. G.A.E.O.* 31: 1-37.
- BERNIER,B. 1978. Atlas des oiseaux nicheurs: mise à jour 1976-1978 et statut de quelques espèces de Normandie. *Cormoran* 4(19-20): 21-33.
- BERNIER,G. 1980. Noirmoutier, l'île aux oiseaux. *Les Amis de Noirmoutier* 38: 3-7.
- BERTHET,G. 1941-1945. Notes et remarques sur l'avifaune français. *Alauda* 13: 94-111.

- BERTRAND,A. 1983. Nidification de l'Echasse blanche (*Himantopus himantopus*) en Charente-Maritime en 1980. *Ann. Soc. Sci. Nat. Charente-Maritime* 7(1): 57-59.
- BESSON,A. 1958. Colonies d'Echasses et d'Avocettes dans la region d'Hyères (Var), 1er-10 juin 1957. *Alauda* 26: 67-68.
- BESSON,J. 1968. Contribution à l'étude de l'avifaune des marais salants et des marais résiduels de la région d'Hyères. *Ann. Soc. Sci. Nat. et Arch. Toulon et Var* 30: 129-153.
- BLANCHON,J-J. 1979. Nouvelles données sur la nidification du Courlis cendré dans la Vienne et intérêt ornithologique de la plaine de Bellefonds. *Outarde* 11: 72-73.
- BLANCHON,J-J. & DUBOIS,P. 1982. *Determination des zones écologiques sensibles par l'étude de l'avifaune en marais poitevin.* Rap. L.P.O./P.N.R. Marais Poitevin, 50 pp.
- BLANCHON,J-J., DUBOIS,P., METAIS,M. & TERRISSE,J. 1982. *Determination des zones écologiques sensibles par l'étude de la flore et de la faune des marais Charentais.* Rap. L.P.O./E.P.R. POITOU-CHARENTES, II, PP. 55, III, PP. 52.
- BLONDEL,J. 1960. Contribution à l'étude de l'avifaune de l'Etang d'Epoisses (Côte d'Or). *L'Oiseau et R.F.O.* 30: 135-163.
- BLONDEL,J. 1964. L'avifaune nidificatrice des eaux saumâtres camarguaises en 1962 et 1963 (uniquement laro-limicoles). *Terre et Vie* 1964: 309-330.
- BONNET DE PAILLERETS,C. 1927. Catalogue des oiseaux du département de la Charente-Inferieure. *R.F.O.* 11: 183-196.
- BOUBERT,J-J. 1979. Compte-rendu de nidification 1978 sur la réserve naturelle du Banc d'Arguin (Bassin d'Arcachon). *Courbageot* 6: 22-23.
- BOUBERT,J-J. 1980. Compte-rendu de la nidification sur la réserve naturelle du Banc d'Arguin (Gironde) en 1979. *Courbageot* 7-8: 23-26.
- BOUCHERUN,J-L. 1979. L'avifaune des milieux ouverts du Pays-Basque. *Courbageot* 6: 10-13.
- BOURBON,M., LEBRETON,P., & CZAJKOWSKI,M. 1973. Oiseaux de la Basse-Vallée de l'Ain. *Bull. Soc. Nat. Arch. Ain* 87: 37-52.
- BOURGUIGNON,C. 1978. Actualités sur les oiseaux nicheurs de la région parisienne. *Passer* 4: 5-13.
- BOUSQUET,J-F. 1979. Oiseaux d'eau nicheurs sur la Garonne. *Bull. de l'A.R.O.M.P.* 4: no page-numbers.
- BOUSQUET,J-F. 1983. Nidification de l'Echasse dans le Toulousain. *Bull. de l'Aromp* 7: 22-23.
- BOUTINOT,S. 1963. Notes complémentaires sur l'avifaune du Vermandois (Région de St Quentin). *Oiseau et R.F.O.* 33: 275-282.
- BOZEC,R. 1963. Nidification du Courlis cendré et du Vanneau huppe en Morbihan. *Oiseau et R.F.O.* 33: 74-76.
- BOZEC,R. 1968. Statut actuel des oiseaux marins nicheurs en Bretagne. *Ar Vran* I(3): 106-130.
- BRAILLON,B. 1969. Les oiseaux marins nicheurs de Basse-Normandie: dénombrements de 1969 et recapitulation des données entières. *Cormoran* 1(2): 42-64.
- BRAILLON,B. 1970. Les oiseaux marins nicheurs de Basse-Normandie. *Cormoran* 1(3): 100-101.
- BRIEN,Y. 1970. Statut actuel des oiseaux marins nicheurs en Bretagne. VIII. Mise au point en 1970: Visites récentes et état actuel des effectifs par localité. *Ar Vran* III(4): 167-275.
- BRIL,B., et al. 1978. Une saison de nidification remarquable dans la région dunkerquoise. *Heron* 78(1): 39-41.
- BRIL,B. & VERMERSCH,G. 1979. Notes sur la nidification dans la région dunkerquoise (Nord) au printemps 1978. *Heron* 79(1): 49-54.
- BROSSELIN,M. 1969. Ecologie et protection de la Nature: la réserve nationale de la Pointe d'Arcay (Vendée), l'avifaune. *Annales C.R.D.P., Poitiers*, pp. 5-17.
- BROSSELIN,M. 1969. Statut actuel des oiseaux marins nicheurs en Bretagne. VII. De Paimpol à l'embouchure du Couesnon. *Ar Vran* II(1): 26-37.
- BROSSELIN,M. & DIDIER,J. 1966. Nidification du Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*) à l'île Trevors (Nord-finistère). *Oiseau et R.F.O.* 36:69.
- BROYER,J. 1982. Contribution à la connaissance de l'avifaune du Val de Saône. *Bievre* 4(2): 98-116.
- BRUGIERE,D. 1981. Nidification remarquable du Grèbe huppe, du Vanneau huppe et probablement de la Becassine des marais en Haute-Auvergne. *Grand Duc* (octobre 81): 17-18.
- BRUGIERE,D. 1983. Avifaune du Barrage de Naussac (Lozère). *Grand Duc* (mai 83): 13-20.
- BRUNSTEIN-ALBERTINI,M. & WILLEMIN-ORLANDI,R. 1979. Synthèse des observations ornithologiques. *Bull. Assoc. des Amis du P.N.R. de la Corse*, 13 pp.
- BURNELEAU,G. & NICOLAU-GUILLAUMET,P. 1979. Recherches sur l'avifaune terrestre des îles du Ponant, les îles de Charente Maritime: l'île d'Oléron. *Ann. Soc. Sci. Nat. Charente Mar.* 6(6): 501-530.
- BURNELEAU,G. & NICOLAU-GUILLAUMET,P. 1981. Recherches sur l'avifaune terrestre des îles du Ponant, les îles de Charente Maritime: nouveautés 1975-1980. *Ann. Soc. Sci. Nat. Charente Mar.* 6(8): 897-910.
- CAMPREDON,P. 1976. Observations ornithologiques sur le Banc d'Arguin (Gironde). *Alauda* 44: 441-455.
- CARLINO,J., GEHARD,M. & LESCOURRET,F. 1984. [Another case of the Dotterel (*Charadrius morinellus*) nesting in the western French Pyrenees.] *Oiseau et R.F.O.* 54: 87-90.
- CAUPENNE,M. & COUILLAUD,B. 1981. Nidification 1980. *Outarde* 13: 64-74.
- CAUPENNE,M. & COUILLAUD,B. 1981. Nidification 1979. *Outarde* 13: 35-45.
- CENTRALE G.J.O. 1962. Quelques additions au statut des limicoles nicheurs. *Oiseaux France* 34:11.
- CENTRALE G.J.O. 1964. Nouveautés pour le statut des limicoles nicheurs. *Oiseaux France* 41:25.
- CENTRALE G.J.O. 1964. Nouveautés sur la répartition des oiseaux nicheurs en France. *Oiseaux France* 42: 27-32.
- CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHÔNE-ALPES. 1966. Compte-rendu ornithologique semestriel. Données sur la migration prénuptiale et la saison de nidification 1965 dans la région Rhône-Alpes. *Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon* 35(8-9): 393-424.
- C.O.A. 1977. *Atlas des oiseaux nicheurs du Massif Central.* Grand Duc.
- C.O.A.-SECTION(15). 1972. Liste des oiseaux nicheurs du Cantal. *Grand Duc* (avril 72): 45-50.
- C.O.A.-SECTION COUZE. 1972. Inventaire provisoire des oiseaux nicheurs de la Corrèze. *Grand Duc* (avril 72): 57-62.
- C.O.A.-SECTION CANTAL. 1972. Complément à la liste des oiseaux nicheurs du Cantal. *Grand Duc* (décembre 72): 39.
- CHABERT,B. & REYMONET,J-L. 1966. L'évolution des biotopes et de l'avifaune du marais des Echets (Ain) entre 1936 et 1965. *Nos Oiseaux* 28: 265-274.

- CHAUSSARD,J-P., et al. 1976. *La faune vertebree de Sologne. S.E.P.N. en Loir et Cher - S.R.E.*
- COCHET,G. 1979. *Atlas des oiseaux nicheurs du Massif Central. Additif 78-79. Grand Duc* (decembre 79): 93-94.
- COCHET,G. 1980. Trois nouvelles especes nicheuses en Ardeche. *Nature* 6: 14-16.
- COLETTE,J. & GRALL,Y. 1981. Observations ornithologiques a l'Etang de Morette (1974-1980). *Cormoran* 4(23): 202-210.
- COMMECTY,X. & TRIPLET,P. 1980. Synthese des observations 1979 dans la Somme. *Avocette* 4(3-4): 51-114.
- COMMECTY,X. & SUEUR,F. 1983. *Avifaune de la baie de Somme et de la Plaine maritime picarde. Amiens (GEPOP)*, 235 pp.
- COMMECTY,X. & SUEUR,F. 1983. La reserve de la Baie de Somme. *Homme et Oiseau* 21: 257-258.
- CONSTANT,P., et al. 1964. Avifaune du littoral boulonnais. I: les limicoles. *Alauda* 32: 133-142.
- CORDONNIER,P. 1971. Variations saisonnieres de la composition de l'avifaune du marais de Lavours (Ain). *Alauda* 39: 169-203.
- CORDONNIER,P. 1972. L'avifaune du marais de Lavours. *Bull. Soc. Nat. Arch. Ain* 84: 3-16.
- CORMIER,J-P. 1972. Vanneau huppe (*Vanellus vanellus*), colonies connues en 1970. Mise au point sur la reproduction en Maine-et-Loire. *Bull. Gr. Angevin et Orn.* 2(6): 30-31.
- CORMIER,J-P. 1973. Nidification et estivage en Maine-et-Loire, 1971. *Bull. G.A.E.O.* 8: 32-56.
- CORMIER,J-P. 1974. Rapport sur la nidification et l'estivage en Maine-et-Loire pour l'annee 1972. *Bull. G.A.E.O.* 10: 31-65.
- CORMIER,J-P., et al. 1976. Rapport sur la nidification et l'estivage en Maine-et-Loire durant l'annee 1975. *Bull. G.A.E.O.* 18: 151-191.
- COSSEC,M. 1982. Sorties ornithologiques aux Glenans, mai-juin 1982. *Ar Vran* 5(295): 45-76.
- CROLQ,C. 1975. L'avifaune nicheuse de la Durance dans les Alpes de Haute Provence. *Alauda* 43: 337-362.
- CRUON,R. & VIEILLARD,J. 1975. Notes d'ornithologique francais, XI. *Alauda* 43: 1-21.
- DAVANT,P., FLEURY,A. & PETIT,P. 1968. La nidification du Courlis cendre (*Numenius arquata*) a l'ouest de Bordeaux. *Alauda* 36: 279-283.
- DAVANT,P. & FLEURY,A. 1969. Nidification de l'Huitrier pie (*Haematopus ostralegus*) sur le banc d'Arguin (Gironde). *Alauda* 37:80.
- DAVID,J., GRANDSERRE,E. & JONIN,M. 1983. *Annuaire des reserves bretonnes et normandes - 1982*. S.E.P.N.B. et G.O.N., no page-numbers.
- DEBOUT,G. 1980. Statut actuel des oiseaux marins nicheurs de Normandie. Recensement de 1979. *Cormoran* 4(22): 123-141.
- DEBOUT,G. 1982. L'avifaune des marais de Carentan. *Cormoran, Gr. Orn. Normand.* n° hors serie, 65 pp.
- DE BRICHAMBAUT,J. 1969a. Nidification de la Barge a queue noire et presence d'Aigrettes garzettes en baie d'Audierne. *Alauda* 37: 80-81.
- DE BRICHAMBAUT,J. 1969b. Nidification possible de l'Echasse et de la Barge a queue noire dans l'estuaire de la Loire. *Alauda* 37:164.
- DE JOUX,C. & MOTTEAU,J. 1966. Nidification d'Echasse blanches en Brenne. *Oiseau et R.F.O.* 36: 277-278.
- DE LA COMBLE,J. 1970. Les oiseaux nicheurs en Saone et Loire. *Bull. Tri. de la Soc. d'Hist. Nat. et des Amis du Museum d'Autun* 55: 24-32 and 56: 17-28.
- DE LA COMBLE,J. 1982. Notules scientifiques - ornithologique (Saone et Loire). *Bull. Soc. d'Hist. Nat. et des Amis du Museum d'Autun* 104: 13-14.
- DENNI,J-M., et al. 1982. Hivernage 1978-79, migration prenuptiale, saison de reproduction et migration postnuptiale 1979, debut d'hivernage 1979-80. *Bull. C.O.C.A.* 18-19: 7-71.
- DERAMOND,M. 1951. Quelques observations sur le Petit Pluvier a collier en Sologne. *Oiseau et R.F.O.* 21: 55-58.
- DESCHAINTRES,A. 1963. Le Courlis niche sur les bords du Doubs. *Jean Le Blanc II(4):97.*
- DORVAL,P. 1968. Nidification de l'Echasse blanche en Bretagne, 1967. *Ar Vran* I(1): 31-32.
- DORVAL,P. 1968. Statut actuel des oiseaux marins nicheurs en Bretagne. II, baie de Douarnenez et cote sud du finistere. *Ar Vran* I(2): 50-74.
- DUBOC,P. 1980. L'etang de Passat (commune de St Victor): le milieu et son avifaune de 73 a 79. *Grand Duo* (decembre 80): 33-48.
- DUBOIS,P. 1980. Evolution des populations d'oiseaux d'eau nicheuses en region parisienne (1945-1978). *Oiseau et R.F.O.* 50: 33-46.
- DUBOIS,P. 1982. *Les milieux remarquables du G.E.N. du Veillon pour l'etude de sa faune (Vendee)*. Rapport L.P.O., 32 pp.
- DUBOIS,P.J. 1984. French breeding wader survey. *Wader Study Group Bull.* 40:30. Abstract.
- DUBOIS,P. 1985. Survey of breeding waders in France. *Wader Study Group Bull.* 45:11.
- DUBOIS,P. & MAHEO,R. 1986. *Limicoles nicheurs en France*. Report Min. Environnement - Serv. Recherche, Etudes et Traitement de l'information de l'environnement, Paris. 291 pp.
- DUCKERT,R. 1960. La faune ornithologique de la region de Florac (Lozere). *Oiseaux France* 28: 27-36.
- DUHAUTOIS,L. 1976. Synthese des observations d'Avocettes (*Recurvirostra avocetta L.*) dans la region parisienne. *Passer* 12: 56-63.
- DULPHY,J-P. 1978. Oiseaux de la region de la Serre (63). *Grand Duc* (juin 78): 23-30.
- DULPHY,J-P. 1979. Expansion du Vanneau huppe dans le Puy de Dome. *Grand Duc* (juin 79) 14: 35-38.
- DUPUICH,H. 1983. Note sur la nidification du Chevalier guignette (*Tringa hypoleucos*) dans l'Aisne. *Avocette* 7: 86-88.
- DUPUICH,H. & SUEUR,F. 1978. Quelques observations de l'aisne en 1977. *Avocette* 2: 65-69.
- ELBEE, COMTE E. d'. 1971. Nidification du Petit Gravelot au Pays Basque. *Bull. Centre Et. Rech. Sci. Biarritz* 8(4):845.
- ENGEL,A. & SCHMITT,P. 1975. Etude d'une population de Courlis cendres en Alsace. *Alauda* 43: 295-302.
- ERARD,C. 1958. Notes d'ornithologie marnaise. *Oiseaux France* 20: 11-14.
- ERARD,C. 1961. Observations sur l'avifaune du departement des Ardennes. *Alauda* 29: 205-218.
- ERARD,C. 1962. Quelques elements avifaunistiques interessants de la region de Servance (Haute Saone). *Alauda* 30: 30-45.
- ERARD,C. & MENVEL,R. 1962. L'avifaune de la Marne (note preliminaire sur les variations depuis la seconde moitie du XIXeme siecle). *Oiseau et R.F.O.* 32: 15-27.

- ERARD,C. & SPITZ,F. 1963. Observations sur l'avifaune des marais de St Gond (Marne) 1956-1963. *Oiseaux France* 40: 12-76.
- ERARD,C., et al. 1968. Contribution a l'étude des oiseaux du Nord-est de la France. *Alauda* 36: 163-174.
- ERARD,C. & LE TOQUIN,A. 1973. Actualités sur les oiseaux nicheurs en région parisienne. *Passer* 9: 66-80.
- FERRY,C. 1955. Sur la reproduction de *Charadrius hiaticulus* en Bretagne. *Alauda* 23: 81-96.
- FERRY,C. 1957. Sur la reproduction du Petit Gravelot dans la Finistère. *Oiseau et R.F.O.* 27: 28-34.
- FERRY,C. 1959. Sur les Courlis du Val de Saône. *Alauda* 27: 33-35.
- FERRY,C. 1967. Nidification de la Becassine des marais en Côte d'Or. *Jean Le Blanc VI(1)*: 22-23.
- FERRY,C. 1971. Le Vanneau nicheur dans le Morvan. *Jean Le Blanc X(3/4)*: 84.
- FERRY,C. 1978. L'Echasse (*Himantopus himantopus*) a niche en Côte d'Or. *Jean Le Blanc XVII(3/4)*: 72-74.
- FERRY,C. 1980. L'Echasse (*Himantopus himantopus*) a niche en Côte d'Or. *Jean Le Blanc* 17(3-4): 329-330.
- FERRY,C. & FERRY,F. 1951. Le Courlis cendré en Côte d'Or. *Alauda* 19: 113-116.
- FLEURY,A. & LETELLIER,Y. 1976. Nouvelles espèces nicheuses dans le Delta de l'Eyre (Bassin d'Arcachon). *Courbageot* 2:16.
- FLOTE,D. & GUERMEUR,Y. 1980. Le Becasseau variable (*Calidris alpina*) a niche en Bretagne. *Ar Vran* 9: 35-48.
- FORMON,A. 1964. Nouvelle localité à Courlis cendré dans la vallée de la Saône. *Jean Le Blanc III(1)*: 16.
- FROCHOT,B. 1968. Nidification du Vanneau huppe (*Vanellus vanellus*) en Côte d'Or. *Alauda* 28: 144-147.
- FROCHOT,B. 1962. Le Courlis cendré (*Numenius arquata*) dans le Jura. *Alauda* 30: 282-285.
- FROCHOT,B. 1962. Le Courlis cendré hors du val de Saône. *Jean Le Blanc I(4)*: 79-80.
- FROCHOT,B. 1963. Le Courlis cendré dans la Bresse. *Jean Le Blanc II(1)*: 14-15.
- FROCHOT,B. 1963. Nouvelles données sur le Courlis cendré dans la Bresse jurassienne. *Jean Le Blanc II(4)*: 94.
- FROCHOT,B. 1964. Reproduction du Vanneau huppe dans la Jura. *Jean Le Blanc III(2)*: 42-43.
- FROCHOT,B. & HORTIGUE,M. 1968. Une niche de Chevalier guignette (*Tringa hypoleucus*) au lac de Chalain. *Jean Le Blanc VII(2/3)*: p. 50.
- GARNIER,A. 1979. Notes sur l'avifaune des marais de la Chaume (Vendée). *Gorgebleue* 3.
- GEROUDET,P. 1961. Quelques notes d'ornithologie Corse. *Alauda* 29: 149-150.
- GEROUDET,P. & BARRUEL,P. 1956. Notes d'ornithologie jurassienne. *Alauda* 24: 81-96.
- GIUSA,P. 1979. Nidification du Petit Gravelot dans un milieu artificialisé. *Grand Duc* (juin 79): 61-62.
- NORD,G.I. 1968. Données nouvelles sur la nidification de certaines espèces dans le Nord-Pas de Calais en 1967. *Heron* 1968(1): 3-7.
- GLEGG,W-E. 1932. Les oiseaux de l'île de la Camargue et de la Petite Camargue (fin). *Oiseau et R.F.O.* 2: 292-338.
- GONIN,L., LHERITIER,M-F., LEVASSEUR,M., GUEGAN, TROQUEREAU,M-E. & TARDIVO,G. 1980. Comptage des Sternes et Petits Gravelots du 21 juin 1980 sur l'ensemble de la Loire Tourangelle. *Bull. de liaison. Soc. Tourangelle des Amis des Oiseaux. Gr. Orn. de Touraine, Tours* 2: 37-40.
- GROUPE ORNITHOLOGIQUE LYONNAIS. 1961. Compte-rendu ornithologique semestriel. Données sur la migration prenuptiale et la saison de nidification en 1960 dans la grande région lyonnaise. *Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon* 38(4-5): 101-136.
- GROUPE ORNITHOLOGIQUE LYONNAIS. 1962. Compte-rendu ornithologique semestriel. Données sur la migration prenuptiale et nidification en 1961 dans la grande région lyonnaise. *Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon* 31(4-5): 120-135.
- GROUPE ORNITHOLOGIQUE LYONNAIS. 1963. Compte-rendu ornithologique semestriel. Données sur la migration prenuptiale et nidification en 1962 dans la grande région lyonnaise. *Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon* 32(2-3): 54-86.
- GROUPE ORNITHOLOGIQUE LYONNAIS. 1964. Compte-rendu ornithologique semestriel. Données sur la migration prenuptiale et la saison de nidification en 1963 dans la grande région lyonnaise. *Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon* 33(3-4): 99-139.
- GROUPE ORNITHOLOGIQUE LYONNAIS. 1965. Compte-rendu ornithologique semestriel. Données sur la migration prenuptiale et nidification 1964. *Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon* 34(3): 71-85.
- GUELIN,F. 1978. Avifaune d'un meandre de l'Allier. Prix scientifique pour les jeunes.
- GUERIN,G. 1939. Ornithologie du Bas-Poitou. Les oiseaux de la Vendée et quelques cantons limitrophes. *Oiseau et R.F.O.* 9: 89-118.
- GUERIN,G. 1977. Inventaire provisoire des oiseaux nicheurs du sud est du Mont Lozère et environs. *Grand Duc* (septembre 77): 1-28.
- GUERMEUR,Y. & MONNAT,J-Y. 1980. *Histoire et géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne*. Ar Vran H.S., 240 pp.
- GUICHARD,G. 1957. Notes sur l'avifaune de Saclay (Seine et Oise). *Oiseaux France* 18: 184-186.
- GUICHARD,G. 1961. Nidification du Courlis cendré (*Numenius arquata*) dans le Forez (Loire). *Oiseau et R.F.O.* 31:73.
- HEIM DE BALSAC,H. 1951. La reproduction du Courlis cendré dans la Mayenne. *Alauda* 19:226.
- HENRY,C., HENRY,P., HESSE,J. & LUNAIS,D. 1971. Contribution à la connaissance de l'avifaune du Loir-et-Cher (Régions de Olois et de Sologne). *Oiseau et R.F.O.* 41: 94-116.
- HESSE,J. et al. 1974. *La faune vertebree des îles et rives de la Loire dans la région centre*. S.E.P.N. Loir et Cher - S.R.E.
- IBANEZ,F. 1979. Nidification du Vanneau huppe (*Vanellus vanellus*) dans les prairies du nord Blayais. *Courbageot* 6: 27-28.
- ISENMANN,P. & SCHMITT,B. 1961. Essai du statut actuel de l'avifaune de la région de Strasbourg. *Alauda* 29: 279-299.
- JANIN,P. 1985. Données récentes sur les nouveaux sites de nidification de la Barge à queue noire (*Limosa limosa* (L.)) dans la vallée de la Saône. *Oiseau et R.F.O.* 55: 149-150.
- JANIN,G. & JANIN,P. 1980. Nidification probable de la Barge à queue noire (*Limosa l. limosa*) dans la vallée de la Saône. *Bievre* 2(2): 189-190.
- JOHNSON,A. & ISENmann,P. 1971. L'évolution récente des effectifs nicheurs de larro-limicoles en zone saumâtre de Camargue. *Alauda* 39: 29-36.
- KEMPF,C. 1976. *Oiseaux d'Alsace*. Ed. Listra, 231 pp.
- KEMPF,C. 1979. Reproduction de la Barge à queue noire (*Limosa limosa*) près de Strasbourg. *Ciconia* 3: 168-173.

- KERAUTRET,L. 1968. Resultats de l'enquête sur la nidification du Vanneau huppe dans le Nord et le Pas-de-Calais, printemps 1967. *Heron* 4:2.
- KERAUTRET,L. 1969. Notes sur l'avifaune de la zone humide de Pierrepont-Sissonne (Laonnois-Aisne). *Alauda* 37: 37-42.
- KERAUTRET,L. 1969. Nouveautés et mise au point sur les oiseaux nidificateurs dans la Nord-Pas-de-Calais (été 1968). *Heron* 1: 1-6.
- KERAUTRET,L. 1972. Mise au point sur les Gravelots (*Charadrius*) nicheurs dans le Nord de la France. *Heron* 72(2): 43-47.
- KERAUTRET,L. 1976. Atlas des oiseaux nicheurs du Nord de la France. *Heron* 1: 1-86.
- KERAUTRET,L. 1981. Liste rouge des oiseaux nicheurs rares et menacés dans le Nord et le Pas-de-Calais. *Heron* 4: 1-27.
- KERAUTRET,L. 1985. Compte-rendu de l'enquête limicoles nicheurs en 1984. *Heron* 1985(1): 74-77.
- KOWALSKI,S. 1980. Contribution à l'étude de la faune ornithologique de l'île de Noirmoutier. *Les Amis de Noirmoutier* 38: 10-15.
- LABITTE,A. 1958. Contribution à l'étude de quelques oiseaux nicheurs et de passage en Champagne humide (région des étangs du Der). *Alauda* 26: 48-55.
- LABITTE,A. 1965. Recherches sur la durée de la période de reproduction chez quelques oiseaux d'eure et Loir de 1920 à 1962. *Oiseau et R.F.O.* 35: 9-21.
- LABITTE,A. & LANGUETIF,A. 1962. Notes sur les oiseaux nicheurs du marais vendéen (au printemps 1960). *Oiseau et R.F.O.* 32: 57-73.
- LABOURG,P-J., LASSERRE,G. & CHAMBULLE,P. 1980. Historique, évolution et avenir des zones aquacoles endiguées du bassin d'Arcachon. *Bull. Scient. Techn. O.N.C.*, n° spécial nov. 80: 189-199.
- LACROIX,P. & MESNIER,D. 1978. Trois années de dénombrement des oiseaux nicheurs sur les étangs de type sablière. *Jean Le Blanc XVII* (3/4): 49-59.
- LAFERRERE,M. 1953. Le Courlis cendré (*Numenius arquata*) nicheur en Dombes et en Dauphiné. *Alauda* 21: 132-134.
- LAMY,D. 1979. Nidification de la Becassine des marais (*Gallinago gallinago*), aux étangs de Saint-Hubert, près du Perray en Yvelines (78). *Passer* 16: 104-105.
- LANG,B. 1981. Enquête limicoles nicheurs: résultats 1981 (Normandie). *Petit Cormoran* 15:7.
- LARIGAUDERIE,F. 1954. Etude des Sternes pierregarins et des Petits Gravelots sur une plage de la Loire dans l'Orléanais. *Oiseaux France* 31: 12-15.
- LEBEURIER,E. 1929. Première constatation de la nidification de *Numenius arquata*, sur la commune de Plougasnou (Finistère). *Alauda* 1: 292-293.
- LEBRETON,P. 1964. Introduction écologique à l'étude de l'avifaune de la Dombes. *Terre et Vie* 18: 20-53.
- LEBRETON,P. 1977. Les oiseaux nicheurs rhonalpins. C.O.R.A./Dir. de la Protection de la Nature, Lyon.
- LEBRETON,P. 1960. Atlas ornithologique Rhône-Alpes, compléments 1976-1979. *Bievre* 2(suppl.): 1-80.
- LEBRETON,P. & FAURE,J-M. 1968. Contributions à la connaissance avifaunistique de la plaine de Forez. *Etudes foreziennes I* Mélanges: 255-289.
- LEFRANC,N. & SCHMITT,B. 1969. Données inédites sur l'avifaune alsacienne du Nord de Strasbourg et sur son évolution de 1958 à 1968. *Alauda* 37: 224-229.
- LE MAO,J-P. 1981. Un cas de nidification du Chevalier gambette (*Tringa totanus*) en Maine-et-Loire. *Bull. Gr. Angevin Et. Orn.* 11(31): 47-49.
- LESCOURET,F. & GENARD,M. 1982. Première nidification prouvée du Pluvier guignard, (*Eudromias morinellus*), dans les Pyrénées françaises. *Oiseau et R.F.O.* 52:367.
- LEVEQUE,R. 1955. Nidification dans les eaux saumâtres de Camargue en 55. *Terre et Vie* 9: 321-326.
- L'HARDY,J-P. 1968. Statut actuel des oiseaux marins nicheurs en Bretagne. IV, Côtes nord du Finistère. *Ar Vran* I(4): 141-161.
- LHERITIER,J-N. 1974. La saison de reproduction de l'avifaune de la lagune Brivadoise. *Grand Duc* 43: 2-22.
- MAHEO,R. & THUAL,A. 1965. Nidification du Chevalier gambette (*Tringa totanus*) auprès de Vannes (Morbihan). *Alauda* 33: 325-326.
- MARTIN,F. & TERRASSE,G. 1985. Les Gravelots dans le Calaisis. *Heron* 1985(1): 78-92.
- MARTIN,F., TERRASSE,G. & SAUVAGE,P. 1985. Nidification de l'Oedicnème dans le Boulonnais en 1984. *Heron* 1985(1): 93-95.
- MAYAUD,N. 1936. Inventaire des oiseaux de France. S.E.O., Paris, 211 pp.
- MAYAUD,N. 1938. L'avifaune de la Camargue et des grands étangs voisins de Berre et de Thau. *Oiseau et R.F.O.* 8: 284-349.
- MAYAUD,N. 1940. L'avifaune des Landes et de la région pyrénéenne occidentale. *Oiseau et R.F.O.* 10: 236-284.
- MERLET,F. 1961. La Barge à queue noire... et sans doute aussi le Chevalier gambette, nicheurs en Sologne. *Oiseaux France* 33: 30-31.
- MEYLAN,O. 1942. Premiers résultats de l'exploration ornithologique de la Dombes. *Alauda* 10: 3-61.
- MILBLED,T. 1974. La nidification du Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*) dans la Nord de la France. *Heron* 1: 38-41.
- MILBLED,T. 1976. Nicheurs et estivants sur la littoral du Pas-de-Calais en 1976. Données nouvelles ou remarquables. *C.G.N. Report 1976*: 41-42.
- MILBLED,T. 1977. Les limicoles nicheurs du Nord de la France. *Sauvagine* 161:30.
- MONNAT,J-Y. 1968. Statut des oiseaux marins nicheurs en Bretagne. I, l'Iroise. *Ar Vran* I(1): 1-30.
- MONNAT,J-Y. 1968. Nidification de la Barge à queue noire en Basse-Bretagne. *Ar Vran* I(3): 133-138.
- MONNAT,J-Y. 1969. Statut actuel des oiseaux marins nicheurs en Bretagne. VI, Haut-Tregor et Goelo. *Ar Vran* II(1): 1-23.
- MONNAT,J-Y. 1980. Statut actuel des oiseaux marins nicheurs en Bretagne. XI, limicoles. *Ar Vran* 9: 1-10.
- MONTEL,F. 1981. La vallée de la Bouvaque. *Avocette* 5: 1-15.
- MORISEAU,A. 1970. Des Vanneaux ont niché près de Chatillon-sur-Seine. *Jean Le Blanc IX*(2/3):67.
- MOUILLARD,G. & CHOUESSY,D. 1971. Liste des oiseaux nicheurs du Puy de Dome. *Grand Duc* (automne 71): 28-35.
- MOUTON,J. 1976. Inventaire des oiseaux du Marquenterre (Somme). *Heron* 1: 42-50.
- MOUTON,J. & TRIPLET,P. 1984. Recensement des Vanneaux huppés (*Vanellus vanellus*) nicheurs sur la plaine littorale picarde: mise au point sur les effectifs. *Picardie-Ecologie* (Ser.II)1: 40-45.
- MULLER,Y. 1979. Extension du Courlis cendré (*Numenius arquata*) à l'ouest du Bas-Rhin. Quelques stations en Moselle. *Ciconia* 3: 174-178.

- MUSELET,D. 1981. Evolution et effectifs en 1980 des populations nicheuses de Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*), Sterne naine (*Sterna albifrons*) et du Petit Gravelot (*Charadrius dubius*) sur les cours de la Loire et de l'Allier. *L'ecologie et l'Aménagement de la Loire.* F.R.A.P.E.C./M.E.R., 479 pp.
- NEVEU,G. & SUEUR,F. 1978. Avifaune de la Moyenne Vallée de la Somme: secteurs de Bray-sur-Somme et Corbie. Les autres vertébrés. *Avocette* 2: 1-20.
- NICOLAU-GUILLAUMET,P. 1975. Recherches sur l'avifaune "terrestre" des îles du Ponant. II, les îles du Morbihan (suite) C, îles de Croix. *Oiseau et R.F.O.* 45: 267-285.
- NICOLAU-GUILLAUMET,P. 1976. Recherches sur l'avifaune "terrestre" des îles du Ponant. II, les îles du Morbihan. E, Belle île. *Oiseaux France* 46: 243-260.
- NICOLAU-GUILLAUMET,P. 1978. Recherches sur l'avifaune "terrestre" des îles du Ponant; les îles de Charente Maritime: l'île de Ré. *Ann. Soc. Sci. Nat. Charente Mar.* 6(5): 368-386.
- NICOLAU-GUILLAUMET,P. 1980. Considerations sur l'avifaune de l'île de Noirmoutier. *Les Amis de Noirmoutier* 39: 7-10.
- NICOLAU-GUILLAUMET,P., SPITZ,F. & TERRASSE,J-F. 1955. Nos études sur les étangs de la région parisienne. *Oiseaux France* 25: 15-34.
- NICOLAU-GULLAUMET,P., et al. 1980. Recherches sur l'avifaune "terrestre" des îles du Ponant, les îles de Charente Maritime: l'île Madame. *Ann. Soc. Sci. Nat. Charente Mar.* 6(7): 727-735.
- MORMAND,N. & LESAFFRE,G. 1977. *Les oiseaux de la région parisienne et de Paris.* A.P.O., Paris, 156 pp.
- OLIOSO,G. 1974. L'avifaune nicheuse d'un ramblai (données sur la nidification du Petit Gravelot). *Alauda* 42: 226-230.
- OLIOSO,G., VOLOT,R. & GALLARDO,M. 1982. Contribution à l'étude des vertébrés du sud du Vaucluse. III, les oiseaux nicheurs. *Bull. C.R.O.P.* 4: 7-23.
- OLIVIER,G. 1938. Les oiseaux de la Haute Normandie. *Oiseau et R.F.O.* 8: 159-218.
- OLIVIER,G. 1941. Nouvelles observations sur les oiseaux des Pyrénées. *Oiseau et R.F.O.* 11: 237-247.
- ORSINI,P. & LAUNAY,G. 1980. Les statuts de l'avifaune aquatique de la région hyéroise. *Trav. Sci. Parc nation. Port-Cros* 6: 9-23.
- PALLUAT DE BESET,B. 1909-1910. Nidification de l'Échasse à manteau noir et du Héron pourpre dans la Loire. *R.F.O.* 1(20): 302.
- PENOT,J. 1954. La reproduction du Chevalier guignette (*Tiinga hypoleucus*) en France. *Oiseaux France* 9: 29-30.
- PERTHUIS,A. 1974. Inventaire ornithologique de la Région Centre. *Bull. Nat. Orléanais* 11: 1-40.
- PERTHUIS,A. 1977. Repartition et effectif des limicoles de la région Centre. 1ère partie: Genre *Gallinago*, *Limosa*, *Tringa* et *Numenius*. *Bull. Nat. Orléanais* III(23): 25-32.
- PERTHUIS,A. 1981. Repartition et effectifs des limicoles nicheurs de la région Centre. 2ème partie: Genre *Vanellus* et *Himantopus Charadrius*. *Bull. Nat. Orléanais* III(33): 51-56.
- PONCY,R. 1930. Contribution à l'étude des oiseaux de la Haute Savoie. *Alauda* 2: 395-416.
- PONCY,R. 1933. Notes ornithologiques concernant le département de la Haute Savoie. *Alauda* 5: 27-32.
- PONCY,R. 1936. Notes ornithologiques concernant le département de la Haute Savoie. *Alauda* 8: 332-341.
- PONT,B. 1978. Statut des oiseaux d'eau dans la vallée du Rhône. *Bihoreau* 7: 14-31.
- PREVOST,J. 1982. Arrivée des oiseaux migrateurs nicheurs dans le département de la Vienne. *Outarde* 14: 54-71.
- RAVEL,J. 1974. Avifaune nicheuse en Creuse. *Grand Duo* (octobre 74): 26-28.
- REBOUSSIN,R. 1911. Les colonies de Vanneaux huppés (*Vanellus cristatus*, Mey. et W) dans les environs de Sarge (Loir et Cher). *R.F.O.* 2(29-30): 156-163.
- REBOUSSIN,R. 1929. Faune ornithologique caractéristique du département du Loir et Cher (suite). *Oiseau et R.F.O.* 10: 389-396.
- RENAULT,D. 1972. Avifaune de "Lys" Commune de Bressoles 03. *Grand Duc* (avril 72): 65-70.
- RIBEREAU,G.R. 1977. Nidification du Gravelot à collier interrompu sur le Banc d'Arguin (Bassin d'Arcachon). *Courbageot* 4:7.
- RIBEREAU,G.R. 1979. Reproduction de l'Huitrier pie (*Haematopus ostralegus*) sur le Banc d'Arguin (Gironde). *Rap. Min. Env./D.P.N.*, Paris, 53 pp.
- RIGAUX,T. 1985. Résultats 1983 et 1984 de l'enquête "limicoles nicheurs" en Picardie. *Avocette* 9: 1-8.
- RIOLS,C. 1980. Nidification des oiseaux aquatiques en 1976. *Bull. C.O.C.A.* 12-13:5.
- ROBERT,J-C. 1978. L'avifaune de la vallée des Evoissons. Approche écologique. *Documents zool.* 1(2): 21-50.
- ROCHE,J. 1978. Les oiseaux aquatiques nicheurs de Côte d'Or et Saône et Loire: historique, évolution et statut actuel. *Jean Le Blanc XVII*(1/2): 1-9.
- SALVAN,J. 1963. Notes sur l'avifaune nidification, région d'Avignon (Vaucluse). *Oiseaux France* 39: 19-26.
- SARDIN,J-P. 1984. Les limicoles nicheurs de Charente. *Pica* 3: 75-82.
- SCHMITT,P. 1963-1964. Repartition et séjour du Courlis cendré en Alsace. *Bull. Soc. Hist. Nat. de Colmar* 51: 53-56.
- SIBLET,J-P., BALANCA,G. & TOSTAIN,O. 1983. Mise au point du statut des oiseaux de Sud Seine-et-Marnais et des proches environs. 3ème partie: des phasianides aux sternidés. *Bull. A.N.V.L.* 59: 73-85.
- SIGWALT,P. & LANDMANN,G. 1979. Étude d'une population de Courlis cendrés dans le Ried de Mutterschoetz (Bas-Rhin). *Ciconia* 3: 61-67.
- SIX,J-C. 1968. Limicoles et rallides dans la vallée de la Lys (Nord). *Heron* 4:8.
- SPITZ,F. 1955. Le Courlis cendré nicheur en Cotentin? *Oiseaux France* 10:15.
- SPITZ,F. 1959. Mise au point sur la nidification du Courlis cendré en France. *Oiseaux France* 26: 26-31.
- SPITZ,F. 1961. Esquisse du statut des limicoles nicheurs de France. *Oiseaux France* 33: 3-9.



- SPITZ,F. 1962. Nouveautes dans le region parisienne depuis 1960. *Oiseaux France* 34: 16-21.
- SPITZ,F. 1962. Actualites sur la repartition des oiseaux nicheurs. *Oiseaux France* 35: 15-20.
- SPITZ,F. 1963. Nouveautes et mise au point sur le repartition des limicoles nicheurs en France. *Oiseaux France* 39: 57-61.
- SPITZ,F. 1964. Premiers resultats de l'enquete sur la nidification du Vanneau huppe (*Vanellus vanellus*) en France. *Oiseaux France* 41: 17-23, 48-51.
- SPITZ,F. 1964. Notes sur l'avifaune nicheuse de la region de St Michel-en-l'Herm (Vendee). *Oiseau et R.F.O.* 34: 51-67.
- SUEUR,F. 1976. Nidification de l'Avocette (*Recurvirostra avosetta*) en baie de Somme. *Bull. Inf. Liais. G.E.P.O.P.* 7: 46-47.
- SUEUR,F. 1976. Nidification de l'Avocette (*Recurvirostra avosetta*) en baie de Somme. *Alauda* 43: 482-483.
- SUEUR,F. 1978. Nidifications precoces au printemps 1977 dans la Somme. *Avocette* 2: 23-24.
- SUEUR,F. 1979. L'Avocette (*Recurvirostra avosetta*) dans la Somme-Picardie. *Ecologie* 3: 21-23.
- SUEUR,F. 1979. Donnees complementaires sur l'avifaune nicheuse de la Somme. *Oiseau et R.F.O.* 49: 39-43.
- SUEUR,F. 1982. Les limicoles nicheurs du littoral picard. *Picardie Nature* 15: 13-14.
- SUEUR,F. 1982. Breeding waders in the Somme estuary area (France). *Wader Study Group Bull.* 36:22.
- SUEUR,F. 1983. Le Chevalier gambette *Tringa totanus* sur le littoral picard. *Avocette* 7: 49-62.
- SUEUR,F. 1983. Oiseaux de Picardie. *Les Echassiers*. Amiens-Bellegarde Le Courrier Picard/Le Credit Agricole de la Somme.
- SUEUR,F. 1983. Liste rouge des oiseaux nicheurs menaces et rares dans la Somme. Doc. multicop. GEPOP, 19 pp.
- TOSTAIN,O. & SIBLET,J-P. 1981. Variations demographiques recentes de quelques oiseaux d'eau nicheurs du sud-est de la region parisienne. *Passer* 18: 140-145.
- TRIPLET,P. 1982. Un tel exemple de "mise en valeur" d'un milieu naturel: le marais de Crotoy. *Picardie Nature* 17: 18-21.
- TRIPLET,P. 1983. Avifaune in Le Hable d'Ault. *Picardie-Ecologie*, Hors serie 1: 58-141.
- TROTIGNON,J. 1983. Les oiseaux aquatiques nicheurs de la Brenne (Indre). *Oiseau et R.F.O.* 53: 13-41.
- TUAL,A. 1965. Notes sur quelques evenements ornithologiques de la saison de nidification 1965 (Echasse blanche). *Ailes et Nature* 6: 27-28.
- VALET,G. 1971. Notes sur l'avifaune nidification du Haut-Auxois. 1/ Le Vanneau huppe. *Jean Le Blanc* I(1/2): 21-29.
- VAN ZURK,H. 1977. Regression de l'avifaune a l'ombouchure et dans la basse vallee du Var. *Alauda* 45: 137-151.
- VAN ZURK,H. 1980. La nidification du Chevalier guignette (*Tringa hypoleucus*) dans la basse vallee du Var. *Alauda* 48:152.
- VAUCHER,C. 1954. Contribution a l'etude ornithologique de la Dombes (suite). *Alauda* 22: 256-271.
- VAUCHER,C. 1955. Contribution a l'etude ornithologique de la Dombes (fin). *Alauda* 23: 108-137.
- YEATMAN,L. 1976. *Atlas des oiseaux nicheurs de France*. S.O.F., Paris, Min. de la Qualite de la vie., Environnement, 274 pp.
- VOISIN,C. & VOISIN,J-F. 1975. Observations sur l'abondance de quelques especes d'oiseaux en basse Camague au cours du printemps et de l'ete 1973. *Oiseau et R.F.O.* 45: 127-137.
- WATIER,J-M. & FOURNIER,O. 1980. Elements de demographie de la population d'Avocettes (*Recurvirostra avosetta*) de la cote atlantique francais. *Oiseau et R.F.O.* 50: 307-321.

## 6.66. PORTUGAL

compiled by Rui Rufino

- JARDIM,G. 1984. Recenseamento e distribuicao de aves limicoles nidificantes no estuario do Tejo - 1983. [Numbers of breeding waders and distribution in Tejo estuary in 1983.] *Cyanopica* III(2): 223-229. In Portuguese.
- RUFINO,R., GUEDES,R.S. & CANDEIAS,D. 1981. Notas sobre a nidificacao de 4 spp. de 'patos' e 1 sp. limicola. [On the breeding of four duck spp. and Avocet in

the South of Portugal.] Publ. CEMPA/SEA - Secretaria de Estado do Ambiente. In Portuguese.

- SANTOS,J.R.,Jr. 1979. As Narcejas (*Gallinago gallinago*) e a sua nidificacao em Tras-os-montes. [On the breeding of Snipe in the North of Portugal.] *Cyanopica* II(1): 1-14. In Portuguese.





The WADER STUDY GROUP (WSG) is an association of amateur and professional workers on the Charadrii (waders or shorebirds) from all parts of the world. By 1982, membership of the WSG was over 500 people, more than half of the members living in countries other than Britain (where the group was formed in 1970), and including people in the Americas, Asia, Africa and Australasia, as well as Europe. New World members have their own section within the WSG. Interests of the Group have diversified from the original concentration on migration-related studies to embrace all aspects of research on waders, e.g. counts, breeding biology, feeding ecology and behaviour.

The aims of the WSG are to maintain contact between both amateur and professional individuals and groups studying waders; to help organise co-operative studies; and to provide a vehicle for exchange of information. The main means of achieving these aims is by the publication of the *Wader Study Group Bulletin* (see below). WSG maintains contacts with many regional, national and international bodies interested in bird research and conservation, notably the International Waterfowl Research Bureau (IWRB), and often works alongside them in co-operative studies. The Group has been involved also in the organisation of expeditions to remote areas to fill gaps in the knowledge of waders. Projects co-ordinated by WSG have included studies of the spring migration of Siberian-breeding Knot through Europe and Africa, and of other species passing through western Europe. Current projects include a comprehensive assessment of the networks of coastal sites used by shorebirds in western Europe in the non-breeding season; a large-scale investigation of spring migration through the Americas; a long-term monitoring of the usage of inland sites in Europe; and an investigation into the effects of severe winter weather in Europe. Most of these studies have immediate relevance to conservation as well as increasing basic understanding of wader biology. These comments apply also to the current WSG co-operative projects concerning breeding waders, particularly an intensive study of wader distributions and densities in the Outer Hebrides of Scotland, where rapid changes are being made due to agricultural practices. WSG also co-ordinates (on behalf of several national authorities) the use on waders of colour-marks visible in the field, and attempts to forward sightings of these.

Membership of the WSG is open to all individuals or groups interested in waders, and application forms can be obtained from the Membership Secretaries, N. & J. Clark, Department of Zoology, University of Edinburgh, West Mains Road, Edinburgh EH9 3JT, U.K. The subscription is devoted mainly to the cost of production and circulation of the *Bulletin*. The annual subscription is #10 (or US \$17 or Canadian \$21). Outside Europe, *Bulletins* will be sent by airmail for a total subscription of #13 (or US \$22 or Canadian \$27). Rates for institutions and payment through subscription services are #25 (or US \$42 or Canadian \$52), or for airmail posting #28 (or US \$47 or Canadian \$58). All cheques should be payable to "Wader Study Group" and must be in British, US or Canadian currency. Alternatively, payments may be made by bank giro (in English pounds) to Lloyds Bank Ltd., 7 Victoria Place, Haverfordwest, Dyfed SA61 23Z, U.K. (Bank sorting code no. 30-93-98), with reference to WSG account (no. 0095972); or by British Post Office Giro to account no. 471204404. Please ensure that your name and initials appear on the transfer form and that a membership application form is sent directly to WSG. Persons with bank accounts in Britain may use the bankers order form provided with the application form.

The *WADER STUDY GROUP BULLETIN* provides a forum for news, notices, recent ringing recoveries, recent publications, new methods of catching and study, articles and preliminary or interim publication of results from all parts of the world. The editors try to maintain a balance of material ranging from newsletter,

informal descriptions of research activities, meetings and expeditions to formal presentation of results or preliminary analyses.

The *Bulletin* appears three times per year, in April, August and December; the deadlines for copy being the first of February, June and October respectively, for notices, but articles must be received well before these dates. Articles, notes, papers, notices, obituaries, requests for information, books for review, reprints of papers and other items should be sent to the Editor, Dr. N.C. Davidson, c/o Nature Conservancy Council, Northminster House, Peterborough PE1 1UA, U.K. Material relating to the New World may be sent to the editors of the New World Section (Dr. J.P. Myers, Vertebrate Biology, Academy of Natural Sciences, 19th and the Parkway, Philadelphia, Pennsylvania 19103, U.S.A.; and Dr. R.I.G. Morrison, Canadian Wildlife Service, 1725 Woodward Drive, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0E7). Matters relating to the circulation of the *Bulletin* should be sent to the Membership Secretaries (address above).

The Editors are always pleased to discuss possible contributions with potential authors, and to advise on presentation. Manuscripts should be typed or written clearly, with all lines double-spaced, leaving wide margins, and following the style of *Bulletin 40* (April 1984) or later issues. Pay particular attention to the style of headings and reference lists. Scientific names should appear at the first mention of each species or, if all species occur in a table, scientific names may be given there instead. Tables and figures should, wherever possible, be designed to fit a single column width of 12 cm. Full page width is 25 cm. A single column of text comprises 47 characters (including spaces).

The *Bulletin* is produced from camera-ready copy printed by a NEC Pinwriter P7 dot-matrix printer driven by a British Broadcasting Corporation Microcomputer Model B (Acorn Computers), with a Computer Concepts "Wordwise Plus" word-processing chip. Authors with such equipment may submit copy in machine-readable form. Advice on this was given in *Bulletin 40*, and is summarised here. Material should be on a 5.25 inch floppy disc, single-sided, at single density, and preferably on 80-track (but 40-track is acceptable). Authors with Epson-compatible printers can include "embedded commands" in the text for italics, underlining, superscripts etc. Otherwise, mark these features clearly on a print-out of your article, using a coloured-pen. A print-out of the article should in any case be sent as well as the machine-readable form. It may be possible for authors with a BBC Microcomputer, but not "Wordwise" or "Wordwise Plus", to submit machine-readable material, but please consult the editor first.

Line illustrations and figures should be produced neatly in black ink on good quality white or tracing paper, with linear dimensions about 1.5 times intended publication size. These can then be used directly in printing. Lettering should be stencilled or by dry transfer (e.g. Letraset), and be at least 1.5 mm high after final reduction. If stencil or dry transfer is not available, leave the original illustration unlabelled, and mark the required lettering on a separate copy. Please send original illustrations, and retain a copy in case of loss or damage in transit. It would be helpful if two copies of each manuscript could be submitted.

Publication of interim results in *WSG Bulletin* is not intended to pre-empt publication of final results as journal papers. Readers are requested to bear in mind that results and analyses published in *WSG Bulletin* may be of a preliminary nature, and to take account of this if making reference to these articles in publications of their own. If editors of other publications wish to reprint items from *WSG Bulletin* with suitable acknowledgement, this can usually be arranged; the persons concerned should contact the WSG Editor.

# WADER STUDY GROUP

BULLETIN 48, SUPPLEMENT

DECEMBER 1986

## BREEDING WADERS IN EUROPE

Breeding Waders in Europe is a comprehensive review of population size estimates of all the Palearctic wader (*Charadrii*) species breeding in the greater part of Europe (Iceland, Faroes, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Poland, Czechoslovakia, Hungary, Austria, Switzerland, East and West Germany, The Netherlands, Belgium, Luxembourg, Great Britain, Ireland, France, north-east Spain and Portugal), together with Svalbard, north and east Greenland and Ellesmere Island. It has been compiled by Theunis Piersma on behalf of the Wader Study Group. The review is based on published sources and on the results of the most recent surveys, supplied as unpublished material by national correspondents. A total of 37 wader species are included. Together they give a total of 6.5 million breeding wader pairs in Europe and a further 100 000 pairs in Svalbard, Greenland and Ellesmere Island. Species' totals range from 30 pairs (Terek Sandpiper) to 869 000 pairs (Lapwing). The completeness and accuracy of the surveys in the different countries varies greatly. For each species an annotated map, summarising the numerical distribution of breeding pairs over Europe, is given. In addition to the population size estimates, Breeding Waders in Europe lists all published sources on which the estimates are based, and aims also to list all the recent (from 1950 onwards) publications on the breeding biology of waders in Europe. The bibliography consists of 3356 entries: 326 for breeding biology studies of general interest, 887 for species-specific studies and 2143 for publications on breeding wader surveys, listed by country. The gaps in the current knowledge of the distribution and size of European breeding wader populations are highlighted. This is intended to stimulate and focus future work on breeding waders both in the areas covered by this review, and elsewhere in Europe.

