

Cordero-Tapia, P.J. & López de Villar, P. 1985. Fenología de limícolas en un pequeño río litoral Mediterráneo - El Tordera - (NE de España). *Ardeola* 32: 131-136.

Domínguez, J., Barcena, F., Souza, J.A. & Villarina, A. 1987. Breeding waders in Galicia, northwestern Spain. *Wader Study Group Bull.* 50: 28-29.

Martínez-Vilalta, A. 1985a. Breeding waders of the Iberian Peninsula. *Wader Study Group Bull.* 45: 35-36.

Martínez-Vilalta, A. 1985b. Descripción de la comunidad de limícolas invernantes en el Delta del Ebro. *Doñana Acta Vertebrata* 12: 221-229.

Martínez-Vilalta, A. 1991. Primer censo nacional de limícolas coloniales y Pagaza Piconegra, 1989. *Ecología* 5: 321-327.

Rubio, J.C. 1986. Estudio de la comunidad de limícolas de las Marismas del Odiel (Huelva). *Oxyura* III: 97-132.

Souza, J.A. 1978. Limícolas de Baldaio desde 1975. Reducción de presencia por drástica transformación del medio. *Braña* 2: 37-59.

Souza, J.A. & Domínguez, J. 1989. Efectivos y distribución del Chorlitejo patinegro (*Charadrius alexandrinus*) en Galicia. *Ecología* 3: 305-311.

ERRATA

We apologise for the poor print quality of several of the figures in recent *Bulletins* and reproduce again, at larger scale some of the figures from Peter Reay and Sara McMahon's paper in *Bulletin* 71: 44-46.




Figure 1a. Tamagram for the main wader species on the Tamar Estuary Complex in 1989.




Figure 1b. Tamagram for the main wader species on the Tamar Estuary Complex in 1990.




Figure 1c. Tamagram for the main wader species on the Tamar Estuary Complex in 1991.




Figure 2. Standardised Tamagram for the main wader species on the Tamar Estuary Complex 1989-91.